



UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 01540063 3



Digitized by the Internet Archive  
in 2010 with funding from  
University of Toronto





*Andes*

*Sei Teil der Natur*


# A. Hartleben's Chemisch-technische BIBLIOTHEK

Die Verteilung

von

Ungeziefer u. Unkrant.

*120763*  
*51 2/12*



A. Hartleben's Verlag, Wien und Leipzig.

# A. Hartleben's Chemisch-technische Bibliothek.

In zwanglosen Bänden. — Mit vielen Illustrationen. — Jeder Band einzeln zu haben.

In Ganzleinstwandbänden, pro Band 90 Heller = 80 Pf. Zuschlag.

I. Band. Die Ausbrüche, Säfte und Südwine. Vollständige Anleitung zur Bereitung des Weines im Allgemeinen, zur Herstellung aller Gattungen Ausbrüche, Säfte, spanischer, französischer, italienischer, griechischer, ungarischer, afrikanischer und asiatischer Weine und Ausbrüche, nebst einem Anhange, enthaltend die Bereitung der Strohweine, Rosinens, Hefens, Runt-, Beerens u. Kernobstweine. Von Karl Maier. Fünfte, sehr verm. und verb. Auflage. Mit 15 Abbild. 15 Bog. 8. Geh. 2 K 40 h = 2 M. 25 Pf.

II. Band. Der chemisch-technische Brennerleiter. Vollständige Anleitung zur Erzeugung von Spiritus und Presse aus Kartoffeln, Kukuruz, Korn, Gerste, Hafer und Melasse; mit besonderer Berücksichtigung der neuen Spiritus-Steuergelege. Von G. E. Idherr (früher von Alois Schönberg). Dritte, vollst. umg. Aufl. Mit 91 Abbild. 20 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.

III. Band. Die Likör-Fabrikation. Vollständige Anleitung zur Herstellung aller Gattungen von Likören, Cremes, Guile, gewöhnlicher Liköre, Mauabite, Fruchtbranntweine (Ratafia) des Rhams, Arraks, Cognaks, der Punsch-Essenzen, der gebrannten Wässer auf warmem und kaltem Wege. Von August Gaber. Mit 18 Abbild. Dritte, verm. u. verb. Aufl. 27 Bog. 8. Geh. 5 K = 4 M. 50 Pf.

IV. Band. Die Parfümerie-Fabrikation. Vollständige Anleitung zur Darstellung aller Toiletten-Parfüms, Nischals, Riechpulver, Räucherwerke, aller Mittel zur Pflege der Haut, des Mundes und der Haare, der Schminken, Haarfarbmittel und aller in der Toilettenkunst verwendeten Präparate, nebst einer ausführlichen Schilderung der Nischstoffe etc. etc. Von Dr. chem. Georg William Astington. Fünfte, sehr verm. und verb. Aufl. Mit 35 Abbild. 26 Bog. 8. Geh. 5 K = 4 M. 50 Pf.

V. Band. Die Seifen-Fabrikation. Handbuch für Praktiker. Enthaltend die vollständige Anleitung zur Darstellung aller Arten von Seifen im Kleinen wie im Fabriksbetriebe mit bes. Rücksichtnahme auf warme und kalte Verfertigung. Von Fried. Hiltner, Seifen-Fabrikant. Sechste, vermehrte Auflage. Mit 88 erläut. Abbild. 16 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.

VI. Band. Die Bierbrauerei und die Malzkeim-Fabrikation. Darstellung der Malzbereitung und der Braumethoden, sowie der Fäbrifikation des Malztrattes. Ein Handbuch für Brauereibesitzer, Brauereileiter etc. Von Herm. Kündinger. Dritte, vermehrte u. verbesserte Auflage. Mit 66 erläut. Abbild. 28 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.

VII. Band. Die Gubwaren-Fabrikation. Anleitung zur Fäbrifikation der Gubhölzchen, Zündkerzen, Zigarren-Gubder und Gubdunkeln, der Fäbrifikation der Gubwaren mit Hilfe von morobem Phosphor und gänzlich phosphorfreien Gubmassen, sowie der Fäbrifikation des gewöhnl. u. amorphen Phosphors von tot. Freitag. Dritte Aufl. Mit 30 Abb. 13 Bog. 8. Geh. 2 K 70 h = 2 M. 50 Pf.

VIII. Band. Die Beleuchtungsstoffe und deren Fäbrifikation. Eine Darstellung aller zur Beleuchtung verwendeten Materialien tierischen und pflanzlichen Ursprungs, des Petroleum, des Stearins, der Terölle, des Paraffins und des Acetolens etc. Von G. u. A. Berl. Chemiker. Zweite, sehr verm. Auflage. Mit 24 Abbild. 13 Bog. 8. Geh. 2 K 20 h = 2 Mark.

IX. Band. Die Fäbrifikation der Lade, Firnisse, Buchdrucker-Firnisse und des Siegel-lackes. Handbuch für Praktiker. Enthaltend die ausführliche Beschreibung zur Darstellung aller künftigen (geistigen) und fetten Firnisse, Buchdrucker-Firnisse, Lade, Resinatlade, Aliphatlade und Saffatlade, des Lackes, sowie die vollständige Anleitung zur Fäbrifikation des Siegellackes und Siegelwachses. Von G. W. Andres. Fünfte Auflage. Mit 33 Abbild. 16 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.

X. Band. Die Essig-Fäbrifikation. Eine Darstellung der Essigfabrikation nach den älteren und neueren Verfahrungsweisen, der Schnell-Essigfabrikation, der Fäbrifikation von Holzessig, der Bereitung von Essigsäure und reiner Essigsäure aus Holzessig sowie der Fäbrifikation von Weiss-, Trester-, Malz-, Bieressig und der aromatisirten Essigsorten, nebst der praktischen Prüfung des Essigs. Von Dr. Josef Berch. Fünfte erw. und verb. Aufl. Mit 24 Abbild. 16 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.

XI. Band. Die Feuerwerkelei und die Fäbrifikation der Feuerwerkskörper. Eine Darstellung der gesamten Prozedur, enth. die vorzögl. Vorschriften zur Anfertigung sämtl. Feuerwerkskörper, als aller Arten von Leuchtfeuern, Sternen, Leuchtgeln, Raketen, der Luft- und Wasser-Feuerwerke, sowie einen Abriss der für den Feuerwerker wichtigen Grundlehren der Chemie. Von August Schenbächer. Dritte, sehr verm. u. verb. Aufl. Mit 51 Abb. 19 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.

XII. Band. Die Meerschaum- und Bernsteinwaren-Fäbrifikation. Mit einem Anhange über die Erzeugung hölz. Weisenkopfe. Enthaltend: Die Fäbrifikation der Pfeifen u. Zigarrenpfeifen; Erzeugung von Rühmmeerscham (Masse oder Massa). Von G. M. Kauter. Mit 5 Tafeln Abbild. 10 Bog. 8. Geh. 2 K 20 h = 2 Mark.

XIII. Band. Die Fäbrifikation der ätherischen Öle. Anleitung zur Darstellung der ätherischen Öle nach den Methoden der Pressung, Destillation, Extraktion, Destillation, Racration und Absorption. Von Dr. chem. George William Astington. Dritte, sehr verm. und verb. Aufl. Mit 87 Abbild. 16 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.

XIV. Band. Die Photographie oder die Anfertigung von bildlichen Darstellungen auf künstlichem Wege. Als Lehr- u. Handbuch von praktischer Seite bearb. u. herausgegeben v. Jul. Fräger. Zweite Auflage. Gänzlich neu bearbeitet von Ph. G. Jacobus Fuchs. Mit 59 Abbild. 34 Bog. 8. Geh. 8 K = 7 M. 20 Pf.

A. Hartleben's Verlag in Wien und Leipzig.

**XV. Band. Die Leim- und Gelatine-Fabrikation.** Eine auf praktische Erfahrung begründete gemeinverständl. Darstellung dieses Industriezweigs in seinem ganzen Umfange. Von F. Dawidow sky. Vierte Aufl. Mit 11 Abbild. 18 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.

**XVI. Band. Die Stärke-Fabrikation und die Fabrikation des Traubenzuckers.** Eine populäre Darstellung der Fabrikation aller im Handel vorkommenden Stärkesorten, als der Kartoffel-, Weizen-, Mais-, Reis-, Arrow-root-Stärke, der Tapioca u. s. w.; der Waich- und Zolletstärke und des künstlichen Sago, die Herstellung des Klebers und der Fabrikation des Dextrins, Stärkewassers, Traubenzuckers, Kartoffelmehles und der Zucker-Confituren. Von Felix Reichwald. Dritte, sehr verm. u. verb. Aufl. Mit 40 Abbild. 17 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.

**XVII. Band. Die Tinten-Fabrikation.** Eine erschöpfende Darstellung der Anfertigung aller Tinten, der Tusche, lithographischen Stifte und Tinten, unauflösl. Tinten um Zeichnen der Wäpse, der Heliographenmaschinen, der Farben für Schreibmaschinen. Von Sigmund Vebner. Sechste Aufl. Mit 6 Abb. 18 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.

**XVIII. Band. Die Fabrikation der Schmiermittel, der Schuhwische und Leder-schmiere.** Anleitungen zur Darstellung aller bekannten Schmiermittel, als: Wagenschmiere, Maschinenschmiere, der Schmierseife f. Näh- u. andere Arbeitsmaschinen u. der Mineralölschmiere, Uhrmacheröle, ferner der Schuhwische, Lederlade, der Leder-schmiere f. alle Gattungen von Leder und des Leinwases. Von Rich. Brunner. Sechste Aufl. Mit 10 Abbild. 14 Bog. 8. Geh. 2 K 40 h = 2 M. 25 Pf.

**XIX. Band. Die Lohgerberei oder die Fabrikation des lohgaren Leders.** Ein Handbuch für Leder-Fabrikanten. Von Ferdinand Wiener, Leder-Fabrikant. Zweite, sehr verm. und verb. Aufl. Mit 48 Abbild. 37 Bog. 8. Geh. 8 K = 7 M. 20 Pf.

**XX. Band. Die Weißgerberei, Sämtischgerberei und Pergament-Fabrikation.** Ein Handbuch für Leder-Fabrikanten. Enthaltend die ausführliche Darstellung der Fabrikation des weißgaren Leders nach allen Verfahrungsweisen, des Glaceladers, Seidenleders u. s. w.; der Sämtischgerberei, der Fabrikation des Pergamentes und der Lederfärberei, mit besonderer Berücksichtigung der neuesten Fortschritte auf dem Gebiete der Lederindustrie. Von Ferdinand Wiener. Zweite, sehr verm. u. verb. Aufl. Mit 20 Abbild. 27 Bog. 8. Geh. 5 K 50 h = 5 Mark.

**XXI. Band. Victor Soclet's Chemische Verarbeitung der Schafwolle oder des Färben, Waschen und Bleichen der Wolle.** In zweiter, vollst. umgearb. und stark verm. Aufl. neu herausg. von W. Zanker. Mit 34 Abb. 26 Bog. 8. Geh. 5 K 50 h = 5 Mark.

**XXII. Band. Das Gelfamgebiet des Lichtdrucks, die Emaltphotographie, und anderweitige Vorschriften zur Umkehrung der negativen und positiven Glasbilder.** Bearbeitet von J. Guisif. Dritte, verm. Aufl. Mit 41 Abbild. u. 7 Tafeln. 18 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.

**XXIII. Band. Die Fabrikation der Konserven und Kanditen.** Vollständige Darstellung aller Verfabren der Konservierung für Fleisch, Früchte, Gemüse, der Trockenfrüchte, der getrockneten Gemüse, Marmeladen, Fruchtstäfte u. s. w. und der Fabrikation aller Arten von Kanditen. Von A. Gaudner. Dritte, verm. u. verb. Aufl. Mit 23 Abbild. 28 Bog. 8. Geh. 5 K = 4 M. 50 Pf.

**XXIV. Band. Die Fabrikation des Surrogatkaffees und des Tafelsens.** Enthaltend: Die ausführliche Beschreibung der Zubereitung des Kaffees und seiner Bestandteile; der Darstellung der Kaffeesurrogate aus allen hierzu verwendeten Materialien und die Fabrikation aller Gattungen Tafelsens. Von R. Lehmann. 2. Aufl. Mit 21 Abbild. 11 Bog. 8. Geh. 2 K 20 h = 2 Mark.

**XXV. Band. Die Ritz- und Klebemittel.** Ausführliche Anleitung zur Darstellung aller Arten von Ritz- und Klebemitteln für Glas, Porzellan, Metalle, Leder, Elfen, Stein, Holz, Wasserfestung- und Dampfrohren, sowie der Öl-, Harz-, Kautschuk-, Guttapercha-, Kalk-, Leim-, Wasserglas-, Glycerin-, Rast-, Gips-, Elfen- und Zinkstifte, des Marineleims, der Zahnstifte, Seibellstifte und der zu speziellem Zwecken dienenden Ritz- und Klebemittel. Von Sigmund Vebner. Siebente, sehr verm. u. verb. Aufl. Mit 10 Bog. 8. Geh. 2 K = 1 M. 80 Pf.

**XXVI. Band. Die Fabrikation der Knochenkohle und des Thieröles.** Eine Anleitung zur rationellen Darstellung der Knochenkohle oder des Spodiums und der pflastischen Kohle, der Verwertung aller sich hierbei ergebenden Nebenprodukte. Von Wilhelm Friedberg. Zweite, sehr vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 21 Abbild. 14 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.

**XXVII. Band. Die Verwertung der Weinrückstände.** Praktische Anleitung zur rationellen Verwertung von Weintrichter, Weinhese (Weinlager, Geläger und Weinslein). Mit einem Anhang: Die Erzeugung von Sogak und Weinsprit aus Wein. Von Antonio dal Riaz. Dritte, vollst. umgearb. Aufl. Mit 30 Abbild. 15 Bog. 8. Geh. 2 K 70 h = 2 M. 50 Pf.

**XXVIII. Band. Die Alkalien.** Darstellung der Fabrikation der gebräuchlichsten Kali- und Natron-Verbindungen, der Soda, Pottasche, des Salzes, Salpeters, Glaubersalzes, Wasserglases, Chromsalzes, Blutlaugensalzes, Weinsalzes, Langensalzes u. s. f., deren Anwendung und Prüfung. Von Dr. C. Bid. Zweite, verm. Aufl. Mit 57 Abb. 27 Bog. 8. Geh. 5 K = 4 M. 50 Pf.

**XXIX. Band. Die Bronzewaren-Fabrikation.** Anleitung zur Fabrikation von Bronze-waren aller Art, Darstellung ihres Gusses und Behandelns nach demselben, ihrer Färbung und Vergoldung, des Bronziersens überhaupt, nach den älteren sowie bis zu den neuesten Verfahrungsweisen. Von Rudw. Müller. Zweite Aufl. Mit 31 Abbild. 17 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.

## A. Hartleben's Chemisch-technische Bibliothek.

**XXX. Band. Vollständiges Handbuch der Bleichkunst oder theoretische und praktische Anleitung zum Bleichen von Baumwolle, Flach, Pant, Wolle, Seide, Jute, Chinagrass und Tassarische, sowie der daraus gewonnenen Garne und gewebten oder gewirkten Stoffe und Zeuge. Nebst einem Anhange über zweckmäßiges Bleichen von Schmutzflecken, Schweißborsten, Tierfellen, Knochen, Elfenbein, Backen und Talg, Oabern (Zumpen), Papier, Stroh, Sabelschwämmen, Schellack u. Guttaperga. Von V. Jociet. Zweite, vollst. umgearb. Aufl. Mit 56 Abbild. u. 1 Tafel. 24 Bdg. 8. Geh. 5 K 50 h = 5 Mark.**

**XXXI. Band. Die Fabrication von Rauhbutter, Sparbutter und Butterine. Eine Darstellung der Bereitung der Feigamittel der echten Butter nach den besten Methoden. Von Viktor Jociet. Dritte Aufl. Mit 21 Abbild. 10 Bdg. 8. Geh. 2 K = 1 M. 80 Pf.**

**XXXII. Band. Die Natur der Ziegelsteine und die Ziegelfabrication der Gegenwart. Handbuch für Ziegeltechniker, technische Chemiker, Bau- und Maschinen-Ingenieure, Fabrikanten und Landwirte. Von Dr. Hermann Zwiß. Zweite, sehr verm. Aufl. Mit 108 Abbild. 86 Bdg. 8. Geh. 9 K 20 h = 8 M. 30 Pf.**

**XXXIII. Band. Die Fabrication der Mineral- und Lackfarben. Enthaltend: Die Anleitung zur Darstellung aller künstlichen Maler- u. Antreiberfarben, der Email-, Ruß- u. Metallfarben. Von Dr. Josef Berich. Zweite Aufl. Mit 43 Abbild. 42 Bdg. 3. Geh. 8 K 40 h = 7 M. 60 Pf.**

**XXXIV. Band. Die künstlichen Düngemittel. Darstellung der Fabrication des Knochen-, Horn-, Blut-, Fleisch-, Mehl-, der Salpätungen, des schwefelsauren Ammoniums, der verschiedenen Arten Supersphosphate, der Thomasschlacke, der Boudrette u. s. f., sowie Beschreibung des natürlichen Vorkommens der konzentrierten Düngemittel. Von Dr. S. Bid. Dritte, verb. u. verm. Aufl. Mit 34 Abb. 18 Bdg. 8. Geh. 3 K 60 h = 3 M. 25 Pf.**

**XXXV. Band. Die Zinkgravüre oder das Ätzen in Zink zur Herstellung von Druckplatten aller Art, nebst Anleitung zum Ätzen in Kupfer, Messing, Stahl und anderen Metallen. Von Julius Krüger. Vierte Aufl. Mit 23 Abbild. u. 5 Tafeln. 11 Bdg. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.**

**XXXVI. Band. Medizinische Spezialitäten. Eine Sammlung aller bis jetzt bekannten und unterworfen medizinischen Geheimmittel mit Angabe ihrer Zusammensetzung nach den bewährtesten Chemikern. Von S. F. Capaun-Carlowa. Dritte Aufl. Vollst. neu bearb. von Dr. pharm. Max v. Waldheim. 19 Bdg. 8. Geh. 3 K 60 h = 3 M. 25 Pf.**

**XXXVII. Band. Die Färberei der Baumwolle auf Garne und Gewebe mit besonderer Berücksichtigung der Türkischrot-Färberei. Ein Lehr- und Handbuch für Interessenten dieser Branchen. Von Karl Roman. Mit 6 Abbild. 24 Bdg. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.**

**XXXVIII. Band. Die Galvanoplastik. Ausführliches Lehrbuch der Galvanoplastik und Galvanostegie nach den neuesten theoret. Grundsätzen u. prakt. Erfahrungen bearbeitet. Von Julius Weisk. Fünfte, völlig umgearb., verm. u. verb. Aufl. Mit 36 Abbild. 26 Bdg. 8. Geh. 5 K 50 h = 5 Mark.**

**XXXIX. Band. Die Weinbereitung und Kellermwirtschaft. Handbuch für Weinproduzenten, Weinbändler und Kellermeister. Von Antonio dal Bias. Fünfte, neubearb. und verm. Aufl. Mit 101 Abbild. 31 Bdg. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.**

**XL. Band. Die technische Verwertung des Steinkohlenteer. Nebst einem Anhange über die Darstellung des natürlichen Asphaltsteins und Asphaltartig aus dem Asphaltsteinen und bituminösen Schiefen, sowie Verwertung der Nebenprodukte. Von Dr. Georg Lichtenius. Zweite, verb. Aufl. Mit 31 Abbild. 16 Bdg. 8. Geh. 2 K 70 h = 2 M. 50 Pf.**

**XLI. Band. Die Fabrication der Erdfarben. Enthaltend: Die Beschreibung aller natürlich vorkommenden Erdfarben, deren Gewinnung und Zubereitung. Von Dr. Jos. Berich. Zweite Aufl. Mit 19 Abb. 16 Bdg. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.**

**XLII. Band. Desinfektionsmittel oder Anleitung zur Anwendung der praktischen und desin. Desinfektionsmittel, um Wohnräume, Krankensäle, Siedlungen, Transportmittel, Seidenfarmen, Schlachtfelder u. s. w. zu desinfizieren. Von Wilhelm Hedenast. 13 Bdg. 3. Geh. 2 K 20 h = 2 Mark.**

**XLIII. Band. Die Lithographie, oder eine Anleitung zur Herstellung druckbarer Metallplatten aller Art, sowohl für Galböne als auch für Strich- und Formanier, ferner die neuesten Fortschritte im Pigmentdruck, Woodbury-Verfahren und der Farbenphotographie nebst anderweitigen Vorschriften. Bearbeitet von J. Gussit. t. t. Professor in Prag. Dritte, vollst. neu bearb. Aufl. Mit 24 Illustrationen und 4 Tafeln. 15 Bdg. 8. Geh. 5 K = 4 M. 50 Pf.**

**XLIV. Band. Die Fabrication der Anilinfarbstoffe und aller anderen aus dem Eer darstellbaren Farbstoffe (Phenols, Naphthalins, Anthracen- und Reiorcin-Farbstoffe) u. deren Anwendung in der Industrie. Von Dr. Josef Berich. Mit 15 Abbild. 35 Bdg. 8. Geh. 7 K 20 h = 6 M. 50 Pf.**

**XLV. Band. Chemisch-technische Spezialitäten und Geheimnisse, mit Angabe ihrer Zusammensetzung nach den bewährtesten Chemikern. Von S. F. Capaun-Carlowa. Fünfte, vollständig umgearbeitete Auflage. Zusammengestellt von Dr. pharm. Max v. Waldheim. 20 Bdg. 8. Geh. 2 K 70 h = 2 M. 50 Pf.**

**XLVI. Band. Die Woll- und Seidendruckerei in ihrem ganzen Umfange. Ein prakt. Hand- und Lehrbuch für Druck-Fabrikanten, Farber u. techn. Chemiker. Enthaltend: das Drucken der wollenen, halbwollenen u. halbschleidenstoffe der Wollegarne und seidenen Zeuge. Von Viktor Jociet. Mit 54 Abbild. u. 4 Taf. 37 Bdg. 8. Geh. 7 K 20 h = 6 M. 50 Pf.**

**XLVII. Band. Die Fabrication des Rübenzuckers, enthaltend: Die Erzeugung des Rohzuckers, des Rohzuckers, die Herstellung von Raffinade- und Sandzucker, nebst einem Anhange über die Verwertung der Nebenprodukte und Abfälle u. Von Richard v. Regner. Mit 21 Abb. 14 Bdg. 8. Geh. 8 K 30 h = 3 Mark.**

- XLVIII. Band. Farbenlehre.** Für die praktische Anwendung in den verschied. Gewerben und in der Kunstindustrie, bearb. von Alwin v. Bowermanns. Zweite, verm. Aufl. Mit 7 Abbild. 11 Bog. 8. Geh. 2 K 40 h = 2 M. 25 Pf.
- IX. Band. Vollständige Anleitung zum Formen und Gießen** nebst genauer Beschreibung aller in den Künsten und Gewerben dafür angewandten Materialien als: Gips, Wachs, Schmelz, Leim, Harz, Guttapercha, Ton, Lehm, Sand und deren Behandlung behufs Darstellung von Gipsfiguren, Stuckaturen, Tons, Zements und Steingut zc. Waren, sowie der beim Guss von Statuen, Glöden und in der Messing-, Zink-, Blei- und Eisengießerei vorkommenden Gegenständen. Von Edward Nölkenhuth. Schöne stark verm. und verb. Aufl. Mit 22 Abbild. 14 Bog. 8. Geh. 2 K 20 h = 2 Mark.
- X. Band. Die Bereitung der Schaumweine**, mit besonderer Berücksichtigung der französischen Champagner-Fabrikation. Von A. v. Negner. Zweite, gänzl. umgearb. Aufl. Mit 45 Abbild. 18 Bog. 8. Geh. 5 K 50 h = 5 Mark.
- LI. Band. Raif und Luftmörte.** Auftreten und Natur des Kalksteines, das Brennen desselben und seine Anwendung zu Luftmörte. Nach gegenwärtigem Stande von Theorie und Praxis dargestellt von Dr. Hermann Schmid. Zweite Aufl. Mit 39 Abbild. 15 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.
- LII. Band. Die Legierungen.** Enthaltend die Darstellung sämtlicher Legierungen, Amalgam, u. a. Bote f. die Zwecke aller Metallarbeiter. Dritte, sehr erweit. Aufl. Von A. Krupp. Mit 30 Abbild. 26 Bog. 8. Geh. 5 K 50 h = 5 Mark.
- LIII. Band. Unsere Lebensmittel.** Eine Anleitung zur Kenntnis der vorzüglichsten Nahrungs- und Genussmittel, deren Vorkommen und Beschaffenheit in gutem und schlechtem Zustande, sowie ihre Verälfäschungen und deren Erkennung. Von G. F. Capann-Karlowa. 10 Bog. 8. Geh. 2 K 20 h = 2 Mark.
- LIV. Band. Die Photokeramik**, das ist die Kunst, fotogr. Bilder auf Porzellan, Email, Glas, Metall u. s. w. einzubrennen. Von Jul. Krüger. Nach dem Tode des Verfassers neu bearb. von Jakob Susnik. Zweite, verm. Aufl. Mit 21 Abbild. 14 Bog. 8. Geh. 2 K 70 h = 2 M. 50 Pf.
- LV. Band. Die Farze und ihre Produkte.** Deren Abkammung, Gewinnung und technische Verwertung. Nebst einem Anhange: über die Produkte der modernen Färberei des Farzes oder Kolophoniums: das Kampbin, das schwere Harzöl, das Coböl u. die Färbung von Wagenfett u. Maschinenölen zc. aus den schweren Farzen, sowie die Verwendung derselben zur Leuchtgas-Erzeugung. Von Dr. G. Schenit. Zweite, verb. Aufl. Mit 47 Abbild. 18 Bog. 8. Geh. 3 K 60 h = 3 M. 25 Pf.
- LVI. Band. Die Mineralsäuren.** Nebst einem Anhange: Der Chloralkali und die Ammoniakverbindungen. Darstellung der Fabrikation von schwerer Säure, Schwefelsäure, Salzsäure, Salpetersäure, Kohlen-, Arsen-, Bor-, Phosphor-, Kieselsäure, Chloralkali und Ammoniaksalzen, deren Untersuchung und Anwendung. Von Dr. E. Richter. Mit 28 Abbild. 26 Bog. 8. Geh. 5 K 50 h = 5 Mark.
- LVII. Band. Wasser und Eis.** Eine Darstellung der Eigenschaften, Anwendung und Reinigung des Wassers für industrielle und häusliche Zwecke und der Aufhebung, Penigung und künstlichen Darstellung des Eises. Von Friedrich Ritter. Mit 35 Abbild. 21 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- LVIII. Band. Hydraulischer Kalk u. Portland-Zement** ihre Rohstoffe, physikalischen u. chemischen Eigenschaften, Untersuchung, Fabrikation. Mit besonderer Rücksicht auf den gegenwärtigen Stand der Zement-Industrie. Von Dr. E. Zwiß. Dritte Aufl. Von Dr. A. Röper. Mit 50 Abb. 17 Bog. 8. Geh. 5 K = 4 M. 50 Pf.
- LIX. Band. Die Glasägerei für Tafel- und Hohlglas, Gell- und Mattägerei** in ihrem ganzen Umfange. Alle bisher bekannten und viele neue Verfahren enthaltend: mit besonderer Berücksichtigung der Monumental-Glasägerei. Von J. B. Müller. Vierte Aufl. Mit 14 Abbild. 9 Bog. 8. Geh. 2 K = 1 M. 80 Pf.
- LX. Band. Die explosiven Stoffe**, ihre Geschichte, Fabrikation, Eigenschaften, Bräufung u. prakt. Anwendung in der Sprengkunst. Von Dr. Fr. Böckmann. Zweite, gänzlich umgearb. Aufl. Mit 67 Abbild. 29 Bog. 8. Geh. 5 K 50 h = 5 Mark.
- LXI. Band. Handbuch der rationalen Verwertung, Wiedergewinnung und Verarbeitung von Abfallstoffen** jeder Art. Von Dr. Theodor Koller. Zweite, vollst. umgearb. und verb. Aufl. Mit 22 Abbild. 22 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- LXII. Band. Kautschuk und Guttapercha.** Eine Darstellung der Eigenschaften und der Verarbeitung des Kautschuks und der Guttapercha auf fabrikmäßigem Wege, der Fabrikation des Weich- und Hart-Gummis, der Kautschuk- und Guttapercha-Kompositionen, der wasserdichten Stoffe, elastischen Gewebe u. s. w. Von Raimund Hoffer. Dritte, bearb. und verb. Aufl. Mit 22 Abbild. 17 Bog. 8. Geh. 3 K 60 h = 3 M. 25 Pf.
- LXIII. Band. Die Kunst- und Feinwäscherei** in ihrem ganzen Umfange. Enthaltend: Die chemische Wäsche, Fleckenreinigungskunst, Kunstwäscherei, Hauswäscherei, die Stroubtuch-Wäsche und -Färberei, Handschuh-Wäscherei und -Färberei zc. Von Viktor Necl. Vierte, gänzlich umgearbeitete Auflage. Mit 46 Abbild. 17 Bog. 8. Geh. 2 K = 1 M. 80 Pf.
- LXIV. Band. Grundzüge der Chemie** für Gewerbetreibende sowie für Lehrer an Gewerbeschulen. Von Prof. Dr. W. v. v. v. Zweite vollständig neu bearbeitete Auflage von G. Nicolas. Mit 62 Abb. 29 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.
- LXV. Band. Die Fabrikation des Emails und des Emaillieren.** Anleitung zur Darstellung aller Arten Emaille für technische und künstlerische Zweck und zur Vornahme des Emaillierens auf praktischem Wege. Von Paul Randau. Vierte Aufl. Mit 19 Abb. 17 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.

LXVI. Band. Die Glas-Fabrikation. Eine übersichtliche Darstellung der gesamten Glasindustrie mit vollständ. Anleitung zur Herstellung aller Sorten von Glas und Glaswaren. Von Raimund Gerner. Zweite, vollst. umg. u. verm. Aufl. Mit 65 Abb. 24 Bogen. 8. Geh. 5 K = 4 M. 50 Pf.

LVII. Band. Das Holz und seine Destillations-Produkte. Über die Abtammung und das Vorkommen der verschiedenen Hölzer. Über Holz, Holzschleifstoff, Holzcellulose, Holzimprägnierung u. Holzkonfervierung, Weiler- und Retorten-Verkohlung, Holzseig u. seine techn. Verarbeitung, Holzteer u. seine Destillationsprodukte, Holzteepech u. Holzstohlen. Von Dr. Georg Thienius. Zweite, verb. u. verm. Aufl. Mit 42 Abbild. 23 Bog. 8. Geb. 6 K = 4 M. 50 Pf.

LXVIII. Band. Die Marmorierungskunst. Ein Lehr- u. Musterbuch f. Buchbinderelern, Bunt-  
papierfabriken u. verwandte Geschäfte. Von J. B. Boed. Zweite, vollst. umgearb. und verm.  
aufl. Mit 44 Abbild. 12 Bog. 8. Geb. 2 K. = 1 Th. 80 Pf.

**LXIX. Band. Die Fabrication des Wachsstiches, des amerikanischen Lebertuches, der Korktappiche oder des Linoleums, des Sacks-Taffets, der Waler- und Zeichen-Seitwand, sowie die Fabrication des Leertuches, der Dachpappe und die Darstellung der unverbrennlichen und gegebenen Gewebe.** Von R. Gglinger. 2. Aufl. Mit 13 Abbild. 14 Bog. 8. Geh. 2 K 70 h = 2 M. 50 Pf.

**LXX. Band. Das Cellulose, seine Rohmaterialien, Fabrikation, Eigenschaften und technische Verwertung.** Von Dr. Fr. Böckmann. Dritte, gänzl. umgearb. Aufl. **III** 49 Abbild. 11 Bog. 8. **Gr. 2 K = 1 M. 80 Pf.**

LXXI. Band. Das Ultramarin und seine Bereitung nach dem jetzigen Stande dieser Industrie. Von C. Fürstenau. Mit 25 Abbild. 7 Bgg. 8. Geh. 2 K = 1 M. 80 Pf.

LXXII. Band. Petroleum und Erdwachs. Darstellung der Gewinnung von Erdöl und Erdwachs (Ceresin), deren Verarbeitung auf Leuchtöle und Paraffin sowie aller anderen aus denselben zu gewinnenden Produkte, mit einem Anhang, betreffend die Fabrikation von Phorogen, Solaröl und Paraffin aus Braunkohlenteer. Von Arthur Burgmann. Zweite, verb. und erw. Aufl. Mit 23 Abbild. 16 Bog. 8. Geb. 3 K 60 h = 3 M. 25 Pf.

LXXIII. Band. Das Löten und die Bearbeitung der Metalle. Eine Darstellung aller Arten von Lot, Lötmitteln und Lötapparaten, sowie der Behandlung der Metalle während der Bearbeitung. Von Edmund Schloffer. Dritte, sehr verm. u. erw. Aufl. Mit 35 Abbild. 17 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.

LXXIV. Band. Die Gasbeleuchtung im Haus und die Selbsthilfe des Gas-Konsumenten. Von Prof. Dr. A. W. Müller. 84 Abb. 11 Tab. 8. Geh. 2 K 20 h = 2 M.

LXXV. Band. Die Untersuchung der im Handel und Gewerbe gebräuchlichsten Stoffe (einschl. der Nahrungsmittel). Von Dr. S. Pich. Mit 16 Abbild. 14 Bog. 8. Geh. 5 K. = 4 M. 50 Pf.

LXXVI. Hand. Das Versinnen, Versinken, Vernickeln, Vertafeln und das Überziehen von Metallen mit anderen Metallen überhaupt. Eine Darstellung praktischer Methoden zur Aufarbeitung aller Metalleübergänge. Von Friedrich Hartmann. Fünfte, verb. Aufl. Mit 5 Abbild. 17 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark

XXVII. Band. Kurzgefaßte Chemie der Rübensaft-Reinigung. Von W. Sptora und F. Schiller. 19 Bogen. 8. (Beh. 3 K 60h = 3 R. 25 Pf.)

LXXXVIII. Band. **Die Mineral-Malerei.** Neues Verfahren zur Herstellung witterungsbedürftiger Wandgemälde. Von H. Reim. 6 Bdg. 8. Geh 2 K = 1 M. 80 Pf.

**LXXXI. Band. Die Schokoladenfabrikation.** Eine Darstellung der verschiedenen Verfahren zur Anfertigung aller Sorten gewöhnlicher und Luxus-Schokoladen, der hierbei in Anwendung kommenden Materialien u. Beschreibung der zur Verarbeitung der Schokolademasse in Verwendung kommenden Maschinen. Von Ernst Salchow. Zweite, verbess. Aufl. Mit 39 Abbild. 16 Bogen. 8. (Zeh. 3 K 60 H. = 3 M. 25 P.)

**XXXIX. Band Die Feuers-Industrie und die Brennmaterialien. Eine Darstellung**  
 der Eigenschaften der festen, flüssigen und gasförmigen Heizstoffe, wie Holz, Torf, Braunkohle, Coaks,  
 Erdöl und Spiritus, Wassergas, Halbwassergas und Generatorgas, der Aufbereitung und Bräunung  
 der Braunkohle und Steinkohle und der Untersuchung der Heizstoffe und der Feuerungsanlagen. Von  
 Dr. Friedrich Tümmann. Zweite Aufl. Mit 67 Abb. 32 Holz. 8. Geh. 3 K 50 h = 5 M.

LXXXI. Band. Die Darstellung des Eisens u. der Eisenfabrikate. Handbuch für Hüttenleute u. sonstige Eisenarbeiter, für Techniker, Händler mit Eisen und Metallwaren, für Gewerbe- und Fachschulen v. Bon. Eduard Tavina. Mit 73 Abbild. 17 Bogen. Geh. 3 K 60 h = 3 M. 26 Pf.

LXXXII. Band. Die Lederfärberei und die Färberei des Fadleders. Ein Handbuch für Lederfärber und Färbere. Anleitung zur Herstellung aller Arten von färbigem Glacleder nach dem Aufstreich- und Tauchverfahren, sowie mit Hilfe der Teerfarben, zum Färben von Schwedischem, samischegarem und lohgarem Leder, zur Saifins, Cordurus, Chagrinfärberei etc. Von Ferdinand Wiener Zweite, verm. und verb. Aufl. Mit 16 Abbild. 15 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.

LXXXIII. Band. Die Fette und Die Darstellung der Gewinnung und der Eigenschaften aller Fette, Die u. Wacharten, der Fette u. Dracinerie u. der sterem-Fabrikation. Von Friedrich Thalwinn. Zweite, sehr verm. und verb. Aufl. Mit 41 Abb. 16 Bog. 8. Geb. 3 K 30 h = 3 M.

**XXXXIV. Band. Die Fabrication der moussirenden Getränke. Praktische Anleitung zur Fabrication aller moussirenden Wässer, Limonaden, Weine u. und gründliche Beschreibung der hierzu nötigen Apparate.** Von Dr. C. Lohmann. Vierte des in erster Aufl. von Ostas Reich verfaßten Werkes. Mit 60 Abbild. 18 Bogen. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.



## A. Hartleben's Chemisch-technische Bibliothek.

- LXXXV. Band. Gold, Silber und Edelfeine.** Handbuch für Gold-, Silbers-, Bronzearbeiter und Juweliere. Vollständige Anleitung zur technischen Bearbeitung der Edelmetalle. Von A. Wagner. Zweite Aufl. Mit 14 Abbild. 18 Bogen. 8. Geh. 3 K 60 h = 3 M. 25 Pf.
- LXXXVI. Band. Die Fabrikation der Äther und Grundeigenschaften.** Die Äther, Fruchtäther, Fruchtessenzen, Fruchtextrakte, Fruchtessuren, Tinkturen, Färbungen u. Aromatisierungsmittel. Von Dr. Th. Horatius. Zweite, vollständig neu bearb. und erw. Auflage. Von August Haber. Mit 14 Abb. 18 Bogen. 8. Geh. 3 K 60 h = 3 M. 25 Pf.
- LXXXVII. Band. Die technischen Vollendungsarbeiten der Holz-Industrie, das Schleifen, Beizen, Polieren, Sackieren, Anstreichen und Vergolden des Holzes, nebst der Darstellung der hierzu verwendbaren Materialien in ihren Hauptgrundzügen.** Von V. F. Anbés. Dritte, vollständig umgearb. und verb. Aufl. Mit 45 Abbild. 15 Bogen. 8. Geh. 2 K 70 h = 2 M. 50 Pf.
- LXXXVIII. Band. Die Fabrikation von Albumin und Eierkonserben.** Eine Darstellung der Eigenschaften der Eiweißkörper, der Fabrikation von Eier- und Bivalalbumin, des Patents mit Naturalbumin, der Eier- und Dotterkonserben und der zur Konservierung frischer Eier dienenden Verfahren. Von Karl Ruprecht. Zweite, sehr erw. Aufl. Mit 16 Abbild. 12 Bogen. 8. Geh. 2 K 40 h = 2 M. 25 Pf.
- LXXXIX. Band. Die Feuchtigkeits- der Wohngebäude, der Mauertrag und Holzschwamm, nach Ursache, Wesen und Wirkung betrachtet und die Mittel zur Verhütung, sowie zur sicheren und nachhaltigen Beseitigung dieser Übel unter besonderer Hervorhebung neuer und praktisch bewährter Verfahren zur Trockenlegung feuchter Wände und Wohnungen.** Von A. W. Reim. Zweite, vollständig umgearb. Aufl. Mit 23 Abbild. 11 Bogen. 8. Geh. 2 K 70 h = 2 M. 50 Pf.
- X. Band. Die Verzierung der Gläser durch den Sandstrahl.** Vollständige Unterweisung zur Martverzierung von Tafel- und Hohlglas mit besonderer Berücksichtigung der Beleuchtungsartikel. Von J. S. Müller. Mit 11 Abbild. 11 Bogen. 8. Geh. 2 K 70 h = 2 M. 50 Pf.
- XI. Band. Die Fabrikation des Alauns, der Amweissäuren und essigsauren Tonerde, des Bleiweißes und Bleisulfats.** Von Friedrich Jünemann. Mit 9 Abbild. 13 Bogen. 8. Geh. 2 K 70 h = 2 M. 50 Pf.
- XII. Band. Die Tapete, ihre ästhetische Bedeutung und technische Darstellung, sowie kurze Beschreibung der Buntpapier-Fabrikation.** Von Th. Seemann. Mit 42 Abb. 16 Bogen. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- XIII. Band. Die Glas-, Porzellan- und Email-Male rei in ihrem ganzen Umfange.** Ausführliche Anleitung zur Anfertigung sämtlicher bis jetzt zur Glas-, Porzellans, Email-, Fayence und Steingut-Malerei gebräuchlichen Farben und Flüsse, nebst vollständiger Darstellung des Brennens dieser verschiedenen Stoffe. Von Felix Hermann. Zweite, sehr verm. Aufl. Mit 18 Abbild. 23 Bogen. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- XIV. Band. Die Konservierungsmittel, ihre Anwendung in den Nahrungsgewerbe und zur Aufbewahrung von Nahrungsmitteln.** Von Dr. Josef Reich. Zweite, verbesserte Auflage. Mit 12 Abbild. 12 Bogen. 8. Geh. 2 K 70 h = 2 M. 50 Pf.
- XV. Band. Die elektrische Beleuchtung und ihre Anwendung in der Praxis.** Von Dr. Alfred Urbanigk. Zweite Aufl. Mit 169 Abbild. 20 Bogen. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- XVI. Band. Brechhese, Runkhese und Sackpulver.** Ausführliche Anleitung zur Darstellung von Brechhese nach allen bekannten Methoden, zur Bereitung der Runkhese und der verschiedenen Arten von Sackpulver, sowie der Ausführung der Reindruck von Seife im großen. Von Adolf Wilsfert. Dritte Aufl. Mit 24 Abbild. 16 Bogen. 8. Geh. 2 K 20 h = 2 Mark.
- XVII. Band. Die praktische Eisen- und Eisenwarenkennner.** Kaufmännisch-technische Eisenwarenkunde. Von G. Taping. Mit 98 Abbild. 37 Bogen. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.
- XVIII. Band. Die Keramik oder Die Fabrikation von Fayence, Steingut, Steinzeug, Terrakotta, sowie von transalpinem, englischem und Hartporzellan.** Von Ludwig Wipplinger. Zweite, sehr verm. und verb. Aufl. Mit 66 Abbild. 12 Bogen. 8. Geh. 5 K = 4 M. 50 Pf.
- X. Band. Das Alchecin.** Seine Darstellung, seine Verbindung u. Anwendung in der Gerberie, in der Seifen-Fabrikation, Parfumerie u. Sprengtechnik. Von S. W. Koppe. Mit 3 Abbild. 13 Bogen. 8. Geh. 2 K 70 h = 2 M. 50 Pf.
- O. Band. Handbuch der Chemigraphie, Sodasäure in Zink, Kupfer und anderen Metallen für Buchdruck mittels Umdruck von Autographen und Photographen, direkter Kopierung oder Radierung des Bildes auf die Platte (Chromogummis u. Chromaluminverfahren, Abbild u. amerikanischer Emailprozess, Autotypie, Photochemigraphie, Chalcographische u. Photodermographie).** Von B. F. Töpel. Zweite Aufl. Mit 14 Abbild. 17 Bogen. 8. Geh. 3 K 60 h = 3 M. 25 Pf.
- II. Band. Die Imitationen.** Eine Anleitung zur Nachahmung der Natur- und Kunstprodukten, als: Eisenstein, Schildpatt, Perlen und Perlmutt, Korallen, Bernstein, Horn, Elfenbein, Fischbein, Alabastrer etc. Von Sigmund und Lechner. Dritte, bedeut. erw. Aufl. Mit 12 Abbild. 21 Bogen. 8. Geh. 8 K 60 h = 8 M. 25 Pf.
- III. Band. Die Fabrikation der Kopal-, Terpentinöl- und Spiritus-Lake.** Von G. F. Anbés. Dritte, umgearb. Aufl. Mit 86 Abbild. 33 Bogen. 8. Geh. 6 K = 5 M. 40 Pf.
- III. Band. Kupfer und Messing, sowie alle technisch wichtigen Kupferlegierungen, ihre Darstellungsmethode, Eigenschaften und Weiterverarbeitung zu Handelswaren.** Von G. Taping. Mit 41 Abbild. 14 Bogen. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.
- IV. Band. Die Vereitung der Brennerer-Kunsthese.** Von Josef Reich. 4 Bogen. 8. Geh. 1 K 60 h = 1 M. 60 Pf.

A. Hartleben's Verlag in Wien und Leipzig.

**OV. Band. Die Verwertung des Holzes auf chemischem Wege.** Eine Darstellung des Verfahrens zur Gewinnung der Destillationsprodukte des Holzes, der Essigsäure, des Holzgeistes, des Teeres und der Terebinthe, des Kreosotes, des Kuckes, des Kohlenöls und der Kohlen. Die Fabrikation von Dr. Josef Berich. Zweite, sehr verm. Aufl. Mit 68 Abbild. 23 Bog. 8. Geh. 5 K = 4 M. 50 Pf.

**OVI. Band. Die Fabrikation der Zappapappe und der Anstrichmasse für Wappdächer.** In Verbindung mit der Teer-Destillation nebst Anfertigung aller Arten von Wappbedeckungen und Wapphalterungen. Von Dr. G. Lohmann. Zweite Aufl. Mit 47 Abbild. 16 Bog. 8. Geh. 3 K 60 h = 8 M. 25 Pf.

**OVII. Band. Anleitung zur chemischen Untersuchung und rationalen Beurteilung der landwirtschaftlich wichtigen Stoffe.** Ein den praktischen Bedürfnissen angepaßtes analytisches Handbuch für Landwirthe u. Von Robert Feingy. Mit 15 Abbild. 19 Bog. 8. Geh. 3 K 60 h = 8 M. 25 Pf.

**OVIII. Band. Das Lichtbrennverfahren in theoretischer u. praktischer Beziehung.** Von H. Schuberth. Zweite Aufl. Mit 7 Abbild. 11 Bog. 8. Geh. 1 K 60 h = 1 M. 50 Pf.

**OIX. Band. Zink, Zinn und Blei.** Eine ausführliche Darstellung der Eigenschaften dieser Metalle, ihrer Legierungen untereinander und mit anderen Metallen, sowie ihrer Verarbeitung hies. Wege. Von Carl Fichter. Zweite Aufl. Mit 17 Abbild. 18 Bog. 8. Geh. 3 K 60 h = 3 M. 25 Pf.

**OX. Band. Die Verwertung der Knochen auf chemischem Wege.** Eine Darst. auf der Verarbeitung von Knochen auf alle aus denselben geminnbaren Produkte, insbesondere Fett, Leim, Dängemittel, Phosphor und phosphorsaure Salze. Von Wilhelm Friedberg. Zweite, sehr verm. Aufl. Mit 81 Abbild. 22 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.

**OXI. Band. Die Fabrikation der wichtigsten Antimon-Präparate.** Mit besonderer Berücksichtigung des Schwefelantimon und Goldschmelz. Von Julius Sehm. Mit 27 Abbild. 9 Bog. 8. Geh. 2 K 20 h = 2 Mark.

**OXII. Band. Handbuch der Photographie der Neuzeit.** Mit besonderer Berücksichtigung des Bromsilber- und Gelatine-Emulsion-Verfahrens. Von Julius Krüger. Zweite, gänzlich umgearbeitete Auflage. Mit 93 Abbild. 21 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.

**OXIII. Band. Tracht und Trachtwaren.** Praktische Hilfs- und Handbuch für die gesamte Drahtindustrie, Eisen- und Metallwarenfabrikanten, Gewerbe- und Fachschulen. Mit besonderer Rücksicht auf die Anforderungen der Elektrotechnik. Von Eduard Jasing. Mit 119 Abbild. 29 Bog. 8. Geh. 7 K 20 h = 6 M. 50 Pf.

**OXIV. Band. Die Fabrikation der Toilette-Seifen.** Praktische Anleitung zur Herstellung aller Arten von Toilette-Seifen auf kaltem und warmem Wege, der Glycerin-Seife, der Seifen-Flugeln, der Schaumseifen und der Seifen-Spezialitäten. Von Friedrich Wiltner. Mit 39 Abbild. 21 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.

**OXV. Band. Praktisches Handbuch für Anstreicher und Lackierer.** Anleitung zur Ausführung aller Anstreicher-, Lackierer-, Vergolder- und Schriftmalerei-Arbeiten. Von L. G. Andé. Dritte, vollst. umgearb. Aufl. Mit 67 Abbild. 21 Bog. 8. Geh. 3 K 60 h = 3 M. 25 Pf.

**OXVI. Band. Die praktische Anwendung der Farbstoffe in der Industrie.** Praktische Anleitung zur rationalen Darstellung der Anilin-, Phenyl-, Naphthalin- und Anthracen-Farben in der Färberei, Druckerei, Samtpapier-, Tinten- und Färbwaren-Fabrikation. Von G. J. Schödl. Mit 20 Abbild. 12 Bog. 8. Geh. 2 K 70 h = 2 M. 50 Pf.

**OXVII. Band. Die Verarbeitung des Hornes, Elfenbeins, Schildkröte, der Knochen und der Perlmutter.** Abkammung und Eigenschaften dieser Rohstoffe, ihre Zubereitung, Färbung u. Verwendung in der Drechlerei, Kamm- und Knopffabrikation, sowie in anderen Gewerben. Von Louis Edgar Andé. Mit 32 Abbild. 16 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.

**OXVIII. Band. Die Kaffee- und Getreidebrennerei.** Handbuch für Spiritusfabrikanten, Brennereileiter, Landwirthe und Techniker. Enthaltend: Die praktische Anleitung zur Darstellung von Spiritus aus Kaffeebohnen, Getreide, Mais und Reis, nach den älteren Methoden und nach dem Hochdruckverfahren. Von Adolf Wiltner. Mit 88 Abbild. 29 Bog. 8. Geh. 6 K = 5 M. 40 Pf.

**OXIX. Band. Die Reproduktions-Photographie** sowohl für Gelbton als Strichmanier nebst den bewährtesten Kopierprozeduren zur Übertragung photographischer Glasbilder aller Art auf Glas und Stein. Von J. H. H. H. Zweite, bedeutend erw. u. besonders f. d. Autotypie u. d. chromatischen Verfahren umgearb. Aufl. Mit 40 Abbild. u. 5 Tafeln. 18 Bog. 8. Geh. 3 K 60 h = 3 M. 25 Pf.

**XXX. Band. Die Seiden, ihre Darstellung, Prüfung und Anwendung.** Für den praktischen Färber und Zeugdrucker. Von H. Wolff. 13 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.

**XXXI. Band. Die Fabrikation des Aluminiums und der Alkalimetalle.** Von Dr. Stanislaus Merz. Mit 27 Abbild. 9 Bog. 8. Geh. 2 K 20 h = 2 Mark.

**XXXII. Band. Die Technik der Reproduktion von Militär-Karten und Plänen,** nebst ihrer Vervielfältigung, mit besonderer Berücksichtigung jener Verfahren, welche im k. k. militär-geographischen Institute zu Wien ausgeübt werden. Von Ottomar Volkmer. Mit 57 Abbild. im Text und einer Tafel. 21 Bog. 8. Geh. 5 K = 4 M. 50 Pf.

**XXXIII. Band. Die Kohlenäure.** Eine ausführliche Darstellung der Eigenschaften, des Vorkommens, der Herstellung und technischen Verwendung dieses Körpers. Von Dr. G. Lohmann. Zweite, umgearbeitete Auflage. Mit 93 Abbild. 23 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.



- 24** OXXIV. Band. Die Fabrikation der Siegel- und Glaschenlade. Mit einem Anhang: Die Fabrikation d. Brauers, Nachsch. Schuhmacher. 1. Buchst. edes. Von Louis Edgar Andés. Mit 21 Abbild. 15 Bog. 8. Geh. 5 K 30 h = 3 Marl.
- 25** OXXV. Band. Die Feigwaren-Fabrikation. Mit einem Anhang: Die Vanier-, Muschel- und Kinderstuhl-Fabrikation. Mit Beschreibung und Plan einer Feigwaren-Fabrik. Von Friedr. Dertel. Zweite, sehr verm. Aufl. Mit 65 Abb. 13 Bog. 8. Geh. 2 K 70 h = 2 M. 50 Pf.
- 26** OXXVI. Band. Praktische Anleitung zur Schriftmaterie mit besonderer Berücksichtigung der Konstruktion und Berechnung von Schriften für bestimmte Flächen, sowie der Herstellung von Glas-Glanzvergoldung und Verblüßung für Glasinstrumente etc. Von Robert Hagen. Zweite, gänzl. umgearb., verm. Aufl. Mit 29 Abbild. 10 Bog. 8. Geh. 2 K = 1 M. 80 Pf.
- 27** OXXVII. Band. Die Meiler- und Retorten-Verkohlung. Die Legenden und Nebenben Meiler. Die gemauerten Holzverkohlungs-Öfen und die Retorten-Verkohlung. Über Kiefern, Kien- und Buchenholz-Teer-Erzeugung, sowie Birken-Teer-Gewinnung. Die technisch-chemische Bearbeitung der Nebenprodukte der Holzverkohlung, wie Holzeisig, Holzgeist und Holzteer. Die Norfals-Fabrikation, das Schwarze und graue Norfals. Die Holzgeist-Erzeugung und die Verarbeitung des Holzteers auf leichte und schwere Holzteeröle, sowie die Erzeugung des Holzteerparaffins und Verwertung des Holzteer-beckes. Von Fr. Georg Denius. Mit 80 Abbild. 21 Bog. 8. Geh. 5 K = 4 M. 50 Pf.
- 28** OXXVIII. Band. Die Schleifs-, Polier- und Bugmittel für Metalle aller Art, Glas, Holz, Gesteine, Horn, Schildpatt, Perlmutter, Steine etc. Von Victor Wabburg. Zweite, vollst. umgearb. Aufl. Mit 97 Abbild. 25 Bog. 8. Geh. 5 K = 4 M. 50 Pf.
- 29** OXXIX. Band. Lehrbuch der Verarbeitung der Naphtha oder des Erdöles auf Leucht- und Schmieröle. Von F. M. Rossmäcker. Mit 27 Abbild. 8 Bog. 8. Geh. 2 K 20 h = 2 Marl.
- 30** OXXX. Band. Die Zinkätzung (Chemigraphie, Zinkstüpe). Eine fassliche Anleitung nach den neuesten Fortschritten, alle mit den bekannten Manieren auf Zink oder ein anderes Metall übertragenen Silber hochzuätzen und für die inopographische Presse geeignete Druckplatten herzustellen. Von J. S. und N. 3. Aufl. Mit 30 Abb. u. 4 Taf. 14 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Marl.
- 31** OXXXI. Band. Die Fabrikation der Hautschu- und Leimmasse-Lapen, Stempel und Druckplatten, sowie die Verarbeitung des Korke- und der Korfalsfälle. Darstellung der Fabrikation von Hautschu- und Leimmasse-Lapen und Stempeln, der Cellulose-Stamplapen, der Buch- und Steindruckwalzen, Lederdruckplatten, elastischen Formen für Stein- und Gipsguss. Von August Stefan. Zweite, vollst. umgearb. Aufl. Mit 114 Abbild. 21 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Marl.
- 32** OXXXII. Band. Das Wachs und seine technische Verwendung. Darstellung der natürlichen animalischen und vegetabilischen Wacharten, des Mineralwachses (Gerein), ihrer Gewinnung, Reinigung, Verälschung und Anwendung in der Kerzenfabrikation, zu Wachelumen u. Wachfiguren, Wachspapier, Salben u. Bäden, Pomaden, Farben, Lederriemern, Fußbodenwachsen u. vielen anderen techn. Zwecken. Von Ludwig Sedna. 2. Aufl. Mit 45 Abbild. 13 Bog. 8. Geh. 2 K 70 h = 2 M. 50 Pf.
- 33** OXXXIII. Band. Albest und Feuerzuck. Enthaltend: Vorkommen, Verarbeitung und Anwendung des Albestes, sowie den Feuerzuck in Theatern, öffentlichen Gebäuden u. s. w., durch Anwendung von Beispielpräparaten, Imprägnierungen und sonstigen bewährten Vorkehrungen. Von Wolfgang Venerand. Mit 47 Abbild. 16 Bog. 8. Geh. 3 K 60 h = 3 M. 25 Pf.
- 34** OXXXIV. Band. Die Appreturmittel und ihre Verwendung. Darstellung aller in der Appretur verwendeten Hilfsstoffe, ihrer speziellen Eigenschaften, d. Zubereitung zu Appreturmassen und ihrer Verwendung zum Appretieren von leinenen, baumwollenen, seidenen und wollenen Geweben; feuerfeste und wasserichte Appreturen von F. Vollehn. Dritte, vollst. umgearb. Aufl. Mit 55 Abb. 23 Bog. 8. Geh. 5 K = 4 M. 50 Pf.
- 35** OXXXV. Band. Die Fabrikation von Rum, Arrak und Kognak und allen Arten von Obst- und Früchlenbranntweinen, sowie die Darstellung der besten Nachahmungen von Rum, Arrak, Kognak, Pfäumenbranntwein (Schlowski), Rischwasser u. s. w. Von August Hader. Zweite, sehr verb. und verm. Aufl. 12 Abbild. 23 Bog. 8. Geh. 5 K = 4 M. 50 Pf.
- 36** OXXXVI. Band. Handbuch d. prakt. Seifen-Fabrikat. In 2 Bänden. Von Wilm in Engelshardt. I. Band. Die in der Seifen-Fabrikat. angewend. Rohmaterialien, Maschinen u. Gerätschaften. Zweite Aufl. Mit 110 Abbild. 28 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Marl.
- 37** OXXXVII. Band. Handbuch d. prakt. Seifen-Fabrikat. In 2 Bänden. Von Wilm in Engelshardt. II. Band. Die gesamte Seifen-Fabrikation nach dem neuesten Standpunkte der Praxis und Wissenschaft. Zweite Aufl. Mit 28 Abbild. 30 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Marl.
- 38** OXXXVIII. Band. Handbuch der praktischen Papier-Fabrikation. Von Dr. Stanislaus Mieringst. Erster Band: Die Herstellung des Papiers aus Haden auf der Papiermaschine. Mit 166 Abb. u. mehr. Tafeln. 29 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Marl. (Siehe auch die Bände 141 u. 142.)
- 39** OXXXIX. Band. Die Filter für Haus und Gewerbe. Eine Beschreibung der wichtigsten Sands-, Gesebes-, Papier-, Kohle-, Gifen-, Stein-, Schwamm- u. s. w. Filter u. der Filterpressen. Von Richard Krüger. Mit 72 Abbild. 17 Bog. 8. Geh. 3 K 60 h = 3 M. 25 Pf.
- 40** OXL. Band. Blech und Blechwaren. Praktisches Handbuch für die gesamte Blechindustrie für Schüttenwerte, Konstruktions-Werkstätten, Maschinen- und Metallwaren-Fabriken. Von Eduard Japing. Mit 125 Abb. 29 Bog. 8. Geh. 6 K = 5 M. 40 Pf.

- CXLI. Band. Handbuch der praktischen Papier-Fabrikation.** Von Dr. Stanislaus Mierziński. Zweiter Band. Die Färbemittel der Färberei. Mit 114 Abbild. 21 Bog. 8. Geb. 4 K 40 h = 4 Mark. (Siehe auch die Bände 138 u. 142.) 141
- CXLII. Band. Handbuch der praktischen Papierfabrikation.** Von Dr. Stanislaus Mierziński. Dritter Band. Anleitung zur Unterbindung der in der Papierfabrikation vorkommenden Hochprodukte. Mit 28 Abb. 17 Bog. 8. Geb. 3 K 60 h = 3 M. 25 Pf. (S. auch die Bde. 138 u. 141.) 142
- CXLIII. Band. Wasserglas- und Zuspottenerde, deren Natur und Bedeutung für Industrie, Technik und die Gewerbe.** Von Hermann Kräger. Zweite Aufl. Mit 36 Abbild. 15 Bog. 8. Geb. 3 K 30 h = 3 Mark. 143
- CXLIV. Band. Die Verwertung der Holzabfälle.** Eingehende Darstellung der rationellen Verarbeitung aller Holzabfälle, namentlich der Sägepläne, ausgenützten Farbhölzer und Gerberinden als Heizungsmaterialien, zu chemischen Produkten, zu künstlichen Holzmassen, Explosivstoffen, in der Landwirtschaft als Düngemittel und zu vielen anderen technischen Zwecken. Von Ernst Schubarth. Zweite, verm. und verb. Aufl. Mit 50 Abbild. 15 Bog. 8. Geb. 3 K 30 h = 3 M. 144
- CXLV. Band. Die Malz-Fabrikation.** Eine Darstellung der Bereitung von Grün-, Luft- und Darmmalz nach den gewöhnl. u. v. verschiedenen mechan. Verfahren. Von Karl Weber. Mit 77 Abbild. 22 Bog. 8. Geb. 5 K = 4 M. 50 Pf. 145
- CXLVI. Band. Chemisch-technisches Rezeptbuch für die gesamte Metall-Industrie.** Eine Sammlung ausgewählter Vorschriften für die Verarbeitung aller Metalle, Dekoration u. Verschönerung daraus gefertigter Arbeiten, sowie deren Konservierung. Von Heinrich Bergmann. 2. Aufl. 20 Bog. 8. Geb. 4 K 40 h = 4 Mark. 146
- CXLVII. Band. Die Gerb- und Farbstoff-Extrakte.** Von Dr. Stanislaus Mierziński. Mit 59 Abbild. 16 Bog. 8. Geb. 3 K 60 h = 3 M. 25 Pf. 147
- CXLVIII. Band. Die Dampf-Brauerei.** Eine Darstellung des gesamten Brauwesens nach dem neuesten Stande des Gewerbes. Mit besond. Berücksichtigung der Dimaichs- (Desolations-) Brauerei nach bayrischer, wiener und böhmischer Braumethode und des Dampftriebes. Von Franz Cassan. Mit 55 Abbild. 25 Bog. 8. Geb. 5 K 50 h = 5 Mark. 148
- CIL. Band. Praktisches Handbuch für Flechtwerke.** Enthaltend die Einrichtung des Flechtweids und Verarbeitung derselben zu Flechtwaren, die Verarbeitung des spanischen Rohres, des Strohes, die Herstellung von Spartenwaren, Strohmaten und Rohrbetten, das Flechten, Färben, Lackieren und Vergolden der Flechtarbeiten, das Flechten und Färben des Strohes u. s. w. Von Louis Edgar Aubé. Mit 82 Abbild. 19 Bog. 8. Geb. 3 K 60 h = 3 M. 25 Pf. 149
- OL. Band. Handbuch der praktischen Kerzen-Fabrikation.** Von Alwin Engelhardt. Mit 58 Abbild. 28 Bog. 8. Geb. 6 K 60 h = 6 Mark. 150
- OLI. Band. Die Färbung künstlicher plastischer Massen, sowie der künstlichen Steine, Kunststeine, Stein- und Zementgüsse.** Eine ausführliche Anleitung zur Herstellung aller Arten künstlicher plastischer Massen aus Papier, Papier- und Holzkloß, Zellulose, zc. Von Johannes Höfer. Dritte, vollst. umgearb. u. verm. Aufl. Mit 33 Abb. 21 Bg. 8. Geb. 4 K 40 h = 4 Mark. 151
- OLII. Band. Die Färberei a. Kessort und das Färben der Schmuckfedern.** Leichtfassliche Anleitung, gewebte Stoffe aller Art neu zu färben oder umzufärben und Schmuckfedern zu appretieren und zu färben. Von Alfred Brauner. Mit 13 Abbild. 12 Bog. 8. Geb. 3 K 30 h = 3 Mark. 152
- OLIII. Band. Die Brillen, das dioptrische Fernrohr und Mikroskop.** Ein Handbuch für praktische Optiker von Dr. Karl Neumann. Mit 95 Abbild. 17 Bog. 8. Geb. 4 K 40 h = 4 M. 153
- OLIV. Band. Die Färbung der Silber- und Suedsilber- Spiegel oder das Belegen der Spiegel auf chemischem und mechanischem Wege.** Von Ferdinand Gremer. Zweite, vollständig umgearbeitete Auflage. Mit 49 Abbild. 15 Bog. 8. Geb. 3 K 30 h = 3 Mark. 154
- OLV. Band. Technik der Radierung.** Eine Anleitung zum Radieren und Ätzen auf Kupfer. Von J. Koller. Zweite Aufl. 10 Bog. 8. Geb. 3 K 30 h = 3 Mark. 155
- OLVI. Band. Die Herstellung der Abziehbilder (Metamorphose, Desakomantie) des Blech- und Transparenzdrucke nebst der Lehre der Übertragungs-, Um- u. Überdruckverfahren.** Von Wilhelm Sanger. Mit 8 Abbild. 13 Bog. 8. Geb. 3 K 30 h = 3 Mark. 156
- OLVII. Band. Das Trocknen, Bleichen, Färben, Bronzieren und Vergolden natürlicher Blumen und Gräser sowie sonstiger Pflanzenteile und ihre Verwendung zu Duktis, Stränzen und Dekorationen.** Von W. Brandt. Mit 4 Abbild. 12 Bog. 8. Geb. 3 K 30 h = 3 M. 157
- OLVIII. Band. Die Färbung der deutschen, französischen und englischen Wagentette.** Leichtfasslich gelehrt für Wagen-Fabrikanten, Seifen-Fabrikanten, für Interessenten der Wett- und Dibranche. Von Hermann Kräger. Zweite, neu bearbeitete Auflage. Mit 31 Abbild. 15 Bog. 8. Geb. 3 K 30 h = 3 Mark. 158
- OLIX. Band. Haus-Spezialitäten.** Von Adolf Domačka. 2. Auflage. Mit 10 Abbild. 15 Bog. 8. Geb. 3 K 30 h = 3 Mark. 159
- OLX. Band. Betrieb der Galvanoplastik mit dynamo-elektrischen Maschinen zu Zwecken der graphischen Künste** von Ottomar Volkmer. Mit 47 Abbild. 16 Bog. 8. Geb. 4 K 40 h = 4 Mark. 160
- OLXI. Band. Die Rübenbrennerei.** Dargestellt nach den praktischen Erfahrungen der Kunst von Hermann Briem. Mit 14 Abbild. und einem Situationsplane. 13 Bog. 8. Geb. 3 K 30 h = 3 Mark. 161

- OLXII. Band. Das Wissen der Metalle für kunstgewerbliche Zwecke. Nebst einer Zusammenfassung der wichtigsten Verfahren zur Veredlung geätzter Gegenstände. Von J. Schubert. 2. Auflage. Mit 30 Abbild. 16 Bog. 8. Geh. 3 K 60 h = 3 M. 25 Pf.
- OLXIII. Band. Handbuch der praktischen Zolleteisenfabrikation. Praktische Anleitung zur Darstellung aller Sorten von deutschen, englischen und französischen Zolleteisen, sowie der medizinischen Seifen, Glycerineisen und der Seifenpezialitäten. Von Alwin Engelhardt. Mit 107 Abbildungen. 31 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mart.
- OLXIV. Band. Praktische Herstellung von Lösungen. Ein Handbuch zum raschen und sicheren Auffinden der Lösungsmittel aller technisch und industriell wichtigen festen Körper, sowie zur Herstellung von Lösungen solcher Stoffe für Techniker und Industrielle. Von Dr. Theodor Koller. Mit 16 Abbild. 23 Bog. 8. Geh. 5 K = 4 M. 50 Pf.
- OLXV. Band. Der Gold- und Farbendruck auf Kalko, Leder, Leinwand, Papier, Samt, Seide und andere Stoffe. Von Eduard Grosse. Zweite Aufl. Mit 114 Abbild. 18 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mart.
- OLXVI. Band. Die künstlerische Photographie. Nebst einem Anhang über die Bearbeitung und technische Behandlung der negative photographischer Porträts und Landschaften, sowie über die chemische und artistische Retouche, Momentaufnahmen und Magnesiumbilder. Von G. Schlenker. Mit 38 Abb. und einer Lichtdrucktafel. 22 Bog. 8. Geh. 5 K = 4 M. 50 Pf.
- OLXVII. Band. Die Fabrikation der nichttrübenden ätherischen Öle und Extrakte. Vollständige Anleitung zur Darstellung der sogenannten extraktarfen, in 50%igem Spiritus löslichen ätherischen Öle, sowie der Mischungs-Extrakte, Extrakt-Öle, Frucht-Öle und der Fruchtäther. Von Heinrich Bopper. 2. Aufl. Mit 16 Abbild. 18 Bog. 8. Geh. 3 K 60 h = 3 M. 25 Pf.
- OLXVIII. Band. Das Photographieren. Ein Handbuch für Amateure und Fachphotographen. 4. Aufl. Erlernung und Ausübung dieser Kunst. Von J. F. Schmid. Zweite, vermehrte Auflage von R. Gerget. Mit 123 Abbild., 6 Tabellen und einer Farbdruck-Beilage. 31 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 M.
- OLXIX. Band. Öl- und Buchdruckfarben. Praktisches Handbuch enthaltend das Reinigen und Bleichen des Leinwands nach verschiedenen Methoden, Nachweisung der Verfassungen desselben sowie der Leinwandfärbungen und der zu Farben verwendeten Körper, ferner die Fabrikation der Leinwandfärbungen, der Öl- und Firnisfarben für Anstriche jeder Art, der Kunstofffarben (Malerfarben), der Buchdruckfärbungen etc. Von Louis Edgar Andé. Mit 52 Abbild. 19 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mart.
- OLXX. Band. Chemie für Gewerbetreibende. Darstellung der Grundbegriffe der chemischen Wissenschaften und deren Anwendung in den Gewerben. Von Dr. Friedrich Kottner. Mit 70 Abb. 33 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mart.
- OLXXI. Band. Theoretisch-praktisches Handbuch der Gas-Installation. Von D. Coglievina. Mit 70 Abbild. 23 Bog. 8. Geh. 5 K = 4 M. 50 Pf.
- OLXXII. Band. Die Fabrikation und Raffinierung des Glases. Genaue, übersichtliche Beschreibung der gesamten Glasindustrie. Von Wilhelm Mertens. Mit 88 Abbild. 27 Bog. 8. Geh. 6 K = 5 M. 40 Pf.
- OLXXIII. Band. Die internationale Wurst- u. Fleischwaren-Fabrikation. Nach der neuesten Erfahrungen bearbeitet von R. Merges. Zweite, von Georg Wenger durchgesehene und mit Anmerkungen und neuen Rezepten versehene Auflage. Mit 29 Abb. 13 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 M.
- OLXXIV. Band. Die natürlichen Gesteine, ihre chemisch-mineralogische Zusammenfassung, Gewinnung, Prüfung, Bearbeitung und Konfektionierung. Von Richard Krüger. Erster Band. Mit 7 Abbild. 18 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mart.
- OLXXV. Band. Die natürlichen Gesteine u. s. w. Von Richard Krüger. Zweiter Band. Mit 109 Abbild. 20 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mart.
- OLXXVI. Band. Das Buch des Konditors oder Anleitung zur praktischen Erzeugung der verschiedensten Artikel aus dem Konditorische. Buch für Konditore, Hotels, große Küchen und für das Haus. Von Fr. Urban. Mit 37 Tafeln. 30 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mart.
- OLXXVII. Band. Die Blumenbinderer in ihrem ganzen Umfange. Die Herstellung sämtlicher Bindeartikel und Dekorationen, wie Kränze, Bouquets, Guirlanden etc. Von B. Braun. Mit 61 Abb. 20 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mart.
- OLXXVIII. Band. Chemische Präparatenkunde. Handbuch der Darstellung und Gewinnung der am häufigsten vorkommenden chemischen Körper. Von Dr. Theodor Koller. Mit 20 Abbild. 15 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mart.
- OLXXIX. Band. Das Gesamtgebiet der Vergolderei nach den neuesten Fortschritten und Verbesserungen. Umfassend sämtliche Kirchenarbeiten in Vergoldung, Verzierungen und Polichromierung, sowie die Herstellung von Dekorationsgegenständen aus Holz, Stempelpapier und Gummi in Glanz, Matt- und Silbervergoldung, Lackmalerei, Cuivre poli- und Goldmalereien. Ferner die Färbung und Verarbeitung der Leisten. Von Otto Kersch. Zweite Auflage. Mit 75 Abb. 16 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mart.
- OLXXX. Band. Praktischer Unterricht in der heutigen Buchbinderfärberei, Bappenfärberei mit Kupferfärbung und chemische und Raschwäscherei. Von Louis Bau. 12 Bog. 8. Geh. 6 K 30 h = 3 Mart.
- OLXXXI. Band. Taschenbuch bestmöglicher Vorschriften für die gangbarsten handverkauften Artikel der Apotheken und Drogenhandlungen. Von Dr. Dr. Ab. Domacka. Dritte, verb. Aufl. 9 Bog. 8. Geh. 1 K 60 h = 1 M. 50 Pf.

- OLXXXII. Band. Die Herstellung künstlicher Blumen und Pflanzen aus Stoff und Papier.** 1. Band. Die Herstellung der einzelnen Pflanzenteile, wie: Laub, Blumen- und Feldblätter, Staubfäden und Nistile. Von W. Braunsdorf. Mit 110 Abbild. 19 Bogen. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- OLXXXIII. Band. Die Herstellung künstlicher Blumen und Pflanzen aus Stoff und Papier.** 2. Band. Die Herstellung künstlicher Blumen, Gräser, Bäume, Farne, Kräuter, Blüthpflanzen und Früchte. Von W. Braunsdorf. Mit 60 Abbild. 19 Bogen. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- OLXXXIV. Band. Die Praxis der Anilin-Färberei und Druckerlei auf Baumwollenwaren.** Entaltend die in neuerer und neuerer Zeit in der Praxis in Aufnahme gekommenen Färbemethoden: Schattfärberei mit Anilinschwarz, das Anilinschwarz; und andere auf der Färberei selbst zu entwickelnde Farben. Von Dr. H. Soxhlet. Mit 13 Abb. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.
- OLXXXV. Band. Die Untersuchung v. Feuerungs-Anlagen.** Eine Anleitung zur Untersuchung von Heizvorrichtungen von Hanns Freit. Düpfer v. Jönhorst. Mit 49 Abb. 28 Bogen. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.
- OLXXXVI. Band. Die Kognak- u. Weinsprit-Fabrikation,** sowie die Trester- u. Ose-Branntwein-Brennerei. Von Ant. dal Piaa. Mit 37 Abb. 12 Bogen. 8. Geh. 3 K 50 h = 3 Mark.
- OLXXXVII. Band. Das Sandstrahl-Gebläse im Dienste der Glasfabrikation.** Genane übersichtliche Beschreibung des Materialen und Fertigkeiten der Sobl- und Tafelgläser mittels des Sandstrahl-Gebläses, unter Zuhilfenahme von verschiedenen anderen Gebläsen und Umdruckverfahren. Von Wilh. Mertens. Mit 27 Abb. 7 Bogen. 8. Geh. 4 K 20 h = 2 Mark.
- OLXXXVIII. Band. Die Steingussfabrikation.** Für die Praxis bearbeitet von Gustav Steinbrecht. Mit 86 Abbild. 16 Bogen. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- OLXXXIX. Band. Die Fabrikation der Leuchtgas- nach den neuesten Einrichtungen.** Über Steins- und Braunkohlens-, Torf-, Holz-, Torf-, Le-, Petroleum-, Schiefer-, Knochens-, Walfett- und den neuesten Wasser- u. karbonisierten Leuchtgasen. Verwertung der Nebenprodukte, wie alle Leuchtgas-teile, Leuchtgasteröle, Paraffinwässer, Koks und Retortenrückstände. Von Dr. Georg Zehnius. Mit 155 Abb. 41 Bogen. 8. Geh. 8 K 80 h = 8 Mark.
- XC. Band. Anleitung zur Bestimmung des wirklichen Gehalts in den Naturerbsen u. c.** Von Karl Scherf. 7 Bogen. 8. Geh. 2 K 20 h = 2 Mark.
- XC. Band. Die Farben zur Dekoration von Steingut, Fayence und Majolika.** Eine kurze Anleitung zur Bereitung der farbigen Glasuren auf Earthenware, Fayence und auf ordinären Steingut, Majolika, der Farbstoffe, der Farbstoffe, Untergrundfarben, Aufglasuren, für feingelbe Fayencen u. c. Von G. B. Zwoboda. 9 Bogen. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.
- XCII. Band. Das Ganze der Färberei.** Gründliches Lehrbuch alles Wissens-Werten über Warenkunde, Färberei, Färberei und Verarbeitung der Färbstoffe. Von Paul Cabaus. Mit 72 Abbild. 28 Bogen. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.
- XCIII. Band. Die Champagner-Fabrikation und Erzeugung imprägnierter Schaumweine.** Von Antonio dal Piaa. Mit 63 Abbild. 18 Bogen. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- XCIV. Band. Die Negativ-Netouche nach Kunst- und Naturgesetzen.** Mit besonderer Berücksichtigung der Operation (Belichtung, Entwicklung, Exposition) und des photograph. Vorkommens. Von Hans Arnold. Mit 52 Abb. 34 Bogen. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.
- XCIV. Band. Die Verbleisungsgänge- und Kober-Verfahren** nebst den dazu gehörigen Apparaten und Utensilien. Nach praktischen Erfahrungen und Ergebnissen dargestellt von Dr. Theodor Koller. Mit 23 Abbild. 16 Bogen. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.
- XCVI. Band. Die Kunst der Glasmasse-Verarbeitung.** Genane übersichtliche Beschreibung der Herstellung aller Glasgegenstände, nebst Skizzierung der wichtigsten Stadien, welche die einzelnen Gläser bei ihrer Erzeugung durchzumachen haben. Von Franz Fischer. Mit 277 Abbild. 12 Bogen. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- XCVII. Band. Die Rattun-Druckerlei.** Ein praktisches Handbuch der Kleider-, Färberei, Druckerlei und Appretur der Baumwollgewebe. Von W. B. Wharton und W. S. Soxhlet. Mit 30 gedruckten Rattunproben, deren genaue Herstellung im Texte des Buches enthalten ist, und 39 Abbild. der neuesten Maschinen welche heute in der Rattun-Druckerlei Verwendung finden. 24 Bogen. 8. Geh. 8 K = 7 M. 20 Pf.
- XCVIII. Band. Die Herstellung künstlicher Blumen aus Blech, Welle, Band, Wachs, Leder, Federn, Schenkel, Haaren, Perlen, Fischschuppen, Muscheln, Wood und anderen Stoffen.** Von W. Braunsdorf. Mit 30 Abb. 10 Bogen. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.
- XCIX. Band. Praktischer Unterricht in der heutigen Wollenfärberei.** Enthaltend Wäscherei u. Karbonisierung, Alizarin-, Holz-, Säure-, Anilin- u. Wollfärberei-Färb. für feste Welle, Garne und Stücke. Von Louis Kau und Alwin Sompe. 11 Bogen. 8. Geh. 2 K 70 = 2 M. 50 Pf.
- CC. Band. Die Fabrikation der Stiefel- und der Leder-Konfektionsmittel.** Von E. G. Anders. Zweite Auflage. Mit 22 Abbild. 21 Bogen. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- CCI. Band. Färberei, Veredlung und Wännen der Färb- und Wännen u. anderer Gefäße.** Hand- u. Hilfsbuch für Färberei, Wännen und Färbfabrikanten u. a. Von Otto Boigt. Mit 104 Abbild. 22 Bogen. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.
- CCII. Band. Die Technik der Bildhauerei oder Theoretisch-praktische Anleitung zur Vorbereitung plastischer Kunstwerke.** Zur Selbstbelehrung, sowie zur Benutzung in Kunst- und Gewerbeschulen. Von Eduard Uhlenhuth. Mit 33 Abbild. 14 Bogen. 8. Geh. 2 K 70 h = 2 M. 50 Pf.

# A. Hartleben's Chemisch-technische Bibliothek.

OOIII. Band. Das Gesamtgebiet der Photokeramik oder sämtliche photographische Verfahren zur praktischen Darstellung keramischer Decorationen auf Porzellan, Fayence, Steingut und Glas. Von J. Köstling. Mit 12 Abbild. 8 Bog. 8. Geh. 2 K 20 h = 2 Mar.

OOIV. Band. Die Fabrikation des Rübensuckers. Ein Hilfs- und Handbuch für die Praxis und den Selbstunterricht, umfassend: die Darstellung von Roh- und Koniumsucker, Raffinade und Kandis. Die Erzeugungsvorfahren der Masse, sowie die Verwertung der Abfallprodukte der Zuckersfabrikation. Von Dr. Ernst Stenda. Mit 90 Abb. 22 Bog. 8. Geh. 5 K 50 h = 5 Mar.

OOV. Band. Vegetabilische und Mineral-Maschinenöle (Schmiermittel), deren Fixation, Raffinierung, Entsäuerung, Eigenschaften und Verwendung. Von Louis Edgar Andés. Mit 61 Abbild. 26 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mar.

OOVI. Band. Die Untersuchung des Zuckers u. zuckerhaltiger Stoffe, sowie der Hilfsmaterialien d. Zuckerindustrie. Von Dr. Ernst Stenda. Mit 93 Abb. 27 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mar.

OOVII. Band. Die Technik der Verbandstoff-Fabrikation. Handbuch der Herstellung und Fabrikation der Verbandstoffe, sowie der Antiseptica und Desinfektionsmittel. Von Dr. Theodor Koller. Mit 17 Abbild. 25 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mar.

OOVIII. Band. Das Konfervieren der Nahrungs- und Genussmittel. Fabrikation von Fleisch-, Fisch-, Gemüse-, Obst- u. Konerven. Von Louis Edgar Andés. Mit 39 Abbild. 29 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mar.

OOIX. Band. Das Konfervieren von Tierbälgen (Ausstopfen von Tieren aller Art) von Präparaten und allen Natur- und Kunsterzeugnissen mit Ausschluß der Nahrungs- und Genussmittel. Von Louis Edgar Andés. Mit 44 Abb. 21 Bog. 8. Geh. 5 K 50 h = 5 Mar.

OOX. Band. Die Mälerei. Ein Handbuch des Mälzereibetriebes. Umfassend: Die Rohmaterialien, Maschinen und Geräte der Mälzerei, Malzbrot- und Hochmälzerei, sowie die Anlage und Einrichtung moderner Mälzereianlagen und der Kollereifabriken. Von Richard Thaler. Mit 17 Tafeln (167 Abb.). 30 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mar.

OOXI. Band. Die Obstweinbereitung nebst Obst- u. Beeren-Branntweinbrennerei. Von Antonio das Paz. Mit 51 Abbild. 23 Bog. 8. Geh. 5 K = 4 M. 50 Pf.

OOXII. Band. Das Konfervieren des Holzes. Von Louis Edgar Andés. Mit 14 Abbild. 18 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mar.

OOXIII. Band. Die Wollschleiferei der ungepönten Baumwolle. Von Eduard Herzinger. Mit 2 Abbild. 6 Bog. 8. Geh. 2 K 20 h = 2 Mar.

OOXIV. Band. Das Raffinieren des Weinsteins und die Darstellung der Weinsäure. Mit Angabe der Prüfungsverfahren der Rohweinsteine auf ihren Handelswert. Von Dr. F. C. Stiefel. Mit 8 Abb. 7 Bog. 8. Geh. 2 K 20 h = 2 Mar.

OOXV. Band. Grundriss der Tonwaren-Industrie oder Keramik. Von Karl B. Smoboda. Mit 36 Abbild. 14 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mar.

OOXVI. Band. Die Brotbereitung. Umfassend: Die Theorie des Bäckerhandwerkes, die Beschreibung d. Rohmaterial. u. Von Dr. Wilhelm Berich. Mit 102 Abb. 7 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 M.

OOXVII. Band. Milch und Molkeerzeugnisse. Ein Handbuch des Molkeerbetriebes. Von Ferd. Haumeister. Mit 49 Abbild. und 10 Tabellen. 25 Bog. 8. Geh. 4 K 60 h = 6 M.

OOXVIII. Band. Die lichtempfindlichen Papiere der Photographie. Ein Leitfaden für Berufs- und Amateure-Photographen. Von Dr. F. C. Stiefel. Mit 21 Abbild. 13 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mar.

OOXIX. Band. Die Imprägnierungs-Technik. Handbuch der Darstellung aller säure-, alkalisierenden, wasserfesten u. feuerfesten Stoffe. Von Dr. Th. Koller. Mit 45 Abbild. 30 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mar.

OOXX. Band. Gummi arabicum und dessen Surrogate in festem und flüssigem Zustande. Von L. G. Anos. Mit 12 Abb. 16 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mar.

OOXXI. Band. Thomschlacke und natürliche Phosphate. Umfassend: Die Gewinnung und Eigenschaften, d. Thomschlacke, die Verarb. derselben für Düngungszwecke und die Anwendung des Thomschlacke-mehles in der Landwirtschaft. Von August Wiesner. Mit 28 Abbild. 18 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mar.

OOXXII. Band. Feuerlöcher, Geruchlos- und Wasserdrückmaschinen aller Materialien, die zu technischen und sonstigen Zwecken verwendet werden, mit einem Anhang: Die Fabrikation des Sauerbruns. Von Louis G. Andés. Mit 44 Abb. 20 Bog. 8. Geh. 5 K = 4 M. 50 Pf.

OOXXIII. Band. Papier-Spezialitäten. Praktische Anleitung zur Herstellung von den verschiedensten Zwecken dienenden Papierfabrikaten, wie Pergamentpapiere, Abreisspapiere, Konfervierungspapiere, Glaserpapiere, Feuerlöcher- und Sicherheitspapiere, Schlepppapiere, Pauste, Kopierpapiere u. Von Louis Edgar Andés. Mit 48 Abbild. 20 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mar.

OOXXIV. Band. Die Chanc-Verbindungen. Umfassend: Die Darstellung von Chancasäure, gelbem und rotem Blutlaugensalz, Berliner- und Turnbullsblau und allen anderen technisch wichtigen Chancverbindungen, sowie deren Anwendung in der Technik. Von Dr. Friedrich Feurerbach. Mit 25 Abbild. 17 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mar.

OOXXV. Band. Vegetabilische Fette und Öle, ihre praktische Darstellung, Reinigung, Verwertung zu den verschiedensten Zwecken, ihre Eigenschaften, Verwendungen und Untersuchung. Von Louis G. Andés. Mit 94 Abb. 24 Bog. 8. Geh. 5 K 50 h = 5 Mar.

OOXXVI. Band. Die Kälte-Industrie. Handbuch der prakt. Verwertung der Kälte in der Technik u. Industrie. Von Dr. Th. Koller. Mit 55 Abb. 29 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mar.

CCXXVII. Band. Handbuch der Waschanalyse. Umfassend das gesamte Gebiet der Titrier-Methoden. Von Dr. Wilhelm Berich. Mit 69 Abb. 36 Bog. 8. Geh. 8 K = 7 M. 20 Mf.	227
CCXXVIII. Band. Animalische Fette und Ole, ihre praktische Darstellung, Reinigung, Verwendung zu den verschiedensten Zwecken, ihre Eigenschaften, Verälfäschungen und Unterzuehung. Von Louis Edgar Andés. Mit 62 Abb. 18. Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Marf.	228
CCXXIX. u. CCXXX. Band. Handbuch der Farben-Fabrikation. Praxis u. Theorie. Von Dr. Stanis. Wieranski. In 2 Bänden. Mit 162 Abb. 73 Bog. 8. Geh. 15 K = 13 M. 50 Mf.	229
CCXXXI. Band. Die Chemie und Technik im Fleischergerwerbe. Von Georg Wengert. Mit 85 Abbild. 12 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Marf.	230
CCXXXII. Band. Die Verarbeitung des Strohes zu Geflechten u. Strohhiiten, Matten etc. Von Louis Edgar Andés. Mit 107 Abbild. 20 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Marf.	231
CCXXXIII. Band. Die Torf-Industrie. Handbuch der Gewinnung, Verarbeitung des Torfes im kleinen und groben Vertriebe, sowie Darstellung verschiedener Produkte aus Torf. Von Dr. Theodor Koller. Mit 28 Abbild. 14 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Marf.	232
CCXXXIV. Band. Der Eisenroß, seine Bildung, Gefahren und Verhütung unter besonderer Berücksichtigung der Verwendung des Eisens als Bau- und Konstruktionsmaterial. Von Louis Edgar Andés. Mit 62 Abb. 21 Bog. 8. Geh. 5 K 50 h = 5 Marf.	233
CCXXXV. Band. Die technische Verwertung von tierischen Kadavern, Kadaver-tetten, Schlachtabfällen u. s. w. Von Dr. H. Gaeßde. Mit 27 Abbild. 20 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Marf.	234
CCXXXVI. Band. Die Kunst des Färbens und Beizens von Marmor, künstlichen Steinen, von Knochen, Horn und Elfenbein und das Färbn und Imittieren von allen Holzsorten. Ein praktisches Handbuch f. Tischler, Drechler etc. Von H. S. Soghet. 17 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 M.	235
CCXXXVII. Band. Die Dampfwäscherei. Ihre Einrichtung und Betrieb. Enthaltend Beschreibung der dabei benützten Maschinen, Waschprozessen und Chemikalien. Von Dr. G. C. Stiefel. Mit 28 Abb. 12 Bog. 8. Geh. 2 K 40 h = 2 M. 25 Pf.	236
CCXXXVIII. Band. Die vegetabilischen Faserstoffe. Ein Atlas- und Handbuch für die Praxis. Von Mar. Böttler. Mit 21 Abbild. 15 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Marf.	237
CCXXXIX. Band. Die Fäbrication der Papiermache- und Papierstoff-Waren. Von Louis Edgar Andés. Mit 125 Abbild. 25 Bog. 8. Geh. 5 K 50 h = 5 Marf.	238
CCXL. Band. Die Herstellung großer Glaskörper bis zu den neuesten Fortschritten. Von Karl Wegel. Mit 104 Abbild. 13 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Marf.	239
CCXLI. Band. Der rationelle Betrieb der Essig-Fäbrication und die Kontrolle derselben. Eine Partheil. d. Essig-Fäbr. Von Dr. A. Berich. Mit 68 Abb. 22 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 M.	240
CCXLII. Band. Die Fäbrication von Stärkezucker, Dextrin, Maltosextrakt, Invertzucker- und Invertzucker-Fabrikanten. Von Dr. Wilhelm Berich. Mit 58 Abbild. 27 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Marf.	241
CCXLIII. Band. Das Gasglühlicht. Die Fäbrication der Glühbirne (= Strümpfer). Von Prof. Dr. L. Castellani. Autorisierte Uebersetzung und Bearbeitung von Dr. M. L. Wacjewski. Mit 32 Abbild. 9 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Marf.	242
CCXLIV. Band. Die Verarbeitung von Glaskörpern bis zu den neuesten Fortschritten. Von Karl Wegel. Mit 155 Abbild. 17 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Marf.	243
CCXLV. Band. Städtische und Fabrikabwässer. Ihre Natur, Schädlichkeit und Reinigung. Von Dr. H. Gaeßde. Mit 80 Abbild. 32 Bog. 8. Geh. 8 K 80 h = 8 Marf.	244
CCXLVI. Band. Der praktische Destillateur und Spirituosenfabrikant. Hand- und Hilfsbuch f. Destillateure etc. Von August Haber. Mit 67 Abbild. 19 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 M.	245
CCXLVII. Band. Der Gips und seine Verwendung. Handbuch für Bau- und Maurermeister, Stuckateure, Modelleure, Bildhauer, Gipsgießer u. s. w. Von Marco Pedrotti. Mit 45 Abbild. 19 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Marf.	246
CCXLVIII. Band. Der Formaldehyd. Seine Darstellung und Eigenschaften, seine Anwendung in der Technik und Medizin. Bearbeitet von Dr. L. Vanino und Dr. G. Seittler. Mit 10 Abbild. 9 Bog. 8. Geh. 2 K 20 h = 2 Marf.	247
CCXLIX. Band. Die Fäbrication des Feldspat-Porzellans. Für die Praxis bearbeitet und verfaßt von Hans Grimm. Mit 69 Abbild. 14 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Marf.	248
CCCL. Band. Die Serums, Bacterientoxin- und Organ-Präparate. Ihre Darstellung, Wirkungsweise und Anwendung. Für Chemiker, Apotheker, Ärzte, Bacteriologen etc. Von Dr. pharm. Mar. v. Waldheim. 28 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Marf.	249
CCCLI. Band. Die keramische Praxis. Erzeugung keramischer Produkte aller Art, unter Berücksichtigung der einschlägigen Maschinen und sonstiger Vorapparate zur Bereitung von Massen und Glasuren. Von J. B. Schamberger. Mit 39 Abbild. 16 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Marf.	250
CCCLII. Band. Die Technik der Kosmetik. Ein Handb. d. Fabrik., Verwertung u. Prüfung aller kosm. Stoffe u. d. kosm. Spezialitäten. Von Dr. Th. Koller. 20 Bog. 8. Geh. 5 K 50 h = 5 Marf.	251
CCCLIII. Band. Die animalischen Faserstoffe. Ein Hilfs- und Handbuch für die Praxis. Von Mar. Böttler. Mit 16 Abbild. 16 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Marf.	252
CCCLIV. Band. Die organischen Farbstoffe tierischen und pflanzlichen Ursprungs und deren Anwendung. Von Albert Berghoff. Mit 50 Abbild. 27 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Marf.	253
CCCLV. Band. Blattmetalle, Bronzen und Metallpapiere, deren Herstellung und Anwendung. Von Louis Edgar Andés. Mit 30 Abbild. 22 Bog. 8. Geh. 5 K 50 h = 5 Marf.	254
CCCLVI. Band. Die Chantallum-Laugung von Goldzerzen. James Park's »Cyanide-Process of Gold Extractions« frei bearb., vermehrt und eingeleitet von Ernst Victor. Autorisierte Ausgabe. Mit Titelbild und 14 Tafeln und 15 Abbild. 15 Bog. 8. Geh. 5 K 50 h = 5 Marf.	255

- COLVII. Band. Die Kunitzfreie. Eine Schilderung der Darstellung aller Arten künstlicher  
Steinmassen, namentlich der Schwämme, Schlacken, Zement-, Gips- und Magnesia-Steine etc. Von  
Sigmund Lehner. Mit 65 Abbild. 25 Bogen. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.
- COLVIII. Band. Der Aluminiumdruck. (Algraphie.) Seine Einrichtung und Ausübung  
in der Lithogr. Pragis. Von Karl Weilandt. Mit 12 Abbild. 6 Bogen. 8. Geh. 2 K 20 h = 2 Mark.
- COLIX. Band. Das Gas und seine moderne Anwendung. Von Paul Frenzel. Mit  
179 Abbild. 17 Bogen. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- COLX. Band. Die Konfervierung von Traubenmost, Fruchtstäben u. die Herstellung  
alkoholfreier Getränke. Von Antonio dal Bias. Mit 63 Abbild. 14 Bogen. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.
- COLXI. Band. Die Patina. Ihre natürliche und künstliche Bildung auf Kupfer und dessen  
Legierungen. Bearbeit. von Dr. L. Vanino und Dr. G. Seitter. 6 Bogen. 8. Geh. 2 K = 1 M. 80 Pf.
- COLXII. Band. Das Studium der Chemie. Von Alfred Toepper. 7 Bogen. 8. Geh.  
1 K 60 h = 1 M. 50 Pf.
- COLXIII. Band. Isoliermaterialien und Wärme-(Kälte-)Schutzmassen. Von Eduard  
Feltone. Mit 38 Abbild. 22 Bogen. 8. Geh. 5 K = 4 M. 50 Pf.
- COLXIV. Band. Die Fabrication der Eiswaren, sowie Strumpfwaren und  
deren Kalkulation. Von Wilhelm Heiser. Mit 220 Abbild. 17 Bogen. 8. Geh. 5 K 50 h = 5 Mark.
- COLXV. Band. Die praktische Federherstellung. Von Robert Durckhardt. Mit 32 Ab-  
bild. 11 Bogen. 8. Geh. 3 K = 2 M. 70 Pf.
- COLXVI. Band. Die Holzbiegerei und die Herstellung der Möbel aus gebeugtem Holz.  
Von Louis Edgar Andés. Mit 117 Abbild. 19 Bogen. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- COLXVII. Band. Die künstliche Kühlung. Isolation gegen Feuchtigkeit und gegen  
Elektrizität. Von Alphonse Fortner. Mit 20 Abbild. 18 Bogen. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- COLXVIII. Band. Die Handelspflanzen Deutschlands. Ihre Verbreitung, wirtschaftliche  
Bedeutung und technische Verwendung. Von Dr. phil. F. W. Neger. Mit 20 Abbildungen. 14 Bogen.  
8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.
- COLXIX. Band. Cellulose, Celluloseprodukte und Kautschuksubstitute. Eine Dar-  
stellung der Bereitung von Cellulose, Pergamentcellulose, der Gewinnung von Zucker, Alkohol etc.  
Von Dr. Josef Berich. Mit 41 Abbildungen. 27 Bogen. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.
- COLXX. Band. Anleitung zur Ausführung textildemischer Untersuchungen. Methoden  
zur Prüfung der in der Textilindustrie verwendeten Materialien. Zum Laboratoriums-Gebrauch. Von  
Dr. Arthur Müller. Mit 20 Abbild. 13 Bogen. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.
- COLXXI. Band. Praktisches Rezeptbuch für die gefärbte Leder- und Farben-Industrie.  
Von Louis Edgar Andés. 30 Bogen. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.
- COLXXII. Band. Praktisches Rezeptbuch für die geäufte Seife, Öl-, Seifen- und  
Schmiermittel-Industrie. Von Louis Edgar Andés. 29 Bogen. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.
- COLXXIII. Band. Wie eine moderne Eerdestillation mit Dampfabenfabrik eingerichtet  
sein muß. Von Willm Beterion-Münberg. Mit 77 Abb. u. 1 Tafel. 16 Bogen. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- COLXXIV. Band. Die Praxis und Betriebskontrolle der Schwefelsäure-Fabrication  
für den Chemiker etc. Von Dr. S. Mierinski. Mit 19 Abbild. 18 Bogen. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 M.
- COLXXV. Band. Alkaloide, Farbstoffe, farbige Kreiden und Pastellstifte, Mauerkalk-  
farben, Tusch und ihre Herstellung nach bewährten Verfahren. Von August Buchwald. Mit  
113 Abbild. 20 Bogen. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- COLXXVI. Band. Die Industrie der verdichteten und verflüssigten Gase. Von Tr.  
G. Lohmann. Mit 70 Abbild. 22 Bogen. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- COLXXVII. Band. Unsere Lebensmittel. Eine Anleitung zur Kenntnis der wichtigsten  
Nahrungsmittel. Von Dr. Alfred Haeffl. Mit 3 Abb. 24 Bogen. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.
- COLXXVIII. Band. Die analytischen Reaktionen der technisch wichtigen Elemente. Mit  
Anhang. Von Dr. Alexander Juch. Mit 19 Abbild. 11 Bogen. 8. Geh. 2 K 20 h = 2 Mark.
- COLXXIX. Band. Die Chrombeizen. Ihre Eigenschaften und Verwendung. Von Emil h.  
Hallerbach. 9 Bogen. 8. Geh. 2 K 20 h = 2 Mark.
- COLXXX. Band. Die technische Verwertung des Torfes und seiner Destillations-  
Produkte. Von Tr. Georg Henning. Mit 78 Abbild. 30 Bogen. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.
- COLXXXI. Band. Die Destillation der Harze, die Resinatlacke, Resinifarben, die  
Rohharze und Harze für Säuremaschinen. Von Viktor Schwenke. Mit 68 Abbild.  
23 Bogen. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.
- COLXXXII. Band. Die Wasserfarben und Malmitte!. Eine Darstellung der Eigenschaften  
aller im Handel vorkommenden Farben und Malmitte!, erlaube und im laubende Anlege und Ver-  
fälschungen. Von Dr. Josef Berich. Mit 4 Abbild. 24 Bogen. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.
- COLXXXIII. Band. Die Harzprodukte. Gewinnung und Verwertung der Rohharze. Von  
Louis Edgar Andés. Mit 87 Abbild. 28 Bogen. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.
- COLXXXIV. Band. Die mechanischen Vorrichtungen der chemisch-technischen Betriebe.  
Von Friedrich Meißner. Mit 220 Abbild. 28 Bogen. 8. Geh. 8 K 80 h = 8 Mark.
- COLXXXV. Band. Die Industrie der alkoholfreien Getränke. Von Dr. G. Lohmann.  
Mit 87 Abbild. 26 Bogen. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.
- COLXXXVI. Band. Die farbigen, bunten und vergierten Gläser. Eine Anleitung zur Dar-  
stellung farbiger u. vergierter Gläser. B. Paul Randau. Mit 17 Abb. 24 Bogen. 8. Geh. 5 K 50 h = 5 M.
- COLXXXVII. Band. Handbuch der Zweifachstufen-Industrie. Von Dr. Theodor Müller.  
Mit 8 Abbild. 26 Bogen. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.
- COLXXXVIII. Band. Das Natrium. Von Robert Toepper. Mit 11 Abb. 14 Bogen. 8.  
Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.
- COLXXXIX. Band. Märgung und Filtration alkoholfaltiger Flüssigkeiten. Von Prof.  
Max Botter. Mit 25 Abbild. 15 Bogen. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.
- CCXC. Band. Die Alkaloide. Von Heinrich Bittner. Mit 57 Abbild. 31 Bogen.  
8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.



- CCXCVI. Band. Die Unternehmung und Vertheilung des Wieres. Von Josef Kraeger. 2  
Mit 30 Abbild. 11 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.
- CCXCVII. Band. Die moderne Gravirkunst. Geschichte und Technik d. Gravirens. Dar- 2  
gestellt von C. J. Stahl. Mit 55 Abbild. 20 Bog. 8. Geh. 5 K 50 h = 5 Mark.
- CCXCVIII. Band. Die Schmelzung der Hohl-, Zylinder-, Press-, Tafel- und Kesselgläser 2  
m. ihren versch. Rohmaterial., Sägen u. Mören, B. Hans Schurpfeil. 16 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- CCXCIX. Band. Die Alpkalitäts-Industrie. Eine Darstellung der Eigenschaften der natürlichen 2  
und künstl. Alpkalite. Von Felix Zinckenberg. Mit 46 Abb. 22 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.
- CCXC. Band. Schreib-, Kopier- und andere Tinten. Praktisches Handbuch der Tinten- 2  
fabrikation. Von Louis Edgar Andés. Mit 8 Abb. 17 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.
- CCXCVI. Band. Die Knopffabrikation. Von Wilhelm Lutter. Mit 68 Abbild. 18 Bog. 8. 2  
Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- CCXCVII. Band. Kaffee, Kaffeeconserven u. Kaffeejurrogate. Darstell. d. Vorkommens u. 2  
b. Zubereitung v. Bohnenkaffee etc. Von Edwin Krause. Mit 32 Abb. 16 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.
- CCXCVIII. Band. Technik d. Dekorierung keramischer Waren. Darstellung a. Verfahren zur 2  
Verzierung v. Steingut etc. Von Rudolf Gaidach. Mit 22 Abbild. 22 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.
- CCIX. Band. Chemisch-technische Rezepte und Notizen für die Zahnpraxis. Von 2  
Alfred Seblacek. 2. Aufl. 27 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.
- CCC. Band. Die künstlichen Kuchend- und Wäandebekläge. Von Robert Scherer. Mit 3  
46 Abbild. 24 Bog. 8. Geh. 5 K 50 h = 5 Mark.
- CCCI. Band. Kofasbutter und andere Kunstseifensette. Von Louis Edgar Andés. 3  
Mit 37 Abbild. 17 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- CCCH. Band. Chemie der gesanten Lindustrie. Von J. M. Rohmägler. Mit 9 Abbild. 3  
10 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.
- CCCH. Band. Erdwachs (Ceresin), Paraffin und Montanwachs. Von Rudolf Gregorius. 3  
Mit 32 Abbild. 20 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- CCCH. Band. Das Härden des Holzes durch Imprägnierung. Von Josef Piirer jr. 3  
Mit 11 Abbild. 6 Bog. 8. Geh. 2 K 20 h = 2 Mark.
- CCCV. Band. Das Natriumhyperoxyd. Von Dr. L. Vanino. Mit 6 Abbild. 7 Bog. 8. 3  
Geh. 2 K 20 h = 2 Mark.
- CCCVI. Band. Der Zieglermeister in Theorie und Praxis. Von Julius v. Püf. Mit 3  
60 Abbild. 18 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- CCCVII. Band. Das Meiningewerk. Von Dr. Georg Gurnik, Ingenieur. Mit 14 Abbild. 3  
5 Bog. 8. Geh. 2 K 20 h = 2 Mark.
- CCCVIII. Band. Zelluloid und seine Verarbeitung. Von Louis Edgar Andés. Mit 3  
69 Abbild. 26 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.
- CCCVIX. Band. Toxikologie oder die Lehre von den Giften. Von J. M. Rohmägler. 3  
11 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.
- CCX. Band. Der Magnetit. Von Rob. Scherer. Mit 22 Abbild. 18 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h 3  
= 4 Mark.
- CCCXI. Band. Die Zurrogate in der Lach-, Nitris- und Karbonfabrikation. Von 3  
L. E. Andés. Mit 25 Abbild. u. 1 Tafel. 25 Bog. 8. Geh. 6 K 60 h = 6 Mark.
- CCCXII. Band. Das Amalgamsilber und ähnliche Sprengstoffe. Von Ing. ehem. Dr. 3  
R. Stroff. Mit 39 Abbildungen u. 1 Tafel. 14 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- CCCXIII. Band. Die Färbung des Stabes auf Straßen und Wegen etc. Von Louis 3  
Edgar Andés. Mit 31 Abbild. 22 Bog. 8. Geh. 5 K 50 h = 5 Mark.
- CCCXIV. Band. Der Viennehonig und seine Grogmittel. Von Dr. phil. Alfred 3  
Hastert. Mit 63 Abbild. 17 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.
- CCCXV. Band. Die Fabrikation der Gemüskonserven. Von Dr. J. Tr. Mit 24 Abbild. 3  
11 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.
- CCCXVI. Band. Kugbaumwolle und andere Kugmaterialien. Von Friedr. Pollen. 3  
Mit 44 Abbild. 21 Bog. 8. Geh. 5 K 50 h = 5 Mark.
- CCCXVII. Band. Kugholzgewinnung und Kugwerkeigenschaften des Holzes. Von 3  
Eugen Paré. Mit 37 Abbild. 14 Bog. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- CCCXVIII. Band. Die Dune. Von Dr. H. Koblant. 10 Bog. 8. Geh. 2 K 20 h = 2 Mark. 3  
CCCXIX. Band. Limonaden und alkoholfreie Getränke. Von S. Timm. Mit 29 Abbild. 3  
14 Bog. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.
- CCXX. Band. Wachs, Bleich-, Wachs-, Stärke- und Glanzmittel. Von L. E. Andés. 3  
Mit 18 Abbild. 24 Bog. 8. Geh. 5 K 50 h = 5 Mark.
- CCXXI. Band. Chemisches Kunstbuch für Fabrikanten, Gewerbetreibende und Landwirte. 3  
Von S. Krause. Mit 7 Abbildungen. 19 Bogen. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- CCXXII. Band. Der Tafelstein (Marmor). Von Dr. Fried. Hastert. Mit 56 Abb. und 3  
3 Tafeln. 13 Bogen. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.
- CCXXIII. Band. Der Graphit. Amerikanische Monographie. Von Ingenieur A. Gaedig. Mit 3  
29 Abb. 16 Bogen. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- CCXXIV. Band. Die flüssigen Heizmaterialien. Von J. M. Rohmägler. Mit 35 Abb. und 3  
3 Tafeln. 7 Bogen. 8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.
- CCXXV. Band. Der Zementgel und seine Industrie. Von A. Gaedig. Mit 45 Abb. 9 Bog. 3  
8. Geh. 3 K 30 h = 3 Mark.
- CCXXVI. Band. Kautschuk und kohlensaure Verseifung. Von L. Mörner. Mit 32 Abb. 3  
12 Bogen. 8. Geh. 4 K 40 h = 4 Mark.
- CCXXVII. Band. Vertikung von Ungezieser und Unkraut. Von L. E. Andés. Mit 16 Abb. 3  
23 Bogen. 8. Geh. 5 K 50 h = 5 Mark.

In Ganzleiwandbänden, Kustag pro Band 90 h - 80 Pf zu den obenbemerkten Preisen.

**A. Hartleben's Verlag in Wien und Leipzig.**



Die Vertilgung

von

Angeziefer und Unkraut.

---

1

Ag. ric.  
Grop. 57  
K

# Die Vertilgung von Ungeziefer und Unkraut.

Von  
**Louis Edgar Andés.**

Mit 16 Abbildungen.



Wien und Leipzig.  
W. Hartleben's Verlag.  
1910

(Alle Rechte vorbehalten.)

SD  
611  
Ab

## Vorwort.

Die Ungezieferplage, trete sie nun im Felde oder im Walde, im Hause an Gebrauchsgegenständen oder in ihrer unangenehmsten Form an Mensch und Tier heran, ist ein Kampf ums Dasein, denn auch das kleinste Lebewesen muß durch Nahrung für seine Erhaltung sorgen und es ist ebenso wie jedes andere größere und größte seiner Art auf die Welt gesetzt worden — zu Zwecken, denen wir vielfach unwissend gegenüberstehen. Aber sie sind vorhanden, sie machen sich unausgesetzt bemerkbar, schwellen dort, wo ihnen die Bedingungen für ihre Entwicklung geboten sind, zu Massen an, die schweren Schaden an den Gütern des Menschen bringen. Der Mensch führt einen unausgesetzten Kampf gegen diese ungezählten Arten pflanzlicher und tierischer, größerer und kleinerer Lebewesen, er sucht sie allenthalben zu vernichten oder doch ihre Vermehrung einzudämmen, und in diesen Kämpfen die geeigneten Vorkehrungen und Mittel zu weihen, ist die Aufgabe des Verfassers dieses Buches gewesen. Wohl gibt es eine zahlreiche Literatur, die die gleiche Materie behandelt, aber dieselbe befaßt sich in fast allen Fällen nur mit bestimmten Klassen der Schädlinge — es gibt auch in Fachschriften zahlreiche Anleitungen und Verhaltensmaßregeln, Berichte über Fortschritte auf diesem Gebiete — aber alle diese Behelfe bieten dem Interessenten nur mit einem bedeutenden Aufwand an Zeit und Mühe das, was er für seine Zwecke braucht. Der Verfasser dieses Buches hat vor Augen gehabt, ein Kompendium der Vertilgung der pflanzlichen und tierischen Schädlinge zu schaffen und hofft, dieser Aufgabe, die ja gewiß keine kleine ist, gerecht geworden zu sein.

Louis Edgar Audés.

ye  
ti

3

3

# Inhaltsverzeichnis.

	Zeit
<b>Vorwort</b> . . . . .	V
<b>Einleitung</b> . . . . .	1
Pflanzenkrankheiten. — Pflanzliche Parasiten oder Schmarogergewächse. — Tierische Schädlinge. — Un- geziefer, Schmaroger, Parasiten. — Wanderheuschrecken. — Kiefernspanner. — Verheerungen der Honne. — Verheerungen durch den Borkenkäfer. — Neblaus. — Regenwürmer. — Waldameisen. — Nützliche Vögel. — Fliegen. — Küchenschabe. — Igel.	
<b>Allgemeine Übersicht über die pflanzlichen und tieri- schen Schädlinge</b> . . . . .	25
Pflanzliche Schädlinge . . . . .	25
Krankheiten des Weinstocks . . . . .	25
Tierische Schädlinge . . . . .	27
Feldschädlinge . . . . .	27
Obstbaumschädlinge . . . . .	27
Obstbäume. — Schwammspinner.	
Forstliche Schädlinge . . . . .	29
Borkenkäfer . . . . .	29
Bastkäfer. — Splintkäfer. — Nutholzborrkäfer.	
Bochkäfer . . . . .	31
Blattkäfer. — Brachtkäfer. — Schnellkäfer. — Schmetterlinge. — Prozessionsspinner. — Kiefern- blattwespen. — Maulwurfsgrille.	
Nebenschädlinge . . . . .	33
Küchengartenschädlinge . . . . .	33
Blumengartenschädlinge . . . . .	33
<b>Allgemeine Übersicht über Ungeziefer, das Menschen und Tiere belästigt</b> . . . . .	34
1. Schädlinge und lästiges Ungeziefer im Hause, an Haus- geräten, Gebrauchsgegenständen und Nahrungsmitteln	34
2. Parasiten der Menschen und Tiere . . . . .	35

<b>Allgemeines über Mittel zur Bekämpfung der Insekten-schädlinge auf dem Felde, in Gärten, Obst- und Weinrebenanlagen</b>	36
Arbeiten des Land- und Gartenwirthes . . . . .	40
Zusammenstellung der Pflanzenschädlinge nach Monaten	41
<b>Allgemeines über Mittel zur Bekämpfung von Insekten-schädlingen in Forsten</b>	46
Verbreitung der Forstschädlinge — Mittel zur Verhütung der Insekten-schäden. — Vertilgung. — Vorbeugungsmittel. — Allgemeine Mittel gegen Forstschädlinge. — Elektrisches Licht. — Spanische Fliegen. — Schnopfergallwespe. — Fleischfressende Insekten. — Mückenfliegen. — Pflanzenläuse.	
<b>Mittel zur Bekämpfung pflanzlicher und tierischer Schädlinge auf Pflanzen jeder Art</b>	57
Bekämpfungsmittel. — Wirkungsweise. — Anorganische Stoffe. — Organische Stoffe. — Weinorganische Stoffe. — Vorbeugende Mittel. — Insekten-tödtende Mittel. — Bekämpfung niederer Pilze. — Anforderungen an die Vertilgungsmittel.	
Kupfervitriol und Kupfersalz-Compositionen in fester und flüssiger Form als Bekämpfungsmittel für tierische und pflanzliche Schädlinge . . . . .	72
Bouille rationelle hydrocuprique. — Oregonbrühe. — Kalifornische Brühe. — Nach Dr. Zucker. — Nach Dammer. — Bordeaux-Solution. — Azurin, auch Eau céleste. — Bouille unique usage. — Seufelder Kupferjoda.	
Kupfervitriol-Kalkpulver . . . . .	78
Kupfer-Kalkbrühe. — Kupfer-Zucker-Kalkpulver.	
Arsenkupferlösungen gegen Pflanzenschädlinge an Feldfrüchten, Obstbäumen und in Weingärten nach Riche . . . . .	80
Schweinfurtergrünbrühen . . . . .	81
Harzaures Kupfer u. als Ungeziefervertilgungsmittel	81
Eisenvitriol . . . . .	82
Eisenvitriollösungen gegen niedere Pilze . . . . .	82
Karbolineum . . . . .	83
Wasserlösliches Karbolineum.	
Wasserlösliches Obstbaumkarbolineum . . . . .	89
Truncus Carbolineum Plantarium. — Folia Carbolineum Plantarium. — Wasserlösliches Kreosotöl. — Emulgiertes Teeröl.	
Prüfung wasserlöslicher Karbolineumsorten . . . . .	95
Prüfung auf Wasserlöslichkeit und Wassergehalt.	




	Seite
Schwefelkohlenstoff und -emulsionen . . . . .	97
Schwefelkohlenstoff-Emulsionen . . . . .	99
Petroleum . . . . .	99
Petroleumpulver . . . . .	100
Petroleum-Emulsionen . . . . .	101
Tabak als Bekämpfungsmittel von Ungeziefer . . . . .	102
Tabakertrakt. — Tabakrauch.	
Verschiedene Tabakertrakt-Präparate . . . . .	104
Maupenleime . . . . .	106
Beringscher Brumataleim.	
Verschiedene Ungeziefer-Vertilgungsmittel . . . . .	109
1. Gegen Müssen, Schaben und größere Käfer . . . . .	109
2. Das Ungeziefer-Vertilgungsmittel »Puffi« . . . . .	109
3. Nach Verein. Staat. Pat. Nr. 896.094 . . . . .	110
4. Nach Ferdinand von Stranz in Berlin . . . . .	110
5. Nach Emil Eskenasy in Pansdorf . . . . .	110
6. Nach E. Fichtenau . . . . .	111
7. Nach Dr. F. Sauer in Potsdam . . . . .	111
8. Knodolin . . . . .	111
9. Clair von Valmorel . . . . .	111
10. Keletis Antispore . . . . .	111
11. Tur von Grmisch . . . . .	112
12. Zenters Antidin . . . . .	112
13. Insektenvertilgungsmittel »Tineol« . . . . .	112
14. Schaben- und Rattenpulver . . . . .	112
15. Rattenwurst . . . . .	112
16. Apteripte . . . . .	113
17. Nichteninseife zur Vertilgung von Ungeziefer . . . . .	113
18. Hanföl gegen Hautschmaröer . . . . .	113
19. Harz- und Ol-Seifenlösungen . . . . .	113
20. Herrings Masse zum Besprühen von Obstbäumen . . . . .	114
21. Holzöluchen . . . . .	114
22. Vertilgen von Insekten und Larven in Drogen . . . . .	115
23. Insektenvertilgungsmittel von R. Bosch . . . . .	115
24. Insektenvertilgungsmittel von Brda . . . . .	115
25. Insektenvertilgungsmittel in flüssiger Form . . . . .	116
26. Insecticide liquide . . . . .	117
27. Krämers Plantol . . . . .	118
28. Mittel von Pierre Ducaniet . . . . .	118
29. Parasitol . . . . .	118
30. Pyrethrum-Seifenextrakt . . . . .	119
31. Quassiaholzertrakt . . . . .	119
32. Rubina . . . . .	121
33. Mittel, um Vögel, Mäuse usw. von Obstbäumen abzuhalten . . . . .	121

	Seite
Mittel gegen pflanzliche Schädlinge . . . . .	122
Bekämpfung des Heberichs . . . . .	122
Mittel gegen die Herbstzeitlose . . . . .	122
Mittel gegen den Startoßelpilz . . . . .	124
Mittel gegen die Schleieide . . . . .	125
Mittel gegen den Meltau der Rosen . . . . .	126
Mittel gegen den Meltau der Neben . . . . .	127
Mittel gegen die Mistel . . . . .	128
Vertilgen von Moos und Flechten an Bäumen . . . . .	129
Vertilgen des Mooses auf Rasenflächen . . . . .	129
Mittel zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten auf Pflanzen . . . . .	130
Mittel gegen den Rostpilz auf Spargelfeldern . . . . .	131
Mittel gegen den Schwamm (Holz-, Gebäude-, Haus-, Uder- und Mauer Schwamm) . . . . .	131
Wurzelschwamm. — Mstral. — Antiformin. — Anti- merulion. — Antinonin. — Chlor. — Chlorkalk. — Formalin. — Kreosot. — Kupfervitriol. — Kochsalz. — Eisenvitriol. — Nitrosol. — Mineralsäuren. — Mycothanaton. — Quecksilberchlorid. — Antifungin. — Antipolypin.	
Mittel gegen Baumschwämme (Polyporusarten) . . . . .	146
Mittel gegen tierische Schädlinge . . . . .	147
Mittel gegen Ameisen . . . . .	147
Imprägnierflüssigkeit, um Holz vor Ameisen zu schützen . . . . .	149
Mittel gegen Bienen und Wespen . . . . .	149
Vertilgung von Wespennestern . . . . .	152
Mittel gegen Blattläuse . . . . .	153
Neßlerische Flüssigkeit	
Mittel gegen Blutegel in Fischteichen . . . . .	156
Mittel gegen Blutläuse . . . . .	156
Kalkanstrich gegen die Blutlaus . . . . .	160
Neßlerische Blutlaustinktur . . . . .	161
Petroleummulsion gegen Blutläuse . . . . .	161
Tabakertrakt-Seifenlösung gegen Blutläuse . . . . .	162
Mittel gegen Erdflöhe . . . . .	162
Pulver gegen Erdflöhe nach Whitehead . . . . .	163
Mittel gegen den Heu- und Sauerwurm . . . . .	163
Mittel gegen Grillen (Hausgrillen, Heimchen) . . . . .	165
Mittel gegen Heuschrecken . . . . .	166
Mittel gegen Hülsenfrüchte-Schädlinge . . . . .	167
Mittel zum Abhalten von Erbsefeldern . . . . .	168
Mittel gegen Stellerasseln und Tausendfüßer . . . . .	168
Mittel gegen Kohlweißlingraupen . . . . .	169
Mittel gegen Maikäfer und Engerlinge . . . . .	170
Mittel gegen die Maulwurfsgrille . . . . .	172

	Seite
Mittel gegen Raupen im allgemeinen . . . . .	174
Mittel gegen Raupen an Obstbäumen . . . . .	176
Gegen Fusilladium und Obstmade . . . . .	177
Mittel gegen den Rübenrüßelfäfer . . . . .	178
Mittel gegen Schildläuse . . . . .	178
Mittel gegen Schnecken . . . . .	180
Mittel gegen Schädlinge der Spargelpflanzen . . . . .	182
1. Gegen Spargelfäfer . . . . .	182
2. Gegen Spargelfliegen . . . . .	184
Gegen Spargelrost . . . . .	
Mittel gegen die Wachsmotte in Bienenstöcken . . . . .	186
Mittel gegen den Weidenbohrer . . . . .	187
Mittel gegen Würmer in der Erde . . . . .	187
Gegen den Drahtwurm . . . . .	189
Mittel gegen die Zwiebelliege . . . . .	189
Singvögel als Mittel gegen Insekten an Obstbäumen . . . . .	190
<b>Vorrichtungen für die Anwendung der chemischen</b>	
<b>Vertilgungsmittel</b> . . . . .	191
Flüssigkeitszerstäuber . . . . .	192
Schwefelkohlenstoff-Injektor . . . . .	195
Pulver- und Schwefelzerstäubungsapparate . . . . .	196
<b>Mechanische Insekten- (und Schädlinge-) Vertilgungs-</b>	
<b>vorrichtungen</b> . . . . .	200
Leimringe, Leimstangen und Leimzäune gegen	
Forstschädlinge . . . . .	200
Leimringe gegen Raupen an Obstbäumen . . . . .	202
Obstbaum-Madenfalle . . . . .	203
Anlegen von Heuseilen gegen Baumschädlinge . . . . .	204
Fangrinden, Fangknüppel und Fangreisigbündel . . . . .	204
Eingraben von Brutknüppeln . . . . .	205
Fangbäume zur Vertilgung von Forstschädlingen . . . . .	205
Fanggräben zur Vertilgung von Forstschädlingen . . . . .	205
Insektenglas von Broffard . . . . .	206
Fanggläser an Obstbäumen . . . . .	207
Mechanische Mittel zur Abhaltung von Ameisen . . . . .	208
Raupenfackeln . . . . .	209
Raupenscheren . . . . .	210
Rattenfalle nach Brehm . . . . .	212
Leicht herstellbare Rattenfalle . . . . .	212
<b>Mittel gegen Schädlinge und lästiges Ungeziefer im</b>	
<b>Hause, an Hausgeräten, Gebrauchsgegenständen und</b>	
<b>Nahrungsmitteln</b> . . . . .	213
Mittel gegen Motten (Schaben) . . . . .	219
Mottenpulver. — Mottenpulver Antipatrin.	
Mottentinkturen — Thymolin. — Antimottein	

	Seite
Mottenpapier . . . . .	228
Mittel gegen Schaben, Rissen usw. . . . .	228
Spinnenpulver . . . . .	231
Ungeziefer in Gartenhäusern und Hütten . . . . .	231
Bücherfresser . . . . .	231
Mittel zur Vertilgung des Pfahlwurmes und der Fingerringel bei Holzbaulichkeiten in Seewasser . . . . .	233
Mittel gegen Wildverbiss . . . . .	236
Behandlung von Saatgut gegen Vogelfraß . . . . .	237
<b>Mittel gegen Ungeziefer an Menschen und Tieren . . . . .</b>	<b>238</b>
Wanzen. — Floh. — Fliegen im Haus. — Fliegen in Ställen. — Schnaken. — Moskitoz. — Schaf- lausfliege, Zecken. — Krätzmilbe.	
Mittel gegen Wanzen . . . . .	248
Wanzenentfärbung . . . . .	256
Mutan . . . . .	259
Schweflige Säure gegen Wanzen . . . . .	260
Insektienpulver, Pyrethrumblüten . . . . .	261
Zusammengesetzte Insektienpulver . . . . .	263
Karburirtes Insektienpulver . . . . .	264
Metallisches Insektienpulver . . . . .	264
Mittel gegen Fliegen, Bremsen usw. . . . .	264
Fliegenpapiere . . . . .	265
Fliegenleim . . . . .	267
Fliegenwasser . . . . .	270
Streu-pulver gegen Fliegen . . . . .	270
Fliegenessenzen . . . . .	271
Fliegenpulver . . . . .	271
Fliegenöl . . . . .	271
Salbe gegen Fliegen in Ställen . . . . .	272
Mittel gegen Fliegen und Bremsen bei Tieren . . . . .	272
Schutzmittel gegen Bremsen bei Pferden . . . . .	273
Mittel gegen Stechmücken (Schnaken, Moskitoz) . . . . .	276
Mückenentfärbung . . . . .	279
Mosquitoin . . . . .	280
Mückenentfärbung . . . . .	282
Mückenöl . . . . .	282
Schnaken-Räucherkerzen . . . . .	282
Räucherkerzen . . . . .	282
Pulver gegen Moskitoz . . . . .	283
Verschiedene Cremes zum Einreiben . . . . .	283
Insektenöl . . . . .	285
Mittel gegen Bienenstiche . . . . .	285
Insektenabholungsmittel für Menschen . . . . .	286
Flohwasser nach Föllner . . . . .	288

	Seite
Insektenichungs- (=abhaltungs-) Mittel für Tiere	289
Insektendöl nach Töllner	289
Seife gegen Ungeziefer der Hunde	290
Ungeziefer-Pomade	291
Tabanal	291
Mittel gegen Kopfungeziefer	292
Insektenspeckseife gegen Läuse	292
Transeife gegen Läuse	293
Mittel gegen Läuse bei Tieren	293
Mittel gegen Zecken der Schafe	294
Mittel gegen die Mäde der Schafe	294
Flüssigkeit gegen die Zwergzikade	295
Schutz des Hühnerbestandes vor Läusen und Federlingen	295
<b>Vertilgung von Ratten und Mäusen</b>	297
Phosphorpräparate	304
Phosphorbrei	304
Phosphorbrei	305
Phosphorbrei	306
Rattenklöße	306
Phosphorpasta	306
Verschiedene Zubereitungen	307
Barythaltige Präparate zur Vertilgung der Mäuse	308
Meerzwiebelpräparate	309
Mäusegrüze	310
Giftweizen	311
Detolin	311
Mittel gegen Ratten in Geflügelställen	311
<b>Vertilgung des Maulwurfes</b>	312
<b>Hamsterpatronen zur Vertilgung des Hamsters</b>	315
<b>Alphabetisches Sachregister</b>	317




Die Vertilgung

von

Angeziefer und Aukraut.

---





## Einleitung.

Jedes lebende Wesen, sei es tierischer oder pflanzlicher Natur, will leben, sich vermehren und dann nach längerer oder kürzerer Zeit, die ihm von der Natur zugewiesen ist, verschwindet es wieder von der Erde oder aus dem Wasser, um den zahlreichen anderen seiner Gattung Platz zu machen. Alles, ob Tier oder Pflanze, kämpft hierbei nach seiner Art und seinem Vermögen, der Schwächere unterliegt dem Stärkeren, das eine bedarf zu seiner Ernährung des Fleisches, das andere der Vegetabilien und so lebt eigentlich jedes Lebewesen auf Kosten eines anderen, einer nimmt in dieser oder in jener Form die Bedürfnisse von dem anderen, wenn nicht freiwillig gegeben, so geraubt, selbst unter den erschwerendsten Umständen. Es darf daher nicht wundernehmen, wenn nicht nur der Mensch und große Tiere, Bäume und Sträucher leben wollen, sondern auch die ungezählten kleinen Tiere und Tierchen, selbst die mit freiem Auge kaum sichtbaren, die kleinsten Pflänzchen, die nur Bruchteile von Millimetern groß sind, sie alle sind von der allweisen Mutter Natur zu ihrem Dasein berechtigt worden, auch wenn wir vielfach dies nicht einsehen und uns auch den Grund für ihre Existenz nicht recht erklären können, ja sie geradezu als höchst überflüssig zu bezeichnen gewohnt sind. Das beste Beispiel solcher unnützer Lebewesen sind die den Menschen und das Tier belästigenden, ihnen das Blut aussaugenden Insekten, die Schnaken, Wanzen und Flöhe, dann die Fliegen, Mücken und Schaben, neben vielen anderen Tierchen, die man im allgemeinen als

»Ungeziefer« bezeichnet. Dann aber kommen noch die ungezählten Tierchen, die unsere Felder und Obstkulturen, unsere Gemüse- und Blumengärten, unsere Forste und vieles andere schädigen, die kleinen pflanzlichen Lebewesen, die oftmals unendliches Unheil anrichten. Mit den letztgenannten Kategorien kann man sich noch eher abfinden, bei ihnen begreift man noch die Existenzberechtigung, die man bei dem Ungeziefer, das die Menschen belästigt, nicht verstehen will und auch schließlich nicht recht verstehen kann. Aber sie alle sind vorhanden, wir müssen mit ihnen leider unausgesetzt rechnen, sie bekämpfen und dahin trachten, ihre Zahl zu verringern und sie damit weniger schädigend zu gestalten. Das tierische und pflanzliche Ungeziefer ist jederzeit ganz zweifelsohne vorhanden gewesen, nur die Bedingungen für seine Vermehrung und seine Ausbreitung sind nicht überall gleich, und dort, wo sie vorhanden sind, ist auch ein vermehrtes Vorkommen vorauszusetzen. Es liegt wohl auf der Hand, daß Flöhe, Wanzen und Läuse sich dort außerordentlich leicht verbreiten, wo dem Menschen der Sinn für Reinlichkeit an sich und seinen Haustieren fehlt, wo er nichts dazu tut, diese Plagegeister zu bekämpfen, zu vernichten oder sich ihrer sonst zu erwehren. Auch Unreinlichkeit im Hause oder der Wohnstätte überhaupt trägt unendlich viel zur Ausbreitung des Ungeziefers bei, ebenso der Aufenthalt vieler Menschen in einem Raum, unreine Luft, verwahrloste Mauerflächen und Fußböden, das Umherliegenlassen von Abfällen jeglicher Art usw. Alles dieses bietet jeglichem Ungeziefer die Gelegenheit zu seiner Ernährung und zu seiner Fortpflanzung und damit zu einem Überhandnehmen, so daß alle diese Plagegeister von dort, wo sie sich einmal festgesetzt haben, unendlich schwer zu vertreiben sind. Glücklicherweise schafft auch hier wieder die Mutter Natur teilweise Abhilfe, sei es durch den Eintritt des Winters, der viele der Schädlinge zur Untätigkeit zwingt oder sie durch Fröste ganz oder teilweise vernichtet, durch Krankheiten, die unter ihnen ausbrechen, tötet; aber schließlich ist es doch dem Menschen in die Hand gegeben, sich durch Reinhaltung des Körpers, der

Wohnstätten, durch entsprechende Lebensführung von dem Ungeziefer, das seine eigene Person aufsucht und ihn belästigt, zu befreien, seine Feld-, Garten-, Obst- und Waldkulturen wenn auch nicht vollkommen, so doch so zu säubern und instand zu halten, daß der Schaden in mäßigen Grenzen bleibt. Gegen Invasionen wandernder Heuschrecken, die großen Züge der Kohlweißlinge, der Nonnenraupen und anderer an einzelnen Orten plötzlich und massenhaft auftretender Schädlinge ist er allerdings für einige Zeit machtlos, dann aber kann er doch mit geeigneten Vertilgungsmitteln eingreifen und die ferneren Schäden mildern oder ganz unmöglich machen.

Man hat es bei den Pflanzen mit pflanzlichen und mit tierischen Schädlingen, bei den Menschen und den Tieren ausschließlich mit tierischen Schädlingen zu tun; unter den Gebrauchsgegenständen hat lediglich das Holz durch pflanzliche Organismen (Holz- oder Hauschwamm) neben tierischen Schädlingen, alle anderen aber nur durch letztere zu leiden.

Alle jene pflanzlichen Organismen, welche das Leben der Pflanzen kürzen und selbst zerstören, sind als Parasiten zu betrachten und alle Einwirkungen, welche sowohl durch diese, als auch solche von Tieren, durch ungeeignete Boden- und Feuchtigkeitsverhältnisse, mangelhafte Belichtung, mechanische Verletzungen herbeigeführt werden, bezeichnet man mit dem Namen »Pflanzenkrankheiten«. Die Lehre von den Pflanzenkrankheiten, die Phytopathologie, hat die Aufgabe, die Ursachen dieser Krankheiten zu erforschen und es ist von größter Wichtigkeit, die Symptome, unter denen dieselben auftreten, zu untersuchen, weil man in vielen Fällen aus den Symptomen auf die Ursachen schließen kann. Es sind in den letzten Jahrzehnten fast in allen Staaten Institute ins Leben gerufen worden, welche alle Verhältnisse genau studieren und die erzielten Resultate den Interessenten zugänglich machen; auch besteht eine internationale phytopathologische Gesellschaft für diese Forschungen.

Die wichtigsten dieser Pflanzenkrankheiten sind der Getreidebrand (Brand des Getreides), das Mutterkorn, der

Getreiderost, die Trauben- und die Kartoffelkrankheit, der Blattschorf, der Hungerzwetschgen; hierzu kommen noch die Rotfäule, der Erdkrebs, der Ritzenschorf, die Kohlhernie und andere. Unter den Tieren, die schädliche Einflüsse auf Pflanzen ausüben, sind in erster Linie Borkenkäfer, Reblaus, Gallwespen, Blut- und Blattläuse, Kohlweißlinge u. a. m. zu nennen. Nagetiere, wie Mäuse, richten beträchtlichen Schaden an, ebenso auch unsere heimischen Wildarten, welche junge Bäume benagen (Wildverbiß) und Saaten zerstören. Zufällige oder absichtliche Verwundungen erzeugen Mißbildungen (Kröpfe, Überwallungen usw.), ebenso auch absichtliche Verwundungen bei der Harzgewinnung. Zahlreiche Pflanzenkrankheiten sind auf abnorme Licht- und Temperaturverhältnisse zurückzuführen; hierher gehören das Verpeilen oder Etiolieren (Erscheinungen bei länger andauernder Verdunkelung), ferner das Erfrieren. Auch allzu starke Erwärmung verursacht leicht das Welken und schließlich Absterben der Pflanzen. Auch die Bodenbeschaffenheit kann mannigfache Veränderungen herbeiführen, und der Mangel gewisser Nährstoffe im Boden ist vielfach verderblich, wenn man nicht mit geeigneten Mitteln solche regelt, denn ein zu geringer Gehalt an Nährstoffen überhaupt erzeugt zwerghafte Entwicklung, die man als Zwergwuchs oder Nanismus bezeichnet. Sehr fruchtbarer Boden ruft leicht Fäulnis der Wurzeln hervor und viele Mißbildungen lassen sich auf die Bodenbeschaffenheit zurückführen.

Pflanzliche Parasiten oder Schmarotzergewächse entnehmen wie die tierischen Parasiten ihre Nährstoffe ganz oder auch nur teilweise anderen pflanzlichen Lebewesen oder Tieren und verursachen krankhafte Veränderungen einzelner Organe oder der ganzen, als Wirt dienenden Pflanze. Sie rufen aber auch teils Anschwellungen, Hypertrophien, Gallenbildungen hervor, teils auch bewirken sie ein vollständiges Absterben, Faulen u. dgl. bloß der befallenen Organe, z. B. Gallen, oder auch der ganzen Pflanze. Die Art, wie die Schmarotzerpflanzen den sie ernährenden Wirten die Nahrung entnehmen, ist sehr verschieden. Die meisten para-

sitischen Pilze durchdringen mit ihrem Myzelium die Gewebe der Wirtspflanze und ihre Hyphen (schlauchförmige, spinnwebartige Fäden), wachsen entweder selbst in die Zellen hinein oder sie senden Haustorien (fadenförmige, büschelartige Myzelien [Saugwarzen]) in das Innere derselben, während die eigentliche Myzelentwicklung in den Interzellularräumen stattfindet. Oft kommen beide obengenannten Wirkungen zusammen in der Weise vor, daß nach vorher stattgefundener krankhafter Veränderung schließlich ein vollständiges Absterben eintritt, z. B. häufig bei den Brandpilzen, bei der Kartoffelkrankheit, bei zahlreichen Krankheiten der Obst- und Waldbäume. Außer den im Innern der Pflanzengewebe lebenden endophytischen Parasiten gibt es unter den Pilzen noch eine Anzahl epiphytischer, deren Myzelium sich auf der Oberfläche der befallenen Pflanzen entwickelt und von da aus nun Haustorien in die Epidermis, seltener auch in die unterliegenden Zellen, treibt. Aber auch hier ist der Einfluß auf die Wirtspflanze in der Regel ein schädlicher. Hierher gehören z. B. sämtliche Mehltaupilze, darunter die Traubenkrankheit oder Traubenfäule. Ein eigentümlicher Parasitismus von Pilzen findet sich auf den Flechten. Unter den wenigen phanerogamischen Pflanzen kann man solche unterscheiden, die überhaupt kein Chlorophyll oder nur sehr wenig enthalten und demnach organische Verbindungen aus anderen Pflanzen entnehmen müssen und solche, die zwar ganz normal grün gefärbte Blattoorgane besitzen, aber die mineralischen Nährstoffe nicht direkt aus dem Boden, sondern aus den Stengeln oder Wurzeln anderer Pflanzen aufnehmen. In die erstere Gruppe gehören die *Cuscuta*-Arten, ferner die *Orobanche* (Sommerwurz, Wurzer), die *Balanophoraceen* (Heren- oder Teufelszwirn) und *Rafflesiaceen*. Die meisten dieser Pflanzen treiben Haustorien entweder in die Stengel oder in die Wurzel der Nährpflanzen, gewöhnlich bis in die Gefäßbündel hinein und ernähren sich auf diese Weise auf Kosten jener Gewächse. Andere haben eine knollenartige Anschwellung ihrer Stengelbasis, diese verwächst mit einer Wurzel der

Nährpflanze und stellt so ein den Haustorien ähnliches Saugorgan dar. Das letztere ist beispielsweise bei den Orobanchen der Fall. Bei der zweiten Gruppe, den chlorophyllführenden Parasiten liegen die Verhältnisse insofern anders, als diese Gewächse in vielen Fällen wahrscheinlich nur anorganische Nährstoffe aus der Pflanze nehmen; dahin gehören z. B. die Loranthaceen und unter diesen die Mistel, die Arten der Gattungen *Euphrasia*, *Thesium*, *Rinanthus*. Die Organe, mittels deren sie jene Stoffe aufsaugen, sind jedoch ganz ähnlich jenen der chlorophyllfreien phanerogamen Parasiten gebaut, indem auch hier die Haustorien oder Saugorgane bis in die Gefäßbündel oder bis in den Holzkörper der Wirtspflanze eindringen.

Die tierischen Schädlinge sowohl für Pflanzen als auch für tierische Lebewesen rekrutieren sich, wenn man von den Ratten, Mäusen, dem Maulwurf und Hamster absieht, ausschließlich aus den niederen Tierklassen, Kerbtieren, Stiefen, Insekten (Käfer, Hautflügler oder Aderflügler, Schmetterlinge, Zweiflügler, Geradflügler, [Kauterke, Helmkerke], Schnabelferkel oder Halbdecker und werden Pflanzen teils unmittelbar durch die Suche nach Nahrung verderblich, teils durch ihre Raupen und Larven, während sie Gebrauchsgegenstände, z. B. Holz, durch Zernagen desselben, dann aber auch ihre Raupen Schaden verursachen, Menschen und Tieren aber durch Ausaugen von Blut außerordentlich unangenehm werden können.

Eine nicht unbedeutende Rolle unter dem »Ungeziefer« spielen die Schmarotzer oder Parasiten, Tiere, die auf Kosten anderer leben, die aber im Gegensatz zu den Raubtieren, die in gleicher Weise auf Kosten anderer leben, viel geringere Ansprüche haben; die Schmarotzer oder Parasiten begnügen sich mit viel geringeren Ansprüchen an den Ernährer, den Wirt, indem sie demselben immer einen geringen Teil entnehmen, dessen Verlust in der Regel das Leben desselben nicht ernstlich bedroht. Zumeist kann (nach Dr. Wagner, Schmarotzer und Schmarotzertum) die Nahrungsaufnahme der Schmarotzer nur von Tier zu Tier bewirkt

werden, sie müssen also bei denselben in irgend einer Form Nahrung nehmen, dauernd (z. B. Läuse) oder nur vorübergehend, dann aber mindestens so lange, bis das Nahrungsbedürfnis gestillt ist (Flöhe, Wanzen, Schnaken). Es ist klar, daß in letzterem Falle der Wirt öfters besucht werden muß, so oft, als der Hunger den Parasiten zwingt. Es bringt demnach das Schmarozertum eine bestimmte und konstante Beziehung zwischen Individuen zweier verschiedener Arten zum Ausdruck; die eine Tierart nimmt sich die Nahrung, die ihm von dem anderen überlassen werden muß, im Abhängigkeitsverhältnis, das durchaus einseitig ist, denn der Wirt bedarf seines Gastes nicht nur nicht, sondern er ist ihm im höchsten Grade lästig. Von dem Schmarozertum ist das Zusammenleben verschiedenartiger Tiere aber wohl zu unterscheiden, denn hier kann der Gast nicht ohne den Wirt und dieser nicht ohne den Gast leben (einzelne Meeres-tiere mit Pflanzen), Tiere wie der Bernhardkrebs mit einer Seerose (Korallenpolyp). Auch die Tischgenossenschaft, die wir im Tierreich vielfach verbreitet finden, ist nicht als Schmarozertum zu bezeichnen, aber sie kann diesem ähnlich sein, je nachdem der Tischgenosse von den Abfällen oder Überschüssen des anderen sich sättigt oder diesen durch Wegnahme der Nahrung in seiner Ernährung beeinträchtigt; aber der Tischgenosse beansprucht niemals Teile seines Ernährers selbst. Für die Schmarozernatur eines Tieres sind zwei Bedingungen erforderlich: Der Parasit muß erstens für seine Nahrung Substanzen entnehmen, welche dem Wirt, sei es leiblich, sei es ideell, zugehören und muß zweitens gerade auf diese Nahrung zu seinem Lebensunterhalt angewiesen sein. Es ist ein wesentlicher Unterschied in der Art und der Intensität des Schmarozertums und es darf beispielsweise das zeitweilige Blutsaugen einer Schnake nicht dem Parasitismus der Trichine usw. gleichgestellt werden. Zahlreiche Schmarozter finden auf oder in mehreren Tieren, selbst ganz verschiedener Gattungen die Bedingungen ihrer Existenz, andere dagegen verhalten sich exklusiv und sind ausschließlich nur auf eine Tierart für ihre Lebensfähigkeit angewiesen.

Hauptsächlich ist der Parasitismus als mehr oder weniger gewöhnliche Erscheinung nur bei Urtieren, Würmern und Gliederfüßern vorhanden, fehlt bei den Stachelhäutern ganz. Die Insekten bieten zwar (nach Dr. Wagner, Schmaroger und Schmarogertum) viele Fälle von Parasitismus dar, an dem ganz außerordentlichen Formenreichtum dieser Tiere gemessen, ist diese Erscheinung aber doch sehr beschränkt, noch viel exceptioneller als unter den Spinnen, deren Artenreichtum zwar ebenfalls ein beträchtlicher ist, indes auch nicht annähernd mit dem der Insekten wetteifern kann. Geradflügler, die Heuschrecken, Grillen und verwandte Kerfe umfassend, und Schmetterlinge sind ausnahmslos freilebend, in anderen Insektenordnungen, z. B. den Käfern, kommt Schmarogertum nur sehr vereinzelt vor; lediglich die Schnabelkerfe und Zweiflügler bieten eine größere Zahl von parasitischen Formen dar; die ersteren vereinigen mit den flügellosen Läusen, einer exklusiv dem Schmarogerleben huldigenden Tiergruppe, die Zirpen und Wanzen, die neben anderen freilebenden Arten zahlreiche, teils Pflanzen, teils Tiere heimsuchende Parasiten in sich schließen. Unter den Zweiflüglern sind von den Langfühlern oder Mücken, die Stechmücken oder Gelsen, Schnaken, Moskito's genügend bekannte und gefährliche Blutsauger des Menschen und gewisse Arten der Gabelmücken als Überträger der Malaria jüngst als äußerst gefährliche Tiere erkannt worden. Die kurzfühlerigen Fliegen umfassen in den Bremsen stechende und blutsaugende Formen, die Mensch und Tier in gleicher Weise belästigen; ebenso sind die Dassel-fliegen und Biessfliegen in ausgebildetem Zustande zwar harmlose, als Larven aber interparasitisch in Säugetieren lebende Zweiflügler. Die eigentlichen, unserer Stubensfliege nächst verwandten Fliegen besitzen in dem Wadenstecher ein Gegenstück zu der Stechmücke, in der Tietzefliege einen Parallelfall zu der Gabelmücke. Zu den Zweiflüglern gehören auch die durchwegs ektoparasitisch (außen schmarogend) besonders auf warmblütigen Tieren lebenden Lausfliegen ohne oder nur mit rudimentären (verkümmerten) Flügeln;



sie sind dadurch besonders merkwürdig, daß sie lebendige Larven kurz vor der Verpuppung zur Welt bringen. Die Flöhe, diese Quälgeister der Menschen und der Hunde, schließen sich an die Zweiflügler, als besondere Insektenart häufig angehehen, an, sie sind arm an Arten, aber bilden ausschließlich eine temporäre Außenschmarotzer einschließende Gruppe der Kerfe.

In Fällen, wo bei den Parasiten nicht Zwittertum herrscht, also Männchen und Weibchen unterschieden werden können, gilt als Regel, daß beiderlei Geschlechtsindividuen parasitisch leben, die aber nicht allgemein zutrifft. In manchen Fällen, z. B. bei stechenden Insekten, wie die Stechmücken und Bremsen, sind es vielmehr nur die Weibchen, die als Blutsauger auftreten und Menschen und Tiere verfolgen, während die Männchen ein mehr verborgenes und daher auch harmloses Dasein führen. Nur in ganz vereinzelt Fällen pflegt das Männchen gleich dem Weibchen als Schmarotzer zu leben, dabei sich aber eines anderen Wirtstieres als dieses zu bedienen, nämlich der Weibchen seiner eigenen Art, so daß die Männchen als Schmarotzer der Weibchen leben. Es ist dies übrigens ein Verhalten, das vom typischen Schmarotzertum schon beträchtlich abweicht, indem dasselbe dem Weibchen gar nicht schadet, ihm im Gegenteil sogar erheblichen Nutzen bringt, denn es bedeutet nichts mehr und nichts weniger als eine Sicherheitseinrichtung für die Fortpflanzung.

Da wir es bei den Menschen und Tieren hier nur mit Ektoparasiten (Außenparasiten) zu tun haben, die allerdings sehr unangenehm fühlbar werden können und mitunter in Krankheiten (Läusefucht) ausarten können, so sind wir doch durch Reinlichkeit und rechtzeitiges Erkennen des Vorhandenseins vielfach, wenn auch nicht bei allen Parasiten, in der Lage, uns dieses lästige Ungeziefer im vollsten Sinne des Wortes von dem Leibe zu halten.

Seitdem die Erde bevölkert ist, haben auch die verschiedensten kleinen Lebewesen auf derselben sich herumgetrieben und vielfach Schaden verursacht, wenn derselbe auch wenig oder gar

nicht beachtet worden ist, da ja in der Urzeit wesentlich weniger Menschen vorhanden waren und ihr Auskommen gefunden haben, ohne, wie es anzunehmen ist, durch Schädlinge allzujehr belästigt zu werden. Die Geschichte bietet uns hier wohl kaum etwas Positives, aber sie weiß doch von einem Insekt zu berichten.

Die Wanderheuschrecken, von denen schon in der Bibel erzählt wird, daß ihre Schwärme gleich Wolken die Sonne verfinsterten, kommen hauptsächlich in Kleinasien und Ägypten vor; in Europa haben sie in Südrußland und in Ungarn in wenigen Gegenden eine ständige Heimat, von wo sie sich manchmal westlich bis Wien, selten über Norddeutschland bis nach Belgien hin verbreitet. Merkwürdigerweise trifft man sie isoliert auch bei Schaffhausen in der Schweiz an. Schon Plinius berichtet, daß in Syrene die Einwohner jährlich dreimal gegen sie zu Felde ziehen mußten und einmal soll die Plage so arg gewesen sein, daß die Leichen der ans Land gespülten Heuschrecken den Ausbruch der Pest herbeiführten, an der 800.000 Menschen starben. In Deutschland ist die Wanderheuschrecke das erste Mal nachweislich im Jahre 873 aufgetreten, von 1333 an berichten (Taschenberg) die Chroniken ziemlich regelmäßig von dieser Plage und in den letzten zwei Jahrhunderten ist sie vierundzwanzigmal in irgend einer Gegend Deutschlands aufgetreten. In Rußland zählte man im abgelaufenen Jahrhundert 23 Heuschreckenjahre. Auch in Schweden, England und Schottland sind ausnahmsweise Schwärme der Wanderheuschrecke gesehen worden.

Erst in verhältnismäßig späterer Zeit, mit dem Anwachsen der Bevölkerungszahl, der Steigerung des Bedarfes an Nahrungs- und Gebrauchsartikeln, der weiterreichenden Urbarmachung des Bodens und wohl auch in letzter Linie der Auszangung der besten Nährstoffe desselben ohne zu geeigneter Zeit Ersatz durch Düngung zu bieten, die mangelnde Bekämpfung der Schädlinge dort, wo sie massenhaft auftreten, haben wohl die von Pflanzen lebenden kleinen Lebewesen sich vermehrt und verbreitet, mochten die

Pflanzenkrankheiten bessere Bedingungen für ihre Verbreitung gefunden haben.

Mitunter sind nach Europa auch unseren Gewächsen schädliche Insekten aus überseeischen Ländern eingeschleppt worden, wie die Reblaus, der Kartoffel- oder Coloradokäfer und auch die allerjüngste Zeit berichtet über die Einschleppung eines Insektes. In Glostrup bei Kopenhagen wurden vor einigen Jahren die Einwohner stark durch ein kleines schwarzes Insekt geplagt, das in großen Massen auftrat und in seinem Bau an Flöhe erinnerte, nur daß es doppelt so groß als diese und geflügelt ist; verscheucht, kehrt es immer wieder wie eine Fliege zurück. Das Tier kam aus der daselbst befindlichen Ölfabrik. So oft ein Dampfer aus Ceylon oder einem anderen überseeischen Orte eine neue Ladung Ölfrüchte, gewöhnlich 10.000 bis 15.000 Säcke, brachte, trat das Ungeziefer von neuem auf. Bei kühlem Wetter blieben die Tierchen in der Fabrik, aber bei warmer Witterung schwärmten sie wie Mücken und verbreiteten sich über den ganzen Ort.

Überall dort, wo große Bodenflächen mit ein und derselben Pflanzengattung besetzt sind, ist naturgemäß auch eine größere Anzahl dieser schädigender Insekten und Schädlinge zu erwarten, weil sie die geeigneten Lebensbedingungen vorfinden und sich dabei einer mehr oder weniger ungestörten Ruhe hingeben können. So finden sich beispielsweise in ausgedehnten Rübenpflanzungen die Rübenennematoden (Rübenwurm oder Rübenälchen), der gefährlichste Feind der Zuckerrüben, ein, die ihr Dasein der Rübenmüdigkeit des Bodens verdanken und durch Fangpflanzen (Sommerrüben) veranlaßt werden, sich in den Wurzeln dieser einzunisten. Es sei ferner des Kohlweißlings gedacht, der in umfangreichen Krautfeldern unendlichen Schaden anrichtet, aber solche Pflanzen auch in Gartenbeeten nicht verschont.

Am meisten den Angriffen der Insektenschädlinge sind aber große Waldbestände ausgesetzt, und hier vielfach jene, denen die erforderliche Aufsicht mangelt, in denen eine rationelle Waldwirtschaft, sei es wegen der Schwerzugängig-

keit (Unmöglichkeit oder kaum zu bewältigende Schwierigkeiten beim Herausbringen des Holzes) oder aus Nachlässigkeit nicht betrieben wird. Hier haben die mannigfachsten Schädlinge nicht allein vollkommene Ruhe, sondern sie finden auch in gefallenen Bäumen (Borkenkäfer, Bohrkäfer) alle Bedingungen für ihr ungestörtes Fortkommen. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn derartige Waldbestände durch Insekten stark in Mitleidenenschaft gezogen werden, leider werden aber auch gutgepflegte Wälder von denselben heimgesucht und es mögen hier nur einige solcher Schäden angeführt werden.

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts ist in der Leßlinger Heide, Provinz Sachsen, der große Wald fast gänzlich vom Kiefernspanner vernichtet worden.

Die große Kiefernraupe (*Lasioecampa pini*) verursachte im Laufe der Jahrhunderte großen Schaden zu wiederholten Malen; genaue Daten liegen vor über den von 1791 bis 1794 in den königlich preussischen Forsten wütenden Fraß, sowie über die zehn Jahre von 1862 bis 1872 dauernde Plagie in den Waldungen Nordostdeutschlands. Derselbe dehnte sich über 2349 Quadratmeilen aus. Es wurden über 70.600 *ha* beschädigt, davon 10.244 *ha* kahlgefressen und rund zwei Millionen Festmeter »Raupenholz« eingeschlagen. Auf derselben Fläche betrug der durch Verlust beim Holzverkauf und durch Abwehrkosten verursachte Schaden über 2,366.000 Mark.

Von dem durch Borkenkäfer verursachten Schaden sprechen folgende Zahlen. Die Berichte über das Vorkommen der Wurmtrocknis, wie man das Eingehen der Stämme infolge des Fraßes der Käferlarven nannte, reichen im Harz bis 1649 zurück. Auch 1665 und 1677 waren Jahre der Verwüstung. Von 1681 bis 1691 wurde im Harz das Übel durch schleuniges Niederhauen und Verkohlen der Stämme gedämpft, die Verheerungen wiederholten sich aber schnell und nahmen von 1703 an bedenklich zu, um eigentlich das ganze Jahrhundert hindurch in den mitteldeutschen Gebirgswäldern nicht mehr aufzuhören. Im »Kommunion-

harz« erreichten sie 1781 bis 1783 den höchsten Grad und erloschen erst gegen 1787. Die Anzahl der trocken gewordenen Stämme betrug 1781 182.451 Stück, 1782 259.116 Stück, im letzten Jahre starben 3359 Morgen Wald ab und bis Ende 1786 waren wiederum fast 500.000 Stämme trocken geworden, so daß man den Gesamtschaden auf drei Millionen Fichtenstämme einschätzen muß.

Über bedeutende Verheerungen der Nonne wird vielfach berichtet und sehr bedeutende Schäden waren in Rußland Ende der 1830er Jahre, dann in demselben Lande und in den preußischen Regierungsbezirken Königsberg und Gumbinnen zwischen den Jahren 1845 und 1868. In diesem Zeitraume von 23 Jahren sind 110 Millionen Kubikmeter Holz von vernichteten Bäumen geschlagen worden, von denen 96 Millionen auf Rußland, 14 Millionen auf Preußen entfielen. In der Nacht des 23. Juli 1853 fiel die Nonne, durch einen Südwind getrieben, in wolkenartigen Massen in die Forste Goldapp, Lyf und Angerburg ein; das Auftreten der Schmetterlinge in den Forsten war einem heftigen Schneegestöber vergleichbar und der Willkungssee schien wie mit einem weißen Schaum bedeckt von den ersäusten Schmetterlingen. Man hat im darauffolgenden Jahre in der Zeit vom 8. August bis zum 8. Mai 150 kg Eier gesammelt, deren Anzahl man auf 150 Millionen Stück berechnete, eine und eine halbe Million weiblicher Falter waren eingesammelt und getötet worden, aber beim sogenannten »Spiegeln«, dem Sammeln der jungen Raupen, wurden noch so viele derselben gefunden, daß man annahm, daß nur etwa die Hälfte der wirklich vorhanden gewesenen Schädlinge vernichtet worden sei.

Bis zum 27. Juni 1855 waren in kurzer Zeit in dem Rothebuder Revier über 10.000 Morgen Nadelholzbestand fahl gefressen, andere 5000 so stark beschädigt, daß der vollständige Abholzungsstand ebenfalls in Aussicht stand. Bis Ende Juli waren die meisten Fichten des Reviers ebenfalls fahl gefressen, diejenigen auf 16.354 Morgen bereits getötet

und nur 4932 Morgen blieben noch so ziemlich verschont. Der Rot der Raupen, welcher den Waldboden zuletzt 5 bis 7·6 *cm* und stellenweise selbst bis 15 *cm* hoch bedeckte, rieselte gleich einem starken Regen ununterbrochen von den Kronen der Bäume hernieder. Im Regierungsbezirk Königsberg hatte die Nonnenraupe von 1854 bis 1859 in ganz ähnlicher Weise gehaust, war dann auf ihr gewöhnliches Maß zurückgegangen, bis 1867—1869 ihr erneutes Auftreten das Absterben von 100.000 *m*<sup>3</sup> Holz zur Folge hatte. Seit 1888 hat eine neue Nonnenfraßperiode begonnen, welche besonders in Württemberg, Sigmaringen und Bayern hervortrat, aber auch in einzelnen Teilen Österreichs, sowie Norddeutschlands einen bedrohlichen Charakter angenommen hatte. Es wurde insbesondere der Ebersberger Park bei München 1890/91 in so furchtbarer Weise von der Nonnenkalamität heimgesucht, daß nach Schätzungen noch vor Abschluß der Katastrophe 800.000 bis 900.000 *m*<sup>3</sup> Fichtenholz geschlagen werden mußten. In diesem Forstbestand konnte man an einem kahlgefressenen Stamm 30.000 bis 90.000, in einem Falle sogar 140.000 Nonneneier zählen; jeder Stamm, es waren Bäume von mehr als 30 *m*, war bis in den Gipfel hinein, so weit das Auge reichte, mit weiblichen Faltern besetzt und das auf eine Fläche von tausenden Hektaren; an einem Stamme hat man über 800 Schmetterlinge gezählt. Von den Wanderungen der Nonne hatte selbst die Stadt München zu leiden; eine große Menge der Falter fiel auf den Aussichtsturm und auf die Türme der Frauenkirche, selbst auf den Terrassen von Restaurants erschienen dieselben, einzelne Gebäude waren wie bei einem Schneefall weiß bedeckt und in einer Gasthausküche mußten Wirtin und Köchin vor den durch die Fenster eindringenden Faltern flüchten. Man zählte in den bayrischen Staatswaldungen 1890 23.560 *ha* befallene, davon 2666 *ha* kahl gefressene Bestände; 1890 bis 1891 wurden für Bekämpfungsmaßregeln 2,297.111 Mark ausgegeben.

Verheerungen durch den Borkenkäfer (Wurm-  
troctnis) werden schon im 17. Jahrhundert aus dem Harz

berichtet; 1772 bis 1782 wurden ebenfalls im Harz gegen 3 Millionen Fichtenstämme durch das Insekt vernichtet; nicht ganz so bedeutend waren die Schäden 1795 bis 1798 im Vogtland, anfangs des 19. Jahrhunderts in der Provinz Preußen, in Württemberg usw. Aus neuerer Zeit ist zu erwähnen der große Fraß in Ostpreußen 1857 bis 1862, wo der Borkenkäfer, der Monne folgend, mit dieser zusammen reichlich 70.000 *ha* Wald verwüstete und über 7 Millionen Festmeter Holz abstarben; ferner der Fraß im Baiyrischen und Böhmerwald 1871 bis 1875; hier hatten die großen Stürme 1868 bis 1870 die Vermehrung der Käfer durch das Werfen vieler Tausend Stämme ungemein stark begünstigt, etwa 11.000 *ha* mit 4 Millionen Festmeter Holzmasse wurden vernichtet.

Unsere Obstbäume haben wohl auch unter den mannigfachsten Insekten und deren Brut namentlich zu leiden, aber da dieselben einer sehr aufmerksamen Pflege sich erfreuen und nicht so dicht gepflanzt werden, als die Waldbäume, so kann der Schaden doch nicht so gewaltige Dimensionen annehmen, immerhin ist schon manche Obsternte durch Schmetterlinge und deren Raupen (Apfelwickler, Pflaumenwickler) vollständig vernichtet worden und auch Blatt- und Blattläuse vermögen reichlich dazu beizutragen.

Wald und Wiesen, Gemüsebeete und Zierpflanzen, Acker mit Halm- und anderen Früchten haben ihre leider unerwünschten Freunde und es gibt wohl keine Pflanze, auf der sich nicht da und dort ein Schaden feststellen läßt.

Unendlich schwerwiegende Feinde hat der Weinstock, die Weinrebe, die massenhaft dort angebaut und gepflanzt wird, wo der Boden und die Einwirkung der Sonne günstig sind. Ganz abgesehen von den Witterungsverhältnissen, die in hohem Maße die Entwicklung der Blüte, den Fruchtansatz und das Reifen der Beere beeinflussen, hat der Weinstock unter zahlreichen Krankheiten, der Chlorose, der schwarzen Knoten, dem Blütenfall und Sonnenbrand, der Traubensäule, der Anthraknose (schwarzer Brand oder Brennen), der schwarzen Fäule, dem echten und falschen Mehltau, der

Traubenkrankheit und der Gummosé zu leiden; hierzu gesellen sich noch tierische Schädlinge, Polarraupen, Weinmotte (Heu- und Sauerwurm) und endlich, als in erster Linie stehend, der denkbar größte Feind aller Kulturpflanzen, die Reblaus. Dieses Insekt hat seit seinem ersten Erscheinen ganz unsagbare Verwüstungen angerichtet, und es ist dermalen kein Weinbaugebiet auf der ganzen Erde zu nennen, welches als frei von diesem Insekt bezeichnet werden kann. Seine Heimat ist wohl ohne Zweifel in den südlichen Gebieten der Vereinigten Staaten Nordamerikas zu suchen, in dem zahlreiche wildwachsende Reben heimisch sind. Während aber die amerikanische Rebe durch ihre anatomische und physiologische Beschaffenheit befähigt ist, den Feind an ihren Wurzeln zu ernähren, ohne in der eigenen Existenz gefährdet zu sein, unterliegt ihm die dem Orient entstammende europäische Rebe, wenn nicht sehr energisch eingegriffen wird.

Prof. Taschenberg (Die Insekten in ihrem Schaden und Nutzen) führt über die Schädigungen des Weinbaues durch die Reblaus folgendes aus: Vor dem Auftreten dieses gefährlichen Weinstockfeindes besaß Frankreich 2,296.206 *ha* Weinland und hat seither nahezu  $1\frac{1}{2}$  Millionen Hektar, also über die Hälfte des gesamten Weinbaugebietes durch denselben eingebüßt, und es ist heute kaum ein Departement vorhanden, welches als völlig reblausfrei gelten kann. In Italien, welches bis zum 18. August 1871 für frei von der Plage gehalten wurde, ist Sizilien sowie ein Teil der südlichen Halbinsel gänzlich verseucht und im mittleren und nördlichen Italien mehrt sich (1906) von Jahr zu Jahr die Zahl der befallenen Gebiete. In der Schweiz ist das Insekt in einer größeren Anzahl von Kantonen aufgetreten; verschiedene derselben, namentlich die an Frankreich angrenzenden Bezirke, sind schon vollständig verseucht. Auf der Pyrenäenhalbinsel sind mehr als drei Viertel der Weinbauflächen dem Rebeind verfallen. Von Österreich gilt, abgesehen von kleineren, intakt erscheinenden Distrikten Niederösterreichs, Böhmens und von Untersteiermark, nur Tirol für durch



die Reblaus nicht geschädigt. Ungarn ist fast gänzlich ver-  
seucht. Fast noch schlimmer sieht es in Istrien und in  
Dalmatien aus. Auch in den Donauländern Bosnien,  
Serbien, Rumänien, Bulgarien, wie in der Türkei hat der  
Feind in den letzten Jahren erheblich an Terrain gewonnen.  
Rußland beherbergt die Reblaus in Bessarabien, in der  
Krim und im Kaukasus. Deutschland, welches noch 1874  
für seuchenfrei galt, scheint nach genauen Nachforschungen  
ungefähr zur gleichen Zeit wie Frankreich, nämlich zu Anfang  
der sechziger Jahre, infiziert zu sein. Anfänglich entdeckte  
man die Reblaus in einigen Rebschulen und Handels-  
gärtnereien, zuerst in dem genannten Jahre auf dem Gute  
Annaberg bei Bonn, dann auch in Karlsruhe, Erfurt,  
Wernigerode usw. 1881 wurde man auf einen größeren  
Reblausherd in den Weinbergen an der Landskronn im  
unteren Mhrtale aufmerksam, drei oder vier Jahre später  
auf noch ausgedehntere bei Linz, Honnef und Sinzig. In  
unseren Tagen sind innerhalb Deutschland von den über-  
haupt vorhandenen 120.000 ha rund 330 ha Weinbaufläche  
infiziert; von denselben entfallen die meisten (110) auf  
Elsaß-Lothringen, dann (98) auf die Rheinprovinz, die  
Provinz Sachsen, wo Freyburg a. d. Unstrut und Raumburg  
besonders heimgesucht sind, Hessen-Rassau (32) und Württem-  
berg (31). Bei diesen Zahlen sind allerdings die sogenannten  
Sicherheitsgürtel, die zum Teil recht umfangreich sind, ein-  
gerechnet, weil sie vorsichtshalber mit ausgerodet und des-  
infiziert sind. Die wirklich infiziert gewesenen Flächen dürften  
kaum ein Drittel der früher genannten Hektaranzahl umfaßt  
haben. Der Vollständigkeit halber sei noch über die außer-  
europäischen Länder hinzugefügt, daß Nordamerika nach  
allen Richtungen hin verseucht ist, in Australien bereits  
mehrere größere Distrikte, in Afrika sowohl Algier wie die  
Kapstadt ergriffen sind und daß auch in Kleinasien und in  
Südamerika die Reblaus nicht fehlt.

Es erübrigt nur noch in wenigen Worten jener Insekten  
zu gedenken, welche sich an Menschen und Tiere heran-  
wagen, um ihr Blut zu saugen, an Nahrungsmittelvorräte

und =abfälle, an Kleider- und Pelzwerk, an Holz und Büchern usw. Schaden anrichten oder auch im allgemeinen lästig werden. Sie sind als Flöhe und Wanzen, Läuse und Milben, Schnaken und Stechfliegen genugsam bekannt; es zählen hierher ferner der Kornwurm und andere Getreideschädlinge, die Schmeißfliege, die Zeckenarten, der Bohrkäfer, Klopfskaber, das Heimgewächse und die Bücherlaus neben dem Silberfischchen und den Tausendfüßern, der gemeine Ohrwurm oder Ohrwurm und zahlreiche andere Tierchen, die gefürchtet sind und, wo es angängig ist, vernichtet werden.

Aber unter dem vielen Getier, das da unter der Erde kriecht, ist nicht alles als unbedingt schädlich anzusehen, es gibt auch mancherlei, das Nutzen bringt und darunter ist der vielfach angefeindete, häufig vorkommende Regenwurm zu nennen.

An der Zersetzung organischer Stoffe (Dünger, Streu, Schlamm usw.) nehmen viele kleine Tiere lebhaften Anteil und auch im Boden üben viele der letzteren eine lebhafteste Tätigkeit aus. Für die Landwirte kommen hier in erster Linie die Würmer, ganz besonders die Regenwürmer in Betracht, die sich von pflanzlichen und tierischen Stoffen sowie von Erde nähren. Diese Stoffe wandern durch den Verdauungsapparat der Würmer. Da deren Verdauungsflüssigkeit von derselben Natur ist, wie die Ausscheidungen der Bauchspeicheldrüse der höheren Tiere, und wie diese beispielsweise Eiweißstoffe lösen, Stärke in Zucker überführen und auch Zellulose (Holzfaser) anzugreifen vermag, so kann man ohneweiters annehmen, daß die den Verdauungsapparat der Würmer passierenden organischen Stoffe verschiedenartigen chemischen Veränderungen unterliegen, infolge deren sie nach dem Ausscheiden aus dem Tierkörper leichter als vorher zersetzbar sind. Die Kohlensäureentwicklung ist nach authentischem Zahlenmaterial von Wollny in dem mit Regenwürmern besetzten Boden eine wesentlich stärkere, als in dem wurmfreien, was wohl darauf beruhen dürfte, daß die organischen Stoffe in ersterem schneller und leichter der Zersetzung anheimfallen. Hieraus kann aber nur der

Schluß gezogen werden, daß die Menge der bei dem Zerfall der im Boden vorhandenen organischen Stoffe sich bildenden Pflanzennährstoffe in der mit Würmern besetzten Erde größer sein wird, als in der wurmfreien. Weiterhin stellte Wollny durch genaue Versuche fest, daß die Menge der löslichen Stickstoffverbindungen und Mineralstoffe, welche gleichfalls durch die Zersetzung der organischen Stoffe entstehen, in der mit Würmern versehenen Erde größer, als in der wurmfreien war, daß also durch die Tätigkeit der Regenwürmer der Reichtum des Bodens an aufnehmbaren Pflanzennährstoffen erhöht wird. Dazu kommt aber noch der Umstand, daß die Würmer die Fruchtbarkeit des Bodens auch in anderer Weise günstig beeinflussen. Durch ihre Tätigkeit tragen sie zur Lockerung und Krümelung des Bodens bei. Nach den von Wollny angestellten Versuchen war nach sechs Wochen die mit Würmern besetzte Erde nicht nur vollständig gekrümelt, sondern zeigte auch eine beträchtliche Vermehrung des Volumens (27.5%). Dadurch wird aber wieder das Wasserfassungsvermögen des Bodens vermindert, das Luftfassungsvermögen dagegen erhöht. Infolge der Krümelung ist auch die Durchlässigkeit für Luft und Wasser im wurmhaltigen Boden bedeutend größer, als im wurmfreien. Der Nutzen der Würmer ergibt sich also aus der Tatsache, daß sie die Zersetzung der organischen Stoffe im Boden nicht unerheblich fördern und andererseits durch ihre Tätigkeit den mechanischen Zustand des Bodens in günstiger Weise abändern. Da nun aber die Würmer gerade dort in größerer Zahl aufzutreten pflegen, wo der Boden eine größere Menge Feuchtigkeit enthält, so ist ihre Tätigkeit hier in bezug auf die Regulierung der Luftzufuhr und des Wasserfassungsvermögens von ganz besonderer Wichtigkeit.

Die Waldameisen sind kräftige Vertilger von Insekten und stehen dem Menschen bei der Bekämpfung von großen Insektenschädigungen hilfreich zur Seite. Sie suchen nicht nur den Erdboden nach Insekten ab, wobei sie jedes nur halbwegs zu bewältigende Kriebtier überfallen und bis auf die harten Chitintteile auffressen, sondern sie besteigen auch Bäume

und Sträucher bis zur Spitze, um hier auch ihrer Freßlust nachzugehen. So hat man sie hinlänglich auch schon bei Nonneninvasionen beobachtet. Die Waldameisen überfallen meist gemeinschaftlich in größerer Anzahl die an den Stämmen sitzenden Nonnenfalter, um sie zur Nahrung in ihren Bau zu schleppen. Dies gelingt ihnen auch allerdings, aber nur dann, wenn der Nonnenfalter nicht mehr seine ursprüngliche Lebensenergie besitzt. Der königliche Förster Nowotny aus Steinbuchs bei Arnswalde hat nach »Deutsche Försterzeitung« beobachtet, daß die weiblichen Nonnenfalter nur nach der Eiablage von den Ameisen überwältigt und vernichtet werden konnten, während die Schmetterlinge vor der Eiablage sofort abflogen, wenn sie von den Ameisen angegriffen wurden. Diese Beobachtung muß natürlich den Wert der Waldameisen als Nonnenvertilger bedeutend einschränken, denn nach der Eiablage ist der Falter für den Wald nicht mehr schädlich. Oberförster Mey teilte eine Beobachtung mit, die den Wert der Waldameisen bei der Vertilgung eines anderen Schädlinges in eklatanter Weise dartut. Bei einem großen Fraße von *Lophyrus pini* wurde beobachtet, daß auf 100 m im Umkreise von Ameisenhaufen die Kiefern vollständig grün und unbeschädigt geblieben waren, da die Waldameisen sie von allen Battweissenraupen gesäubert hatten.

Die rotbraune Waldameise ist eine Totfeindin der Kreuzotter; in der Nähe von Ortschaften werden die Ameisenhaufen häufig von den Menschen zerstört und mit dem Verschwinden der Ameise kommt die Kreuzotter den Ortschaften näher und schlägt ihre Schlupfwinkel mit Vorliebe unter Brombeergestrüppe auf. In den großen Wäldern dagegen, wo die Ameisen ungestört sind, vertreiben sie jede Kreuzotter, so daß man geradezu aus der Anwesenheit von Ameisen auf die Abwesenheit der Schlangen schließen kann. Hat eine Ameise eine Kreuzotter entdeckt, so benachrichtigt sie ihre Genossen und schon nach wenigen Minuten ist das Reptil von hunderten seiner kleinen Feinde umgeben. Überall hängen sich die Ameisen an, mögen auch zahlreiche von ihnen dabei zugrunde gehen, wenn sie dem Kopfe zu nahe kommen, die

Augen zu zerbeißen versuchen oder in ihrer Kampfeswut in den Rachen der Schlange kriechen. Diese wehrt sich heftig, ja zuletzt krampfhaft, aber schließlich erlahmt sie und verendet. Nun beginnen die Ameisen die Fleischteile loszutrennen und nach ihrem Haufen zu schleppen.

Feinde vieler Insektenschädlinge sind auch die Vögel, und man sollte denselben eine viel größere Pflege angedeihen lassen, als es dormalen der Fall ist. Interessant und beachtenswert ist, was in den nachstehenden Zeilen berichtet wird.

In den Kiefernbeständen der Stadt Darmstadt hatte die Zahl der nützlichen Vögel stark abgenommen, und es wurde festgestellt, daß dieser Rückgang im wesentlichen auf das Fehlen geeigneter Brut- und Wasserstellen zurückzuführen war. Im Jahre 1901 wurden zwei Wasserbecken mit vertieftem Rand, in welchen die Vögel baden konnten, und in den folgenden Jahren eine Reihe weiterer Tränken und Ziehbrunnen mit Zementbecken angelegt. In den letzten vier Jahren sind 1200 Nistkästchen für Meisen und Stare ausgehängt worden. Die Tränken dienen im Winter auch als Futterplätze. Der Erfolg ist ein in die Augen springender gewesen. Insbesondere ließ sich eine Vermehrung der Meisen feststellen und Stare erschienen an Waldorten, die sie früher nicht besuchten. Um festzustellen, welchen Anteil die Vögel an der Vertilgung der Kiefernblattwespe nahmen, wurden einige Meisen usw. geschossen. Das Ergebnis war folgendes: Die Magen vom Specht und Baunkönig enthielten nur Körner (Sämereien). Die Magen von fünf Kohlmeisen, morgens geschossen, enthielten 4 bis 5 Puppen, eine Kohlmeise, nachmittags geschossen, 22 Puppen der Kiefernblattwespe. Die Kohlmeise nahm die Puppen an den Stämmen auf, wurde aber auch bei der Suche nach im Boden verpuppter Insekten beobachtet.

Zu den gefährlichsten Überträgern infektiöser Krankheiten gehören ohne Zweifel die Fliegen (Haus- oder Stubenfliegen). Während man in früheren Zeiten nur den Stechfliegen und Bremsen eine gewisse Gefährlichkeit zuerkannte und die kleineren Stubenfliegen höchstens als Speisenbechmücker

und Ruhestörer betrachtete, hat jetzt die moderne Wissenschaft auch die Gefährlichkeit dieses unscheinbaren Insektes als Krankheitsüberträger in überzeugender Weise dargetan, ganz abgesehen davon, daß sie überhaupt höchst unappetitlich sind. Die Folge hiervon ist, daß jeder auf seine Gesundheit bedachte Mensch den Fliegen den Krieg bis zum äußersten erklärt und ihnen mit allen möglichen Mitteln auf den Leib rückt. Man ging von der Defensiv-, d. h. von der Abwehr der Fliegen durch Gerüche zur Offensiv- über, man sucht sie anzulocken, um sie dann sicher zu vernichten.

An anderer Stelle dieses Buches wurde schon darauf hingewiesen, daß die Insekten zweifelsohne schon seit undenklichen Zeiten ihr Unwesen treiben und es ist nicht uninteressant, was über eines dieser Tiere ausgeführt wird.

Unter allen Insekten, welche der Mensch in seinen Wohnräumen zu bekämpfen hat, ist die Küchenfliege das konservativste. Kein Insekt findet man häufiger als fossil und keines ist so weit verbreitet in den verschiedensten geologischen Formationen, als gerade dieses so wenig beliebte Geschöpf. Bekanntlich bevorzugt die Küchenfliege die Nähe des Küchenofens, das ist ein altes Erbstück, denn in der ganzen geologischen Vergangenheit hat sie vornehmlich an feuchten Stellen gelebt. Man findet die Überreste dieser Tiere in der Nähe alter Wasserläufe, gewöhnlich eingebettet unter den Überresten von Farnkräutern so häufig, daß man bei beharrlichem Suchen unter fossilen Blättern von Landpflanzen kaum jemals verfehlen wird, einige abge sonderte Flügel und vielleicht auch den ganzen Körper einer urweltlichen Küchenfliege ans Licht zu bringen. Der ausgenährt vollständige Nekord, den diese Tiere erzielen, ihr fast unbeschädigter geologischer Stammbaum verleihen der Familie der Küchenfliegen ein besonderes Interesse. Durch ihre lange Existenz hindurch hat die Familie im allgemeinen ihren Körperbau bewahrt; morphologisch hat sie nichts gelernt und nichts vergessen. Seit paläozoischen Zeiten haben die Küchenfliegen nur eine oder zwei geringfügige Änderungen in ihrer Bauart erlebt. In der Steinkohlenzeit wurden ihre Köpfe flacher

und der obere Teil der Brust veränderte sich. Ebenfalls in der Zeit, aus der die ersten Kohlenflöze stammen, begannen sich die Flügel zu ändern. Die Gestalt der Flügel unserer heutigen Küchenschabe stammt aus den Tagen der Permzeit und ist seitdem in langsame Fortentwicklung begriffen; freilich mit den stärkeren Flügeln und dem großen Körper der urweltlichen Tiere sind auch der abenteuerliche Geist und die streitbaren Fähigkeiten der früheren Tage geschwunden; sonst aber ist die Küchenschabe von heute das was sie immer gewesen ist.

Alles, was wir als Ungeziefer aus der Insektenwelt ansehen, ist aber doch von großer Bedeutung im Haushalte der Natur und es gibt keine Gruppe von Landtieren, die in einer gleich energischen Weise zum Stoffwechsel wie sie beiträgt; sie sind dazu in erster Linie durch ihre unberechenbare Anzahl, durch die Klugheit, durch ihre förmliche Allgegenwart und durch ihre Fressucht berufen. Die letztere ist ihnen wenigstens in einer bestimmten Lebensperiode, oft aber auch zeitlebens eigen und sie scheuen vor keiner organischen Substanz und selbst pflanzlichen Giften nicht zurück. Sie haben auch unter ihresgleichen ihre Feinde, wie solche ihnen auch in den Vögeln und einzelnen Säugetieren erwachsen. Zu den letzteren gehört insbesondere der Maulwurf, der sich von den Larven der Engerlinge nährt, dann die Spitzmäuse (gemeine Spitzmaus und Zwergspitzmaus), der Igel u. a. m.

In unserer Zone ist der Igel ein Ungeziefervertilger, wie kaum ein anderes Tier. Wie in seinem großen Nutzen für den Menschen, so gleicht der Igel auch in seiner Fressgier noch am meisten dem Maulwurf. Insekten, Regenwürmer, Nacktschnecken, Frösche, Blindschleichen usw., alles das ver-  
speißt er mit dem größten Appetit, um den ihn mancher beneiden dürfte. In der Gefangenschaft sucht sich der Igel gar bald sein Futter, bestehend in allerhand Ungeziefer oder überhaupt in Lebewesen, die dem Menschen lästig sind. Es gibt auch kaum einen gründlicheren Mäusevertilger als den Igel. Allerdings werden auch wieder Fälle gemeldet, in denen

sich das Tier aus Nagern gar nichts macht und diese völlig unbeachtet läßt. Die Mäuschchen, die eine Plage in so vielen Wohnungen bilden, vertilgt er hier binnen kürzester Frist vollkommen. Ein Igel läßt sich als Ungeziefervertilger sehr gut ausnützen, wenn derselbe »mictweise« an Wohnungsinhaber abgegeben wird.

Der Kampf um das Dasein, das berechtigte Verlangen des Menschen, dort, wo er gesät hat, auch zu ernten, das heißt den erwarteten Nutzen aus seiner Tätigkeit zu ziehen, dann aber auch seine Person und seine tierischen Hausgenossen, seine Vorräte an Nahrungsmitteln und Gebrauchsgegenständen von Feinden freizuhalten, zwingen ihn, diese letzteren wenn irgend möglich überall aufzusuchen und zu vernichten. Dieser Kampf wird schon seit langen Jahren geführt und gestaltet sich immer intensiver, einerseits dadurch, daß Feld- und Waldkulturen immer sorgfältiger betrieben und beaufsichtigt werden, anderseits dadurch, daß durch die Fortschritte der Wissenschaft immer neue und auch vielfach geeignetere Mittel ausfindig gemacht werden, die angestrebte Vernichtung zur Durchführung zu bringen und damit die Verluste an Vermögen zu verringern. Während man sich früher oftmals mit dem Aufgebot intensivster Tätigkeit kaum der Schädlinge erwehren konnte, wenn sie einmal begonnen hatten ihr Unwesen zu treiben, da die geeigneten Mittel fehlten, ist man heute in der Lage, vielfach wirksame, unmittelbar tötende Substanzen in Anwendung zu bringen, anderseits aber auch schon Vorkehrungen zu treffen, um die Gefahren zu vermindern. Man unterscheidet daher dermalen zwischen vorbeugenden Maßregeln oder Mitteln und den eigentlichen Vertilgungsmitteln. Es ist eine feststehende Tatsache, daß dort, wo man beide Verfahren in der richtigen Erkenntnis ihres Wertes in Anwendung bringt, die schädlichen Einflüsse, entstammen sie von Tieren oder Pflanzen, sich erfolgreich bekämpfen lassen.



## Allgemeine Übersicht über die pflanzlichen und tierischen Schädlinge an Pflanzen.

Die pflanzlichen Schädlinge stehen sowohl nach der Zahl, als auch nach dem Umfange des Schadens weit hinter ihren animalischen Genossen zurück, aber trotzdem können sie unberechenbares Unglück anrichten und die Mühe und Plage nicht nur eines, sondern vieler Jahre vollständig zu nichte machen.

Es sind zu denselben zu rechnen:

Der Getreidebrand, Staubbrand, Stein- oder Stinkbrand, Roggenstengelbrand;

das Mutterkorn;

der Getreiderost;

der Blattschorf;

die Kartoffelkrankheit;

der Ritzenschorf;

der Hungerzwetschgen;

die Rotfäule;

der Erdkrebs;

die Kohlhernie und andere.

### Krankheiten des Weinstockes.

Die Chlorose (Entfärben der Blätter);

die schwarzen Knoten, Fäulnisstellen an der Rebe;

der Blütenfall vor ihrem Fruchtansatz (verursacht durch ungünstiges Wetter und schlechte Düngung);

der Sonnenbrand, durch Blattabfall, also Mangel an Schutz vor Sonne hervorgerufen;

die Traubensäule, bei feuchter und niedriger Lage entstehend;

die Anthraknose (Brenner, schwarzer Brand, Pech), Beulen und Flecken auf den grünen Teilen;

die schwarze Fäule (Black rot);

der Mehltau;

die Traubenkrankheit;

die Gummo.

Viele dieser Krankheiten sind auf Pilze zurückzuführen und treten häufig an solchen Orten auf, wo durch reichlich gebotene organische Nahrung und viel Feuchtigkeit die günstigsten Bedingungen für das Wachstum und die Fortpflanzung gegeben sind. Wie schnell unter solchen Umständen oft die Verbreitung gewisser Krankheiten beziehungsweise Pilzformen stattfinden kann, zeigt die Einwanderung der die Kartoffelkrankheit hervorruhenden *Phytophthora infestans* de By. und ebenso auch das rasche Umsichgreifen mancher Epidemien, die durch Bakterien verursacht werden. Da die meisten Pilze ohne Befruchtung vegetieren können, so trägt auch dieser Umstand dazu bei, die räumliche Ausbreitung derselben zu erleichtern. Jedenfalls haben auch schon in den früheren Perioden der Erde die Pilze eine ausgedehnte Verbreitung gehabt, doch sind nur wenige davon in fossilem Zustande erhalten.

Auch der Hauschwamm (Tränenschwamm, Aderchwamm) gehört zu den pflanzlichen Parasiten, jedoch nur auf totem Holz, die Polypenarten aber finden sich auch auf lebenden Bäumen.

Zu den pflanzlichen Schädlingen sind ferner auch sichtbare große Pflanzen, wie die Mistel, dann auch sogenannte Unkrautpflanzen, wie die Kleebeide (Glasbeide), die auf allerhand Kräutern und Sträuchern, besonders auf Hopfen und Nesseln vorkommt und ziemlichen Schaden anrichtet, zu zählen; meist wird die Wirtspflanze nicht getötet, sondern nur in ihrer Entwicklung gestört.

Den pflanzlichen Schädlingen an Zahl und Häufigkeit des Vorkommens weitaus überlegen, sind die tierischen, die man in Feld-, Obstbaum-, Forst-, Neben-, Küchengarten- und Blumengarten-Schädlinge einteilen kann.

Unter die Feldschädlinge werden gezählt:

Die Maulwurfsgrille (Werre, Riedfröte, Reutwurm, Erd- oder Molldworf, Erdfrebs);

die Erdruppen und Ackereulen; hierher gehört auch die Winterjaateneule, die Kreuzwurz-Ackereule;

die Gamma-, Spiloneule, Pistolenvogel (Lein-, Zuckererbseeneule);

die Feldheuschrecke, insbesondere die Zug- oder Wanderheuschrecke;

der Kolorado-Kartoffelkäfer, Koloradokäfer;

die Rübenblattwespe;

der Rübensaftpfeifer;

die dunkelrippige Rüsselmotte;

der Erbsenwickler (mondfleckiger, aschfarbener, olivenbrauner);

der Erbsenkäfer;

der gemeine Samenkäfer;

der Saatschnellkäfer;

der Getreidelaufkäfer;

der Getreideverwüster (Heffensfliege, Fliege);

das handfüßige Grünauge, die gelbe Halmfliege, Kornfliege;

die gemeine Halmwespe.

Als Obstbaumschädlinge sind zu nennen:

Der Schwammspanner (Dickkopf, Rosenspanner, Stammphaläne);

der Ringelspanner (Weißbuchen- und Zwetschgenspanner);

der Goldaster (Weißdornspanner, Nestraupenfalter);

der Baumweißling;

der kleine Frostspanner (Blütenwickler, Winterspanner, Spätling, Spanner, Reismotte);

der große Winterspanner (Blatträuber, Entblätterer, Waldlindenspanner);

der Apfelblütenstecher (Brenner);  
 der Birnknoipenstecher;  
 der Apfelwickler;  
 der Pflaumenwickler;  
 die Pflaumenfägewespe;  
 die Kirschfliege (schwarze Scheckfliege);  
 die Blutlaus oder wolltragende Apfelbaumrindenlaus.  
 Ausgesprochene Feinde dieser Insekten sind Schlupf-  
 wespen (Schneumoniden), Riesenschlupfwespen, Kohlräupen-  
 schlupfwespen.'

Obstbäume, dann auch andere Hochstämme und Sträucher, werden durch größere und kleinere Falter, Bohrsfliegen und deren Larven, durch Blatt- und Blutläuse, dann durch Käfer mitunter stark in Mitleidenenschaft gezogen, und es bedarf der vollsten Aufmerksamkeit nur dort, wo diese Schädlinge aufgetreten, sie zu vernichten und weitere Gefahren abzuwenden. Unter den Faltern ist es insbesondere der Schwammspinner (Rosenspinner, Dickkopf oder der Stammphaläne), welcher durch massenhaftes Auftreten großen Schaden bringen kann. Gelegentlich eines großen Fraßes der Raupen desselben im Berliner Tiergarten (Dr. Taschenberg, Die Insekten nach ihrem Nutzen und Schaden), wurden zahlreiche fremdländische Bäume von ihnen angegriffen und keine der dort wachsenden zahlreichen Arten ganz verschont, Laub- wie Nadelhölzern und von letzteren besonders auch den Kiefern zugeprochen. In einem Bergeinschnitte stehende Pflaumenbäume wurden ihres Laubes vollkommen beraubt, so daß man einzelne bohnen große Früchte, teilweise ebenfalls angefressen, an den Ästen sehen konnte und Tausende von Schwammspinnerräupen sich am Boden wälzten, von Hunger gequält. Nach älteren Berichten (1818) aus dem südlichen Frankreich waren durch dieselben Raupen die prächtigen Korkfichtenwälder zwischen Barbaße und Podenas gründlich kahl gefressen worden, darauf waren die hungrigen Scharen über die Mais- und Hirsefelder, die Futterkräuter hergefallen, ja aus einzelnen Wohnungen hatten sie durch ihr Eindringen die Bewohner vertrieben.

Aus Rußland wird berichtet, daß die Polizei die Vernichtung der in einigen Waldschluchten sich anhäufenden Raupenhäufen anordnen mußte, weil sie die Luft verpesteten. In einem anderen Gouvernement wurden 10.000 *ha* Wald von den Raupen kahl gefressen. Dergleichen Erscheinungen kommen glücklicherweise auf unserem Kontinent nur selten vor, aber mehr oder minder häufig findet sich die Raupe in fast ganz Europa und jenseits des Mittelländischen Meeres in Nordafrika, ferner in großen Teilen Asiens bis Japan, selbst auf Ceylon. Seit dem Jahre 1868 oder 1869 ist die Art auch nach Nordamerika, und zwar nach dem Staate Massachusetts eingeschleppt worden, und zwar unter Verhältnissen, die sehr interessant sind. Es muß die Bemerkung genügen, daß sich der Schmetterling hier, wo ihm keine natürlichen Feinde entgegentraten, in unglaublicher Weise vermehrt und die ausgedehntesten Verwüstungen angerichtet hat, so daß Hunderttausende von Dollars zu seiner Bekämpfung ausgegeben werden mußten.

Zu den Schädlingen der Forste von Bedeutung zählen:

Borkenkäfer, insbesondere der große Fichtenborkenkäfer oder Buchdrucker, in seiner Begleitung der ebenfalls Lotgänge fressende *Tomicus ansitinus* Eichhoff, der durch Sterngänge ausgezeichnete *Tomicus chalcographus* L. und einige andere. Ebenfalls sehr schädlich ist der in Tannenbeständen fressende *Tomicus curridens* Germ., der in Kiefern fressende *Tomicus stenographicus* L. und *Hylesinus piniperda* L. (Kiefernmarfkäfer), der als Käfer überdies die jungen Kieferntriebe anfrisßt. Ebenso verdienen noch zahlreiche andere Nadelholzbewohner als Bestandesverderber Beachtung. Laubhölzer leiden weniger unter den Borkenkäfern, weil sie festeres Holz haben und reproduktionsfähiger sind, als Nadelhölzer. Denselben schaden hauptsächlich Bastkäfer (*Hylesini*) und Splintkäfer (*Scolytini*), welche letztere nur im Laubholz ihre Lebensbedingungen finden. *Hylesinus crenatus* Fabr. und *fraxini* Fabr. haben schon oft an Eichen empfindlichen Schaden verurlicht, sogar

dieselben getötet, ebenso *Scolytus Ratzeburgii* Jans. Birken, *Scolytus destructur* Ol. Ulmen usw. Den Fichten werden verschiedene Bastkäfer schädlich, so der große (*Dendroctonus micans* Kugl.) und der schwarze (*Hylastes cunicularis* Knoch.) Fichtenbastkäfer. Mehrere Borkenkäferarten fressen nicht in der Bastschicht, sondern gehen tief in das Holz hinein und werden dadurch technisch schädlich, so die Nutholzborckenkäfer (*Tomicus* [*«Xylotherus»*] *lineatus* Oliv.) in Nadelhölzern, *Tomicus domesticus* L. in Laubhölzern, *Tomicus dryographus* Ratz. und *T. monographus* Fabr. in Eichen, *T. dispar* Fabr. in verschiedenen Laubbäumen; von letzteren Arten werden einige, so namentlich *Tomicus dispar* schädlich.

Rüsselkäfer treten meistens als Kulturverderber auf. Es gehören hierher:

Großer und kleiner brauner Rüsselkäfer in Kiefern und Fichten;

Weißpunkt-rüsselkäfer an Kiefern;

Kiefern-kulturpissodes an Kiefern;

Kiefern-altholz-pissodes an Kiefern;

Harz-rüsselkäfer an Fichten;

Kleine Fichten-pissodes an Fichten;

Tannen-pissodes an Tannen;

Triebbrüßler (*Magdalini*) an Kiefern und Fichten;

Kiefernknospenstecher an Kiefern.

Der große braune Rüsselkäfer richtet oft großen Schaden an, indem er ausgedehnte Pflanzungen von jungen Kiefern und Fichten durch Benagen der Rinde vollständig zerstört, dagegen ist seine Larve nicht unmittelbar schädlich, da sie sich in den im Boden zurückbleibenden Wurzeln gefälltter Bäume entwickelt. Der kleine braune Rüsselkäfer schadet durch den Fraß der Larve, die sich unter der Rinde junger Kiefern entwickelt. Eine große Anzahl der Rüsselkäfer schadet nur mehr oder weniger empfindlich durch Befressen der Triebe und Blätter, so die der Gattung *Phyllobius* und *Polydrosus* angehörenden, meist schön grün gefärbten Arten.

**Bockkäfer.** Hierher gehören vor allem der Schneider- oder Schusterbock, der Kiefern- und Föhrenbock an Fichten und Föhren; die Larven der Bockkäfer leben meist im Holz selbst; *Tetropium luridum* L. tötet die von ihm befallenen Nadelhölzer. Alte Eichen werden von der Larve des *Cerambyx cerdo* L. (heros Fabr.) durchwühlt, Bappeln von der *Saperda carcharias* L.; sterben auch diese Laubhölzer infolge des Fraßes zumeist nicht ab, so wird doch deren Holz krank und technisch entwertet. In jüngeren Trieben und Ästen der Aspe lebt *Saperda populnea* L. und verursacht knotige Anschwellungen. Viele Bockkäfer leben in Weiden, z. B. *Lamia textor* L., deren Larve durch Zerstörung der Stöcke schadet.

Blattkäfer schaden als Käfer und Larven durch Abfressen der Blätter. Forstlich wirklich beachtenswerten Schaden bringen nur die auf Weiden lebenden Arten in den Korbweidenanlagen, so die roten *Chrysomela* (*Melasoma*, *Lina*) *populi* L., *Chr. tremulae* Fabr., und *Chr. longicollis* Suffr., die dunkelmetallische *Chrysomela* (*Phyllodecta*) *vitellinae* L., *vulgatissima* L. und andere.

Andere Käferartenfamilien, z. B. die Prachtkäfer, die Schnellkäfer weisen ebenfalls forstlich schädliche, mehr oder weniger beachtenswerte Arten auf; *Agrilus vesicatoria* L. und verschiedene andere Arten töten durch den Larvenfraß junge Buchen und Eichen, die Larven einiger Schnellkäfer (Drahtwürmer) schaden durch Wurzelsfraß und Verzehren die Samereien in Saatkämpen.

Gefährlich werden in Forsten die Schmetterlinge, ja, sie sind vielfach gefährlicher als die Borkenkäfer. An erster Stelle stehen die Monne und der große Kiefernspinner. Die Raupe der Monne frisst sehr verschiedene Pflanzen, lebt aber vorzugsweise auf Kiefern und Fichten und wird besonders den letzteren gefährlich. Eine große Gefahr auch für die sorgsamst geschützten Waldgebiete liegt in dem großen Wandertrieb des Schmetterlings und man hat wiederholt gesehen, daß die Schmetterlinge in wolkenartiger Masse fortzogen. Der große Kiefernspinner ist ausschließlich Be-

wohner des Kiefernwaldes. Die im Boden, auch unter den Schuppen der stärkeren Rinde überwinternden Raupen, besteigen im zeitlichen Frühjahr, wenn die Bodentemperatur etwa 6—7° C erreicht hat, die Kiefern und fressen die Nadeln bis in die Blattseide ab. Wiederholter Fraß tötet oft ganz ausgedehnte Bestände. Ferner leidet die Kiefer auch durch den Fraß der Kieferneule, des Kiefernspanners, dann durch viele Arten der Kleinschmetterlinge und viele andere Schmetterlingsraupen. Weniger häufig geschädigt werden durch solche die übrigen Nadelhölzer, z. B. die Fichte, Tanne und Lärche. Wesentlich weniger empfindlich als die Nadelhölzer gegen den Raupenfraß sind die Laubhölzer. Vom Rotschwanz ganz kahl gefressene Buchenbestände erholen sich nach einem Jahre vollständig, ebenso von dem Prozessionsspinner kahl gefressene Eichen. Dieser Falter wird übrigens durch die Giftigkeit seiner Haare, die Entzündungen der Haut und Schleimhaut erzeugen, gemeingefährlich. Stark befallene Bestände müssen von Menschen und Vieh gemieden werden, da in denselben die Luft ganz mit den gefährlichen Haaren erfüllt ist. Laubbäume werden durch Raupenfraß wohl durch Zerstörung der Blüten und durch Zuwachsverlust geschädigt, niemals aber vernichtet. Doch können immerhin Kleinschmetterlinge auf Eichen (*Tortrix viridana* L.) und viele andere den verschiedensten Laubhölzern schaden. Auch Obstbaumschädlinge kommen in die Forste, so der kleine und der große Frostspanner, der Raupennester bildende Goldaster, der Ringelspinner u. a. Auch die Raupen des Weidenbohrers und der Glaschwärmer werden in Forsten gefährlich.

Unter den Blattwespen sind die Kiefernblattwespen, dann einige Holzwespen schädlich; der letzteren Larven durchwühlen das Holz von Kiefern und Fichten. Einige Gallmücken erzeugen Gallen, z. B. auf den Blättern der Rotbuche, ohne indessen wahrlich zu schaden. Die Larve von *Cecidomyia brachyntera*, Kiefernadel-Gallmücke, lebt während des Sommers zwischen den Nadelhaaren der Kiefer



in der Scheide. Am schädlichsten wird wohl die in den Weiden lebende *Cecidomyia salicis* Schok., Weidenruten-Gallmücke. Auch Larven der eigentlichen Mücken haben, im Boden lebend, mitunter junge Holzpflanzen in ausgedehntem Maße zerstört.

Die in der Erde lebende Maulwurfsgrille oder Werre steht in dem Rufe großer Schädlichkeit, vielleicht nicht ganz mit Recht, denn sie verzehrt Engerlinge und andere in der Erde vorkommende schädliche Larven, selten wohl auch Wurzeln, schadet aber sicher etwas durch das Durchwühlen des Bodens und Zerreißen der Wurzeln.

Nebenschädlinge sind:

Die Reblaus;

der Säuerwurm, Heuwurm, Beerenwickler, Spinnwurm, Göße, Wolf, Traubenwurm, Traubenmade, Weinswurm, Springwurm, Springwurmwicker;

der stahlblaue Nebensteher (Zapfenwickler);

der Weinstockfallkäfer.

Den Küchengartenjädlingen gehören an:

Die Kohlweißlinge;

die Kohleule (Herzwurm, Erbseneule, Gemüseeule, Sägerand, Flohstrauteule);

der Harlekin (Stachelbeerspanner);

die gelbe Stachelbeer-Blattwespe;

die Erdföhe (Kohlerdfloh oder Gartenhüpfer, Eichen-erdfloh, gelbgestreifter Erdfloh, Kressenerdfloh, Napserdfloh oder Goldkopf);

der Kohlgallenrüssler, gefurchthalsiger Verborgernrüssler;

der Mauszahnrüssler;

die Spargelsiege;

die Blumenfliegen (Rettichfliege, Schalottenfliege, Vollenmade oder Zwiebelfliege).

Unter die Blumengartenjädlinge werden gerechnet:

Die Blasenfüße (Getreideblasenfuß, schwarze Fliege oder rotschwänziger Blasenfuß);

die Rosenzikade, Zwergzikade oder sechslediger Lausus;

die Schildläuse (Scharlachläuse), Kaffeebaumchildlaus, strolchende Wollchildlaus, Trangenschildlaus, Pfirsichschildlaus, Rebenschildlaus, Eichenschildlaus, Rosen-Schildträger, Oleander-Schildträger, Lorbeer-Schildträger, Weißmuschel-Schildträger, San José-Schildlaus, europäische Pseudo-San José-Schildlaus;

die Blattläuse der Gattung Aphis, Rosenblattlaus, Erbjen-, Nelken- und Mohnblattlaus.

Feinde der Blattläuse: Marienkäfer (Kugelfäher, Herrgottsfäherchen), Florfliegen (Blattlauslöwen, Goldaugen).

## Allgemeine Übersicht über Ungeziefer, das Menschen und Tiere belästigt.

Überall, wo Menschen und Tiere Aufenthalt nehmen, finden sich naturgemäß auch wieder Tiere ein, die aus den ersteren Gewinn ziehen wollen, entweder in der Weise, daß sie alles, was im Hause erforderlich und vorhanden ist, in den Bereich ihrer Jagdtätigkeit einbeziehen oder Menschen und Tiere selbst als ihre Opfer betrachten. Demgemäß kann die Einteilung in die nachstehenden zwei Gruppen erfolgen:

1. Schädlinge und lästiges Ungeziefer im Hause, an Hausgeräten, Gebrauchsgegenständen und Nahrungsmitteln.

Fliegen (Stubenfliege, Stechfliege oder Wadenstecher, Schmeißfliege, auch blaue Fleischfliege, Brechfliege, Brummer, Brummfliege, Käsefliege);

die Hausgrille oder das Heimchen;

Küchenschabe, Schwabe, Kusse;

der Zuckergast oder das Fliechchen, auch Silberfliechchen;

Tausendfüßler, Aßeln, Kelleraßeln;  
 der Werkholz- oder Klopffäfer, Holzbohrer;  
 der Brotklopffäfer;  
 der Dieb oder Kräuterdieb;  
 der Speckfäfer;  
 der Pelzfäfer oder Kürschner;  
 der Kabinettfäfer;  
 die Kornmotte oder der weiße Kornwurm, der schwarze  
 oder braune Kornwurm;  
 die Motten oder Schaben (Kleidermotte, Pelzmotte,  
 Haarschabe, Mehlspeismotte, Federchabe).

## 2. Parasiten der Menschen und der Tiere:

Zu diesen zählen:  
 Die Wanze (auch Bettwanze, Hauswanze);  
 der Floh (Menschenfloh, Hundefloh);  
 die Läuse (Kopflaus, Kleiderlaus, Filzlaus), (Tierläuse,  
 Hühnerlaus, Schaflaus);  
 die Bremsen auch Brammen (Rinderbremse, Pferde-  
 Bremse, Biess- oder Däffelsiegen);  
 die Schnaken (Mücken, Stechmücken, Gelsen);  
 die Schaflausfliegen;  
 die Zecken (gemeine Hundsecke, Schaalsecke, Holzbock);  
 die Krätz- oder Räudemilben;  
 die Egel (Blutegel);  
 ferner gehören den Parasiten auch noch an: Bandwürmer,  
 Eingeweidewürmer (Spulwurm, Madenwurm, Peitschen-  
 wurm), Trichinen (Darmtrichinen, Muskeltrichinen), Medina-  
 oder Guineawürmer, Egel, Schmarotzertreibe, Fisch- und  
 Karpfenlaus.

## **Allgemeines über Mittel zur Bekämpfung der Insektenschädlinge auf dem Felde, in Gärten, Obst- und Weinrebenanlagen.**

Der Land- und Gartenwirt, der seine Pflanzungen aufmerksam durchstreift und solche beobachtet, findet sehr bald heraus, ob sich dieselben in dem von ihm gewünschten und erwarteten Zustande befinden oder ob dieselben infolge irgendwelcher Ursachen kränkeln, denn es zeigt ihm das Aussehen derselben dies deutlich. Das Vorhandensein von Blatt-, Blatt- und Schildläusen an seinen Obst- und Zierpflanzungen läßt sich nicht verkennen, vielfach beweisen es auch Mißbildungen, Verkrümmungen der Blätter oder gallenartige Auswüchse; Raupen an allen Pflanzen machen sich durch Abfressen der Blätter, durch ihre Puppen bemerkbar und es ist daher verhältnismäßig nicht schwer, bei einiger Aufmerksamkeit dem Ungeziefer Einhalt zu tun. Dies ist um so leichter, als es sich ja in vielen Fällen nicht um ausgedehnte Grundkomplexe handelt, sondern um kleine, bebaute Parzellen, denen sich entweder durch eine Anzahl von Personen, welche die Schädlinge ableben und töten oder durch chemische Mittel beikommen läßt. Auf diese Weise kann viel zur Vertilgung des Ungeziefers geschehen, doch soll solches eigentlich schon früher als vorhanden erkannt werden. Eine große Hauptsache bei allen Bestrebungen, Ungeziefer jeder Art auf Kulturpflanzen zu vernichten, ist das rechtzeitige Erkennen der Ansiedelung desselben und seiner Thätigkeit. Dieses Erkennen bietet große Vorteile gegenüber demjenigen, welcher den Schädlingsbefall auf seinen Kulturgewächsen erst einen derartigen Umfang annehmen läßt, daß es schwer oder mit vieler Mühe oder überhaupt nicht mehr möglich ist, denselben zu bekämpfen.

Solange Blatt-, Schild- und Blutlauskolonien sich im Frühjahr noch vereinzelt an wenigen Stellen der Obstbäume zeigen, Eier oder junge Räupchen gewisser Obst- und Holzschädlinge (Schmetterlinge) in Gespinnsten (vorzugsweise in Ast- und Zweigwinkeln) überwintern, ist es ein wahres Kinderspiel, dieselben zu vernichten, während solches eine schwere Arbeit dann bildet, wenn an Stamm, Ästen und Zweigen die Ansiedelungen der genannten Pflanzenläuse sich ausgebreitet haben oder das ganze Laubwerk der Kronen bereits voll freßgieriger Gespinnstraupen sitzt. Verlassen beispielsweise die Maikäferweibchen gegen Ende ihrer Schwärm- und Fraßperiode die Baumkronen, um sich in der Nähe ihrer bisherigen Futterstätten flach im Erdboden zu verkriechen und ebendasselbst ihre Eier abzusetzen, so ist alsdann das Ausgraben oder Aushacken dieser Käfer oder ihrer bereits in Klumpen abgesetzten Eier ein weit leichteres Werk, als eine spätere Vertilgung deren Engerlinge, zumal, wenn die letzteren, bereits älter geworden, sich weiter im Boden ausgebreitet haben. Setzen im Sommer die Kohlweißlinge ihre organisierten, orangefarbenen Eier auf die Unterseite der Blätter von Kohl und Kohlrabi und anderem Gemüse oder den Gartenblütenpflanzen ab, dann macht das Abjuchen dieser und das Zerdrücken viel weniger Mühe, als später das Abjuchen und Zerdrücken dieser Schmetterlings Eier und Töten der über alle Blätter in Massen ausgebreiteten Kohlweißlingsraupen. Es kommt also bei der Bekämpfung pflanzlicher und tierischer Nutzpflanzenschädlinge und Krankheiten hauptsächlich darauf an, daß dieselbe so früh und energisch wie möglich, daß sie ferner gemeinsam, das heißt von allen Besitzern und Pächtern benachbarter Obstpflanzungen, Garten, Feld, Wald und sonstigen Kulturgrundstücken in möglichst gleich umfangreicher und praktisch sachgemäßer Weise ausgeführt werde und ohne Verwendung solcher Mittel geschehe, die ägen oder jengen. Derartige Mittel schädigen die von Ungeziefer und Krankheiten heimge suchten Kulturen unter Umständen mehr und schwerer, als die Schmarotzer, welche vernichtet werden sollen; sie

müssen vielfach derart mit Wasser und anderen Flüssigkeiten verdünnt werden, daß sie das Ungeziefer oder die Krankheiten vernichten, dabei aber auch den Pflanzen nicht schaden. Giftstoffe, welche den Nutzpflanzen Schaden bringen oder harmlose Tiere und selbst den Menschen gefährden, sind von der praktischen Verwendung natürlich ebenfalls auszuschließen.

Bei dem Hereinbrechen großer Invasionen durch pflanzen-schädigende Insekten erweisen sich auch die besten Mittel als nicht ausreichend und wurden bereits vor mehreren Jahren in Amerika anlässlich eines Massenauftretens des Schwammspinners in den Forsten verschiedener Staaten der Union großartige Anstalten getroffen, um durch Überimpfung von Epidemien der Feinde Herr zu werden. Es wurden damals gewaltige Mengen mit Parasiten affizierter Schwammspinnerraupen aus Europa importiert und auf die lästigen Eindringlinge losgelassen. In England hat, wie »English Mechanic« meldete, der Zoologe Collinge neuerlich die Aufmerksamkeit auf die Wichtigkeit der Insekten selbst zur Vernichtung von Schädlingen aus dem Insektenreiche gerichtet. Er wies darauf hin, daß das bisherige Verfahren der Besprengung von Obstbäumen oder der Felder mit geeigneten Flüssigkeiten ein äußerst kostspieliger Prozeß ist, der überdies nicht einmal immer das gewünschte Resultat erreichen läßt. Die Versuche der Einführung geeigneter Insektenarten sind neuerdings wieder in Amerika, und zwar im Staate Kalifornien aufgenommen worden. Die prachtvollen Obstbestände Kaliforniens verdienen sicherlich volle Beachtung. In einem Distrikt von 200.000 ha sind ausgezeichnete Erfolge erzielt worden und der Staat ist im Begriffe, eine eigene Insektenstation zu errichten und Versuche zu entsprechender Verteilung im Lande zu treffen. Jedenfalls verdienen diese klugen und weitsehenden Vorsichtsmaßregeln alle Anerkennung. Noch steht das ganze Unternehmen gleichsam in den Kinderschuhen und vieles kann erst durch praktische Erfahrungen gelehrt werden; aber vor einigen Jahren war

der ganze Raum, der dem Studium dieser Art der Insektenvertilgung gewidmet war, eine Fläche von 12 m<sup>2</sup>. Auf noch kleinerem Platze hat das Londoner Zoologische Institut der Union seine Versuche ausgeführt, so daß man die Großartigkeit des neuen Planes gar nicht genug würdigen kann.

Man hat für die Bekämpfung der Schädlinge eine ganze Anzahl chemischer Mittel herangezogen, neben den schon früher bekannten mechanischen (Absuchen der Pflanzen und des Bodens, Anbringen von Leimringen, Raupenfällen, Fanggläsern usw.), doch kann man von beiden nur dann eine ausgiebige Wirksamkeit erwarten, wenn sie schon von allem Anfang an sehr sorgfältig zur Anwendung kommen und dann in geeigneten Zwischenräumen und so lange wiederholt werden, bis alle Brut ebenfalls zerstört ist.

Von berufener Stelle wird angeführt, daß ein Bespritzen der Obstholzschildlinge und deren Brutstätten mit irgendeinem der vielen alljährlich auftauchenden und seitens der Fabrikanten natürlich als von unübertrefflicher Wirksamkeit angepriesenen Insekten tötenden Mitteln in seiner Absoluten sich als sehr unzuverlässig und wenig befriedigend erweisen würde. Von den mechanischen Mitteln sollen die Raupenscheren und Raupenfackeln nur da in Tätigkeit treten, wo man mit Händen, Messern und Scheren nichts mehr ausrichten kann und namentlich nur zu laubloser Zeit, bei trockenem, windstillem Wetter gebraucht werden. Haben die Obstbäume im Frühjahr wieder ausgetrieben, so wird jede, auch die beste Raupenfackel bei noch so vorsichtiger Handhabung des Instrumentes im Baumgezwige hinderlich. Von den Raupen wird wenig verbrannt, denn man müßte zur Vernichtung auch das Laub anbrennen. Man läuft Gefahr, daß junge Räupchen das Gespinnst mit der zunehmenden Wärme verlassen und ebenso wie die großen Raupen zu Boden fallen; viele der Raupen werden nur leicht angefangt, die Aufgangsteller unter der Flamme hindern mehr, als sie Nutzen bringen, die Raupen kommen ebenfalls zur Erde und es

muß noch eine gründliche Absuchung nach diesen letzteren stattfinden.

Unendlich mannigfaltig sind die Arbeiten des Land- und Gartenwirtes, um den zahlreichen Schädlingen der Kulturen zu begegnen; es erhellt dies aus Mitteilungen der k. k. Pflanzenschutzstation in Wien, welche für den Monat Juli folgende Tätigkeit empfiehlt: Schonung der Feinde der Kulturschädlinge, speziell der Insekten fressenden Vögel und der Maulwürfe! Fangen der großen Schnecken mit Netzen, Aufstreuen von gelöschtem Kalk gegen Acker- und Gartenschnecken (Vorsicht, den Kalk nicht in die Augen bringen, nachher sich mit Öl waschen, nicht mit Wasser), Vernichten der Larven der Spargelfäfer, der schädlichen Raupen, der Blattkäfer (Besprengen mit Schweinfurtergrün), Abfangen der schädlichen Schmetterlinge, wie Goldfalter, Weidenbohrer und Nonne. Ableben der von Maden oder von Raupen befallenen Obstfrüchte und Verbrennen derselben. Achtung auf Sellerieflye, Hopfen Spinner, Getreideläuse und auf die Schildläuse. Gegen Blattläuse mit 1%iger Tabakextraktlösung spritzen und dann eine Stunde später noch mit Wasser, Ableben der Raupen der Kohl- und Erbseneule, der Gammacule, Abschütteln der Blattwespenraupen von den Johannisbeer- und Stachelbeersträuchern auf untergelegte Tücher und Vernichten der Raupen. Gegen Blattflöhe Spritzungen mit 1%iger Tabakextraktlösung und Bestreuen der Pflanzen mit Sand. Einsammeln und Vernichten der pockenkrankten Birnbaumblätter und der von Milben verunstalteten Weinrebenblätter (Zülbildungen an der Blattunterseite). Sorgfältige Bekämpfung der Blutlaus von ihrem ersten Erscheinen an. Die durch Moniliaerkrankung welken und braundürren Blätter der Apfel-, Kirschen- und Weichselbäume und auch die schon toten Triebe, deren Knospen sich überhaupt nicht entwickeln, sind sorgfältig gut bis in das gesunde Holz zurückzuschneiden und zu verbrennen. Die auf Obstbäumen vorhandenen Heckenbesen sind hinter den knolligen Anschwellungen wegzuschneiden. Die Äste, die Narren oder Taschen tragen,



müssen bis in das gesunde Holz zurückgeschnitten und verbrannt werden. Gegen die Kräuselfrankheit der Pflirsche ist jetzt sofort dasselbe anzuwenden. Bespritzungen helfen nichts mehr. Die sich etwa an den Ästen, beziehentlich Stämmen der Obstbäume zeigenden jungen Fruchtkörper höherer Pilze (*Polyporus*) müssen sofort ausgeschnitten, eventuell ausgestemmt und die Baumwunden mit Leeranstrich versehen werden. Tritt auf Reben der echte Mehltau (*Oidium Tuckerii*) auf, so muß sofort an windstillen Tagen, am besten vormittags nach Abtrocknen des Taues, mit feingemahlenem Schwefel (nicht Schwefelblumen) bestreut werden. Gegen den falschen Mehltau (*Peronospera viticola*) ist bei Eintritt nasser Witterung mit neutralen Kupferkalkmitteln zu spritzen.

Heinrich Freiherr von Schilling hat sich in seiner Arbeit »Praktischer Ungezieferkalender« (1902) der Mühe unterzogen, eine Zusammenstellung einer großen Anzahl von Pflanzenschädlingen, wie sie in den einzelnen Monaten des Jahres auftreten, zu geben. Es werden in dem angegebenen Buche namhaft gemacht:

### Jänner.

Großkopf (die Eierablagen), Apfelblütenstecher, Kornrüssler (in den Getreidemagazinen), Erbsefäßer (in den getrockneten Erbsen), Weißkopfmünierfliege (an Topfpflanzen die Made), Kissenmade (speziell an Kissen).

### Februar.

Goldafer und Baumweißling (Maupenneister), Lastträger oder Schlehenspinner (Weispinse, Eier, Markschabe (Larve), Birn- und Holzweisse Larve, Birn- und Eibischbildläuse (Insekt und Eier), Austerförmige Schildlaus (Schildchen), Kupferglucke (Larven), Birnknochenstecher (Larve, Schwarzer Springhwan; Made, Springhwanze, Poduren, Schneefloh (Insekt).

## März.

Großer Fuchs (Schmetterlinge, Raupen), Birnknoipenstecher (Larve), Kirschenspinner (Eier), Mistbeet-Käfermilbe (Spinnetier), Weinbergschnecke (Tier), Engerling (Larven der Maikäfer), Apfelwickler (Raupen in Korken eingesponnen), Gartenameise, Rebeule (Raupen), Spargelhähnchen, Spargelkäfer, Blattläuse an Kletterpflanzen, Apfelblütenstecher (Käfer), Weiße (Insekt) in der ersten Sommerhälfte nutzbringend.

## April.

Schildläuse (Eier), Apfelblütenstecher (Käfer und Eier), Markusfliege (Larve und Fliege), Rosenstammotte (Räupchen, Schmetterling), Ameisen, Pfirsichmotte (Schmetterling), Goldgelber Rosenwickler (Räupchen), Rosenschildlaus (alte und junge Tierchen), Wollschildlaus, Honiglaus (alte und junge Tiere), Nadelholz-Wollläuse (alte und junge Tiere), Johannisbeer-Glasflügler (Raupen, Puppen, Schmetterling), Rindenwickler (Räupchen, Schmetterling), Junge Blattläuse, Berre, Maulwurfsgrille (Tier), Erdfloh (Käfer, Larven), Pflaumenblattlaus (Tier), Weißer Springschwanz (Made), Erbsengrassrüßler (Käfer), Ameisen, Knospenwickler-raupen, Hornisse, Walzigesackmottenräupchen, Schmalbauch (Käfer, Larven), Raucher, Liebstöckelrüßler (Käfer), Hundstagsfliege, Wurzelsfliege (Made), Tannenglucke (Raupen), Kleiner Frostspanner (Schmetterling, die Weibchen, ungeflügelte Räupchen), Großer Frostspanner (Larve), Ringelspinner (Eier, Raupen), Weißflügeliger Rosenwickler (Räupchen), Kleine Acker- und Gartenschnecke, Schwammspinner (Eier), Rosenzikade (Larve, Insekt), Stachelbeerblütenmade, Birnhauger, Blattfloh, Springlaus (Insekt, Eier), Heßensfliege (Insekt, Made), Gartenhaarmücke (Larve), Birnbaum- und Prachtkäfer (Käfer, Eier), Pflaumenlaubweisse (Insekt, Eier, Larve), Ameise.

## Mai.

Wurzelfliegen (Larven), Rosenblattlaus (Tier), Stachelbeerblattwespe, gelbe und schwarze (Larve), Spargelhähnchen, Spargelkäfer (Eier, Käfer), Schneckenförmigesackmottenröupchen, Birnenlaus (Insekt, Eier), Gemeiner Tausendfuß und getüpfelter Tausendfuß, Zwergzikade (Insekt, Eier), Kleiner Frostspanner (Raupen), Ungleiches Vorkenkäfer (Käfer, Eier), Ameise, Naskäfer (Larven), Blattwickler (Insekt, Eier, Raupen), Blütenglanzkäfer, Maikäfer (Käfer, Eier), Rohlgallenrüssler (Insekt, Eier, Larven), Spargelfliege (Insekt, Eier), Tannenlaus (Tier, Eier), Großer brauner Kiefernrüssler, Birnblattgallmücke, Kleiner Frostspanner (Raupen), Dreipunktiger Rosenwickler (Räupchen), Apfelblütenstecher oder Raiewurm (Eier, Larve), Rohlmade, Rohlgallenrüsslerlarve, Markschabe (Räupchen), Rosenblattminiermotte (Räupchen, Falter), Raufkäferchen (Käfer und Larve), Schwarze Rosenblattwespe (Tier und Larve), Braunbeiniger Lappendrüssler, Rosentriebbohrer (Larven von Blattwespen), rote Spinnen, Eichenwollaus, Schildkäfer (Larven), Himbeerkäfer (Käfer, Eier, Larven), Weißgegründelte Rosenblattwespe (Larve), Kirchkernmotte (Räupchen), Nonne (Falter, Puppen, Räupchen), Fichtenrindenwickler (Raupen), Pflirschmotte (Räupchen), Werra auch Maulwurfsgrille (Eier, Junge), Harlekin (Falter, Eier, Raupen, Puppen), Kirchkernstecher, Kirchenspinner (Raupen, Puppen), Wickler, Drahtwurm (Käfer, Larven), Ameisen, Gartenlaubkäfer, Zwiebelfliege (Made), Tagpfauenauge (Schmetterling, Eier, Raupen), Birntrauermücke und Birngallmücke (Maden).

## Juni.

Geispinzmotten (Schmetterling), Weinblattmilbe, Rosenbuschhornwespe (Insekt, Räupchen, Eier), Blutlaus, Himbeer-glaskügler (Larve), Pflischkäfer (Käfer, Larven), Himbeerblattläuse, Pechbrauner Lappendrüssler, Wachsmotte (Falter, Eier, Raupen), Rosenstecher, Blattläuse, Blattflederminier

motte (Räupchen, Schmetterling), Fliedermotte (Räupchen), Zapfenwickler oder Nebenstecher (Käfer, Eier, Larven), Blutlaus, Schaumzirpe (Larve, Eier), Apfelwickler (Falter, Eier, Räupchen), Blattwickler (Puppen), Strauchwanze (Larve), Rosengoldkäfer, Blattrippenstecher (Insekt, Larve), Heuwurm (Räupchen), Rosengeispinstblattwespe (Larve), Blaukopf auch Brillenvogel (Raupen, Puppen), Möhrenfliege (Larve, Eier), Apfelwickler (Falter, Eier, Räupchen), Apfelbaumglasflügler (Falter, Eier, Puppen), kleinste Rosenblattwespe (Insekt, Eier, Räupchen), Kohlherzmade, Johannisbeerwickler (Falter, Eier, Räupchen), Dianeneule (Falter), Schwarze Rosenblattsägewespe (Insekt), Ulmengallaus, Gemüsecule (Falter), Kartoffeltriebbohrer (Raupen), Apfelsstecher (Käfer, Eier, Larve), Pflaumenjägewespe, dann Pflaumendreher und Pflaumenwickler (Insekt, Eier, Larven), Mauszahnrüßler (Käfer, Eier, Larven), Pflirsichmotte (Falter, Eier), Kohlwanze auch Schnecke, Erd-, Rand- oder Wiesenwanze (die meisten Wanzenarten sind jedoch nützliche Tiere), Pappelbock (Falter, Eier, Larven, Puppen), Tagpfauenauge, Birnbaumprachtkäfer (Larve), Ampfereule (Falter, Raupen, Puppen), Erdbeerfruchtkäfer (Käfer, Eier, Puppen), Blaulaub (Falter, Eier, Raupen), Baumweißling (Falter, Eier, Raupen), Kupferglucke (Raupen, Puppen), Weidenbohrer (Falter, Eier, Larve, Puppe), Erbsenwickler (Falter, Eier, Räupchen), Geispinstmotte (Puppen, Geispinsten).

### Juli.

Spargelhähnchen (Käfer, Eier, Larven), Apfelwickler (Räupchen), Ameise, Blasenfuß (Insekt, Larve), Gänsefußcule (Raupen, Puppe), Meerrettich- und Blattkäfer (Käfer, Eier), Selleriefleie (Insekt, Eier, Maden), Pflirsichmotte (Schmetterling, Eier, Räupchen, Puppen), Rummelmotte (Schmetterling, Eier, Raupen, Puppen), Rosenblattgoldmücke (Insekt, Eier, Maden), Hopfenspinner (Schmetterling, Eier, Raupen), Getreidelaufräfer, Apfelwickler, Kohleule und Erbseneule (Falter), Weidenblattwurm und Wespe (Eier,

Maden), Gammaeule (Falter, Eier, Raupen, Puppen), Kohlerdschnafe (Insekt, Eier, Maden), Schildläuse (Maden, Efeu-Mottenschildlaus, Getüpfelter Tausendfuß, Bohnen-Mottenschildlaus (Eier, Maden), Großes Nachtpfauenauge auch Weißer Nachtpfau (Falter, Raupen, Puppen), Blattweiden-, Bürsthornwespe (Insekt, Larve), Goldaster und Schwan (Falter, Eier, Raupen), Großer Gabelschwanz oder Hermelinspinner (Raupen, Puppen), Rettich-, Verborgenrüßler (Larve), Abendpfauenauge (Falter, Eier, Raupen), Rasengrille (Insekt, Larve), Wiesenheuschrecke (Insekt, Larve), Schaflausfliege auch Schaßecke und Schaßtecke genannt, Weidenbohrer (Falter, Eier), Birnblattmilbe (Tiere, Eier), rote Eichenlaus, Buchenspinner (Raupen), Nonnen (Falter, Eier), Haselnußbohrer (Käfer, Eier, Larven).

### August.

Apfelwickler (Maden), Gurkenälchen, rote Spinne, Gammaeule (Raupen), Obstblattminiermotte (Falter, Räupchen), Wegschnecke, Apfelwickler (Maden), Blattfleckenminiermotte, Pfeifer auch Kaps- oder Rettichsamenpfeifer (Falter, Eier, Räupchen), Rosenblattschneider und Tapeziererbiene (Brut), rote Spinne, Erdbeerblatt-Miniermotte (Falter, Eier, Räupchen, Puppe), Erlenblattkäfer (Käfer, Eier, Maden), Schneeballfruchtkäfer (Käfer, Larve), Lattichfliege (Insekt, Maden), Lindenschildlaus, Kohlweißling (Falter, Eier, Raupen), Weinschwärmer (Raupe), Oleanderschwärmer (Falter, Eier, Raupen), Meerrettichspanner (Falter, Raupen, Puppen).

### September.

Apfelwickler (Maden), Wurzelmilben (Tiere, Eier), Schnecken (Eier), Totenkopf (Schmetterling, Eier, Raupen), Kirschblattwespe (Insekt, Eier), Schwalbenschwanz (Falter, Raupe, Puppe), Goldaster (Räupchen), Hausmütterchen (Raupe), Zwiebelmotte (Eier, Raupen), Rosen-Tuliermade,

Ameisen, Gemüsemotte auch Kohlschabe (Räupchen, Püppchen), Hornisse, Rosengrünauge, Eichblattgallwespe, Wespen, Walker oder Riesenmaikäfer (Larve), Rübenblattwespen (Eier, Raupen), Rotchwanz (Raupen, Puppen).

### Oktober.

Engerling, Schildkäfer, Schildlaus, Miniatur-Äpfelwurm (Räupchen, Puppen), Saateulen (Falter, Eier, Raupen), Lorbeerjauger, Frostspanner (Spanner, flügellose Weibchen, Eier), Weinbergschnecke (Schnefeneier), Kohlgallenrüssler (Käfer, Eier, Larven), Johannisbeer-Wurzellaus, Kirchfliege (Maden), Erbsemmotte (Räupchen), Blattlaus (Eier).

### November.

Marzfliege (Eier), Kohlweißlingspuppen, Regenwürmer in Blumentöpfen, Kammschildlaus auch Miesmuschelschildlaus, Obstbaum- und Splintkäfer (Eier), fugeliger Bohrkäfer, Ringelspinner (Eier), Schneeballfrucht-käfer (Eier), Äpfelwickler (Maden), Heimchen (Eier), Johannis- und Stachelbeerschilbläuse.

### Dezember.

Blasenfuß (Trips) auch schwarze Fliege, Äpfelwickler, Erbsenpizmäuschen, Zuckergast auch Silberfischchen.

## Allgemeines über Mittel zur Bekämpfung von Insektenschädlingen in Forsten.

Alle schädlichen Forstinsekten hinterlassen gewisse Erkennungszeichen ihrer Anwesenheit und ihrer Tätigkeit und jede Gruppe der Waldverderber ist an einer Reihe derselben erkennbar und bestimmbar; hierdurch wird es dem Forstmann

wieder erleichtert, sich über den Feind Klarheit zu verschaffen und die geeigneten Mittel zu seiner Vertilgung in Anwendung zu bringen.

Man erkennt den Blatt- und Nadelfraß der Schmetterlingsraupen und Asterrauen ebenjowohl am Blatt- und Kotsfall, als an der Lichtung und Verfärbung der Baumkronen, den Fraß der Blattkäfer an den Rippensteletten der Blätter, den inneren Kleinfraß der Kleindraupen und verschiedener anderer Larven an Verkürzungen und Verkrümmungen von jungen Trieben, am Zurückbleiben von Knospen, an Winnengängen in den Blättern, an Mißbildungen der Samen und Früchte, an galligen Anschwellungen, an ferkartigen Bildungen, am Harz- und Rotaustritt aus Knospen und Rinde usw.

Die äußerlich nagenden oder saugenden Insekten erzeugen Wunden und Stichlöcher, die sich verfärben oder Säfte und Harz austreten lassen, Vergründungen und häufig Verkürzungen, Verkrümmungen und Verfärbungen der befallenen Triebe hervorruhend. Die Wurzelschädiger haben kümmerlichen Wuchs der oberirdischen Teile, Welken und Verfärben von Blättern und Nadeln zur Folge. Die in Rinde und Holzkörper lebenden Schädlinge verraten sich durch Saft- und Harzaustritt, durch ausgeworfenes Bohrmehl und Nagepäne, durch Einbohr- und Ausfluglöcher, durch Welken und Loslösen der Rinde, durch Gänge in derselben, durch Welken und Verfärben der Krone usw. Aber auch innerhalb der genannten Gruppen sind nach Dr. Nüsslin die Erkennungszeichen mehr oder weniger verschieden, je nach der Art des Insektes. Der Blatt- und Nadelfraß ist meist charakteristisch verschieden von Ort zu Ort. Die Raupen der Nanne, des Kiefernspinners und Kiefernspanners und die Kiefernblattwespen-Asterraupe befreissen die Kiefernadeln verschieden, je nach ihrer Art. Noch viel verschiedener und daher charakteristischer sind die »Fraßbilder« der rinden und holzbewohnenden Insekten, ganz besonders diejenige der Mutter- und Larvengänge nagenden Bohrkäfer. Nicht selten zeigen zwei als Käfer kaum zu unterscheidende Arten sehr

verschiedene Fraßbilder, deren Untersuchung viel sicherer und rascher zur Erkenntnis der Art führt, als die zoologische Bestimmung des Insektes. Zum Zwecke der raschen und sicheren Erkennung eines Insektenfeindes müssen alle charakteristischen Erkennungszeichen gleichzeitig ins Auge gefaßt werden: die Art des Fraßes, also das Fraßbild, der Ort des Fraßes nach Pflanzenart, Baumteil, Alter der Holzpflanze, Höhenlage und Lokalität, das Aussehen des Insektes, sei es Larve, Puppe, Imago oder Ei, der Zeitpunkt des Fraßes, beziehungsweise des Lebensstadiums des Insektes, der Kot desselben, dann besondere Kennzeichen der Gespinnstfäden, ausgechiedene Wachswolle, ausgetretene Baumflüssigkeiten, Harz usw. Die meist erhebliche Regelmäßigkeit der Systeme für die einzelnen Individuen einer Art, andererseits die an Abstufungen reiche Mannigfaltigkeit bei den verschiedenen Arten lassen für den Kenner in nur wenigen Fällen einen Zweifel über die Art des Schädlinges aufkommen.

Wie bei vielen anderen Arten des Ungeziefers ist die Verbreitung der Forstschädlinge besonders dadurch bedingt, daß man das außergewöhnlich zahlreiche Auftreten derselben in den selteneren Fällen rechtzeitig erkennt und daß man eine drohende Invasion mangels richtiger Beobachtung nicht im voraus ankündigt. Nach Dr. Rüßlin (Leitfaden der Forstinsektenkunde) entstehen weitaus die meisten Insektenkalamitäten aus am Orte selbst gelegenen kleinen Anfängen oder Herden infolge allmählichen, mehr oder weniger raschen Anwachsens des stets vorhandenen sogenannten »eisernen Insektenbestandes« durch außergewöhnliche fortgesetzte Vermehrung. Nur selten kommt ein schädliches Insekt aus der Ferne herbei, sei es durch Überflug, oder durch Zuwanderung, oder durch Verschleppung. Für den Forstmann ist es daher von hoher Bedeutung, sich über den jeweiligen normalen Bestand an schädlichen Insekten Gewißheit zu verschaffen, weil nur so eine Erkennung des Anwachsens zu außergewöhnlichen Zuständen möglich ist. Dies ist aber nur durch unausgesetzte Beobachtung auf



Grund der erworbenen forstwirtschaftlichen Bildung möglich und die Praxis bietet dem Waldwirtschafter überall und fast täglich Gelegenheit, den Blick zu schärfen und zu erweitern. Die Stockfällungen bieten unter anderem sehr leichte und einfache Hilfsmittel, um die Stände dieser forstlichen Borken-, Rüssel- und Bockkäfer beurteilen zu können, sei es durch Untersuchung der Dürrständer, sei es durch Liegenlassen und fortdauernde Beobachtung einzelner Stämme. Auch durch indirekte Kennzeichen kann der Forstwirt auf eine abnorme Vermehrung der Schädlinge aufmerksam gemacht werden. Sobald ein Schädling sich außergewöhnlich zu vermehren beginnt, nimmt auch die Zahl seiner Feinde zu und diese sind oft auffälliger, als der Schädling selbst. Altum hat in dieser Hinsicht besonders auf die zunehmende Häufigkeit des Kuckucks durch die Verkleinerung seiner Jagdgebiete im Falle einer ausbrechenden Raupenkalamität aufmerksam gemacht. Auch der sonst seltene, bei Raupenkalamitäten rasch zunehmende und leicht sichtbare große Blätterlauskäfer zählt hierher. Von größter Wichtigkeit für die Vorherjage von Insekteninvasionen ist auch die rechtzeitige Würdigung derjenigen Faktoren, welche Insektengefahren begünstigen. Windsfälle, Schneebrüche, Hüttenrauch, Waldbrände, Raupenfraß locken Schädlinge, besonders Borken- und Rüsselkäfer herbei und müssen deshalb zu besonderer Vorsicht mahnen.

Die Mittel zur Verhütung der Insektenschäden in Forsten sind entweder Vorbeugungsmittel oder mittelbare und unmittelbare Vertilgungsmittel. Die Vorbeugungsmittel betreffen entsprechende Vorkehrungen bei der Forsteinrichtung, beim Waldbau, bei der Forstbenützung und auch hinsichtlich des Forstschutzes. Die beiden ersteren fallen außerhalb des Rahmens dieses Buches; bei der Forstbenützung muß dahin getrachtet werden, daß gefälltes Holz, das als Brutstätte dienen könnte, rechtzeitig aus dem Wald entfernt oder durch Dörren an der Sonne auf besonderen Lagerplätzen, durch Abschälen der Rinde und Verbrennen derselben, getrocknet werde. Gegen im Holz brütende Insekten

müssen beide Verfahren: Ausdörren der geschälten Stöcke durch Lagern an freien sonnigen Stellen zur Anwendung kommen. Durch den Forstschutz werden Beschädigungen durch Wind, Frost, Hitze, atmosphärische Gifte hintangehalten oder in ihren Nachwirkungen paralytisiert, ebenso auch Schäden durch Wild und gefährliche Mager hintangehalten. Zu den forstschutzhlichen Maßregeln gehört ferner der Schutz der den Insekten feindlichen Tiere: Fuchs, Wiesel und Hermelin, die Insekten ebenfalls fressen, der Fledermäuse, eine große Anzahl von Vögeln (Drosseln, Krähen, viele Raubvögel) und endlich die wahren Insektenfresser: Maulwürfe, Spitzmäuse und Igel. Nützlichen Vögeln sollte im Walde Gelegenheit zur häufigeren Ansiedelung gegeben werden, sei es durch Schaffung natürlicher Niststätten, Erhaltung hohler Bäume, sei es durch Anbringung künstlicher Nistkästchen; der Star läßt sich im Walde am leichtesten ansiedeln.

Bei der Vertilgung der schädlichen Forstinsekten soll man vor allem trachten, die Herde derselben zu entdecken und hier mit den geeigneten Maßregeln einzuwirken; freilich wird dabei immer in Berücksichtigung zu ziehen sein, ob die aufzuwendenden Kosten im Verhältnisse zum Werte, den die Maßregel hat, stehen. Bei Borkenkäfern und Rüsselkäfern darf man als feststehend betrachten, daß es in der Macht des Waldwirtes gelegen ist, die durch dieselben drohende Katastrophe zu verhindern, wenn nicht außerordentlich begünstigende Umstände, Massenfraß von Raupen, ausgedehnter Hüttenrauchschaden oder nicht zu bewältigender Windwurf vorangegangen sind. Das Radikalmittel, das Fällen der Bäume, ist immer der letzte Ausweg und man muß damit in vielen Fällen vorsichtig sein; beim Borkenkäfer kann es speziell bei der Tanne vorkommen, daß die Stämme voll verhärteter Harztropfen sind, und wie mit Stalk bespritzt erscheinen, ohne daß eine wirkliche Lebensgefahr für dieselben vorliegt, dann nämlich, wenn die Stämme noch zu vollsaftig gewesen sind und sein Angriff daher vergeblich war, seine Einbohrungen keine Brutablage zur Folge gehabt haben. Ein Abtrieb des Bestandes wäre in

einem solchen Falle übereilt und nicht gerechtfertigt. Ebenso kann es, beim Blattwespen- und Kiefernspannerfraß, selbst im Falle eines Rahlstraßes der Kronen, geboten sein, mit der Fällung zu warten; bei einem folgenden milden Winter kann sich derselbe noch erholen.

Die zu Gebote stehenden unmittelbaren Vertilgungsmittel, bei denen der Schädling an seinem Aufenthaltsorte aufgesucht wird, sind natürlich verschieden, je nach dem Entwicklungsstadium, in dem derselbe sich befindet (Ei, Larve, Puppe oder Imago oder in mehreren Stadien zugleich). Maikäfer, Rüsselkäfer, Blattkäfer, Blattwespenlarven und Kieferneulenraupen werden durch Schütteln oder heftiges Stoßen zum Herabfallen gebracht und gefangen, Puppen der Kiefernspanner und der Kieferneule an Wintertagen durch eingetriebene Schweine gefressen, durch Bodenauffeuer getötet, mittels Rechen auf Haufen gesammelt und getötet, Blattläuse durch Bespritzen mit wirksamen Flüssigkeiten zum Absterben gebracht, Rottenraupen mittels Antinnonin, im Boden lebendes Ungeziefer, wie Maulwurfsgrillen, Wurzelläuse, Engerlinge durch Eingießen von Petroleum, Karbolineum-Emulsionen vernichtet. Da, wo plötzlich große Invasionen von schädliche Eier ablegenden Faltern einfallen, wird man Leute aufbieten, welche diese Tiere an den Stämmen ablesen oder gleich zerquetschen, wie man überhaupt auf Eiablagen an den Stämmen stets aufmerksam sein wird und sie ebenso wie jedes schädliche Insekt sofort vernichtet.

Als mittelbares Vertilgungsmittel benützt man bekannte Nahrungsmittel für die Schädlinge, die man an geeigneten Orten niederlegt oder bietet denselben Schlupfwinkel und Brutstätten, die sie dann aufsuchen. Als Lockmittel kommen für viele Schmetterlinge, besonders Eulen, Apfelschnitte, dann für viele Rüsselkäfer frische Rinde, gezuckertes Bier mit Zusatz von künstlichem Apfeläther usw. in Betracht. Alle diese Mittel müssen natürlich in entsprechender Menge im Walde ausgelegt und dann am besten, wenn sie ihre Dienste getan haben, verbrannt werden. Andere Mittel sind Fangbäume, Fangkloben, Fangrinden und Fangreißig, in denen sich die

Insekten behufs Ablagerung der Eier sammeln. Fangbäume werden etwa sechs Wochen nach dem Anflug entrindet, die Rinde verbrannt, das Fangreisig und die Fangkloben werden, wenn sie den Dienst geleistet haben, verbrannt. Bei Masseninvasionen werden Fanggräben für Käfer und Raupen, Fanglöcher für die Maulwurfsgrille errichtet, in welche die Schädlinge, auf der Wanderung begriffen, fallen, nicht mehr heraus können und durch Zusammenstampfen getötet werden. Reisigwälle mit und ohne Klebemittel für wandernde Raupen sind vielfach in Anwendung; für die Raupen der Nonne, des Kiefernspinners und des Frostspanners, dann aber auch für verschiedene Käfer haben sich die Kleberinge fast allenthalben Eingang verschafft.

Revierförster Tollach empfiehlt nach Fricks »Rundschau« das nachstehende Vorbeugungsmittel:

Kräftige Durchforstung und Erziehung gemischter Bestände; erstere, weil undurchforstete Wälder stets die eigentlichen Brutstätten der Nonne bilden, während lichte Bestände von ihr verschont bleiben. Letztere deshalb, weil Mischwaldungen sich gegen alle schädlichen Einflüsse am widerstandsfähigsten erwiesen haben. So lange noch kein Abschluß der Nonnengefahr zu erwarten ist, bleibt die Pflicht der im Frühjahr und Sommer durchzuführenden Arbeiten bestehen. Diese sind:

1. In allen Beständen, wo im Herbst ein stärkerer Falterflug beobachtet worden ist, sind jetzt Probefällungen zu veranlassen, um sich sicher über die Menge der Eierablage zu informieren.

2. Gleich anfangs April sind die Kontrolleimungen durchzuführungen, welche sich bis jetzt als Kontrollmaßregeln bewährt haben.

3. Mitte April und anfangs Mai Töten der Spiegelraupen.

4. Probefestanzfällungen zum Zwecke der Raupenkonstatierung und Revision der Notprobeflächen.

5. Gewinnt man den Eindruck, daß sich voraussichtlich ein Fraßherd bilden könnte, so ist diese Fläche sofort

zu isolieren und dieser Teil noch während des Raupenzustandes zum Abtrieb zu bringen.

6. Im Sommer fleißiges, unausgesetztes und gründliches Abjuchen nach Raupen, Puppen und Faltern.

7. Das Absammeln erfolgt unter Aufsicht des Forstpersonales und soll nicht im Taglohn, sondern nach Stückzahl entlohnt werden, weil die Bestände gründlicher abgesehen und die Beaufsichtigung erleichtert wird.

8. Die gesammelten Eier sind zu verbrennen, ebenso sind die Falter auf den Stämmen nicht zu zerdrücken, sondern zu sammeln und den Flammen zu übergeben.

9. In ausgeprochenen Fraßgebieten Errichtung künstlicher Zwinger, in welche alle gesammelten Raupen gebracht werden, damit durch die Massenansammlung ein Krankheitsherd geschaffen und überdies den tierischen Schmarotzern die Möglichkeit geboten wird, sich vollständig entwickeln zu können.

10. Zur Zeit des Falterfluges sind in den befallenen Beständen Leuchtfeuer anzuzünden, welche sich bei stärkerem Auftreten der Falter sehr gut bewährt haben.

Von anderer Seite werden als allgemeine Mittel gegen Forstschädlinge angegeben: Unmittelbares Einsammeln der Käfer, Schmetterlinge usw. und deren Raupen und Puppen;

Vernichten der Eierablagen, der Raupen, Puppen;

Verbrennen befallener Pflanzen in Kulturen; Verbrennen des durch Stürme herabgefallenen Reisigs im Altholz;

Stock- und Wurzelrodung;

Ziehen von Schutzgräben in Kulturen;

Errichten von Fanggräben, Fangreißig, Fangbäumen, Fangknüppel, Fangkloben, Brutknüppeln, dann von Isoliergräben;

Kräftige Durchforstung der Stangenhölzer, zeitige Entfernung kränkender Stangen;

Entfernung kränkender Hölzer und Stöcke; rechtzeitige Abfuhr des gefällten Holzes; Sommertrieb und Schaben

- oder Kantigbeislagen der Hölzer und Lagerung an luftigen, trockenen Plätzen zwecks Austrocknung;
- Schütteln und Anprallen der Bäume;
- Bertilgen durch Insekten tötende Mittel;
- Fällung der befallenen Bäume im Notfalle;
- Nächtliches Ableuchten mit Zinnjackeln oder Blendlaternen und weißen Schirmen (bei der Nonne);
- Gierzählen an Probestämmen (bei der Nonne);
- Leim- und Teerringe, Leimstangen und Leimzäune;
- Entfernung des Unterwuchses; Zusammenharken der Bodendecke;
- Töten der Spiegel;
- Zusammenrechen der Bodestreue, Bestreuen mit Kalk und Aufgießen von Wasser;
- Eintrieb von Schweinen und Hühnern in die Forste;
- Ansiedelung insektenfressender Vögel, dann von Igeln;
- Entfernen der von den Schädlingen befallenen Pflanzenteile;
- Ab schneiden der Stamm- und Zweiggallen;
- Besprühen erreichbarer Raupen mit Petroleumemulsion;
- Umbrechen des Bodens mit dem Waldpflug;
- Pflege der Ameisen, die Nutzen bringen (Riesenameisen sind schädlich).

Auch das elektrische Licht hat man zur Bekämpfung geflügelter Insekten usw. schon herangezogen, nachdem es ja längst bekannt ist, daß solche jede Lichtquelle umschwärmen und sich aus weitem Umkreise um dasselbe sammeln; sie scheuen auch das offene Licht nicht und versengen an demselben Flügel und Beine. Im Jahre 1908 waren die prächtigen Waldbestände des Lausitzer Gebirges, welche der Stadt Zittau gehören, in Gefahr, durch die Nonne vernichtet zu werden. Zur Steuerung der Not wurde versucht, den Nonnenfalter mit Hilfe des elektrischen Bogenlichtes zu vernichten. Zwei große Scheinwerfer wurden auf dem Dache des städtischen Elektrizitätswerkes aufgestellt und dieselben sandten ein mächtiges Lichtband die ganze Nacht hindurch auf die Waldungen in der Nähe.

Die Falter folgten in vielen Tausenden der Lichtbahn gegen die Scheinwerfer hin. Nun war neben derselben ein großer Erhaustor aufgestellt, der die Nonnen in seinen Luftwirbel verschlang und vernichtete; in der ersten Nacht allein wurden auf diese Weise 29 kg Nonnenfalter unschädlich gemacht. Außerdem taten die Bogenlampen der Stadt noch ihre Schuldigkeit, indem man dieselben alle ohne Glasglocke brennen ließ.

Nach einer anderen Mitteilung hat man mit dem elektrischen Lichte keine besonderen Erfolge erzielt und ist auch die Annahme, als würden die Insekten durch Licht angelockt, irrig; die Insekten werden durch das Licht erschreckt und fliegen dann umher, ohne ins Licht zu fallen. In der ostpreussischen Oberförsterei wurden Versuche mit einem elektrischen Scheinwerfer gemacht, indem man gleichzeitig Inhaustoren aufstellte, die die Luft aus dem Lichtkegel dicht vor der Lampe einsaugten. Unmittelbar vor der Lampe hatte man ein Netzwerk feiner Drähte ausgespannt, die rotglühend waren und jedes Insekt töteten, das sie berührte. Wären daher die Nonnen, um deren Vertilgung es sich hier handelte, der Lichtquelle zugesogen, so wären sie alle vom Lichtstrom mitgerissen und vernichtet worden. Auf diese Weise wurden aber in acht Nächten nur 38.000 Nonnen gefangen, während von 15 Frauen und ebensoviel Kindern an zusammen drei Tagen 64.200 an den Stämmen haftende Nonnen durch Zerkquetschen getötet wurden — eine Leistung, die auch nach dem Geldwerte weit billiger war, als die des Scheinwerfers. Das nächtlich leuchtende Licht, auch das elektrische, hat sich demnach bisher nicht vorteilhaft bei der Vertilgung von Schädlingen verwerten lassen.

Man ersieht, daß es einer unausgesetzten Tätigkeit und des Verständnisses bedarf, um allen Forderungen gerecht zu werden und die Schädlinge zu vertilgen.

Unter den den Wald beherbergenden Insekten oder solchen, die hauptsächlich auf Bäumen oder Sträuchern wohnen, gibt es solche, die durch Vertilgung anderer ziemlichlichen Nutzen bringen, und zwar unmittelbar und mittelbar.

Zu den unmittelbar nützlichen zählt in Deutschland nur die spanische Fliege, welche gelegentlich, besonders an Eichen und Liguster massenhaft auftritt und alsdann gesammelt, getrocknet und zum Verkauf gebracht werden kann; die spanische Fliege wird aber durch Massenblattfraß an jungen Eichen, besonders in Baumschulen schädlich, so daß man sie töten muß. Allerdings besitzt sie einen nicht unbedeutenden Verkaufswert.

Unmittelbaren Nutzen bringen auch noch in Österreich-Ungarn die Gallen der Knopperngallwespe, die eine ziemlich bedeutende Nebennutzung für die großen Eichenwälder Transleithaniens bedeuten.

Mittelbarer Nutzen läßt sich von zahlreichen Insekten erwarten, wichtiger aber ist die Rolle, welche die Schmarotzerinsekten in der Forstwirtschaft spielen.

Viele fleischfressende Insekten werden durch unmittelbare Vertilgung schädlicher Forstinsekten nützlich. Unter den Käfern zählen hierher Vertreter aus den Familien der Laufkäfer, der Kurzflügler, der Naskäfer, der Stuckkäfer, der Buntkäfer, der Trogositiden, Nitiduliden, Rufupiden, Kolydiiden und der Marienkäferchen, welche teils auf dem Boden, teils kletternd an den Stämmen und auf den Bäumen, teils eindringend in die Fraßgänge, bald als Larven, bald als Imagines ihre Beute bewältigen. In ähnlicher Weise verfahren unter den Hautflüglern Ameisen, Weg-, Grab- und Falterweipen, unter den Zweiflüglern Raub- und Schwirrliegen, aus den anderen Insektenordnungen die Larven der Ameisenlöwen, Florfliegen, Kamelhalbsfliegen, manche Landwanzen, Libellen, die Maulwurfsgrillen u. a. m.

Von den Schmarotzerinsekten sind zu nennen: Käfer aus der Familie der Anthribiden, die Hautflügler aus den Familien der Schlupfwespen (Schneumoniden, Edaniiden, Braconiden, Proctotrypiden und Chalcididen), dann einige wenige aus der Familie der Gallwespen.

Zahlreich und nützlich ist auch das Heer der Raupenfliegen (Tachininen und Sarcaphaginen) aus der Ordnung



der Zweiflügler. Alle diese Schmarotzer leben meist im Inneren ihrer Wirte, selten äußerlich saugend, die meisten in den Larven und Puppen, einige von den Eiern und Imagines ihrer Wirte. Die ganz auffallende Vermehrung dieser Schmarotzer gegen das Ende der großen Fraßkalamitäten läßt den ursächlichen Zusammenhang beider Erscheinungen erkennen. Die Schlupfwespen und Raupenfliegen sind im Verein mit den parasitischen Pilzen die Hauptfaktoren, welche infolge des Vorsprunges durch ihre massenhafte Vermehrung auf natürlichem Wege das Gleichgewicht wieder herstellen.

Gegen Pflanzenläuse in den Forsten anzukämpfen, hat nach Dr. Rüßlin keine Aussichten, denn es vermag die Bekämpfung der Blutlaus in Obstgärten oft nur wenig zu leisten. Im Walde kann eigentlich nur in Betracht kommen die Ausbreitung infolge Übertragung durch eine energische Vernichtung der Herde zu verhindern und muß dies rechtzeitig geschehen. Dazu gehören Kenntnisse und fleißige Beobachtung. Im kleinen, d. h. in Forstgärten und auf kleinen Kulturen läßt sich vielleicht durch Ausschneiden befallener Pflanzenteile, sowie durch Anwendung von Raupenleim und insektentötenden Flüssigkeiten etwas ausrichten. Diese müssen billig und wirksam sein, ohne die Pflanzen zu schädigen. Ganz besonders sind in diesem Sinne Schmierseifenlösungen mit geringem Petroleumzusatz zu empfehlen, deren Konzentration im speziellen Falle, je nachdem es sich um zarte Maitriebe, ältere Triebe oder Stammteile handelt, zu ermitteln ist.

## Mittel zur Bekämpfung pflanzlicher und tierischer Schädlinge auf Pflanzen jeder Art.

In früherer Zeit und auch vereinzelt, besonders dort, wo Schädlinge meist in großen Mengen Unheil stifteten, aber wohin neue Bekämpfungsmethoden nicht gedrungen sind, hat

man sich auf den Gebrauch einfacher Hausmittel, wie Asche von Holz oder Torf, Lösungen von Eisenvitriol, von Pflanzenabkochungen usw. beschränkt, Hand in Hand damit aber stets auch gestrebt, durch energisches Vertilgen des Ungeziefers mit den Händen, insbesondere Zerdrücken der Raupen, Ausgraben solcher aus der Erde (Engerlinge, Maulwürfe, Hamster usw.) Abhilfe gegen das Überhandnehmen derselben zu schaffen. Auch durch Verbrennen mit freien Flammen, durch Rauch großer Feuer aus pflanzlichen Materialien hat man das Ungeziefer zu bekämpfen versucht. Aber alle diese Mittel waren und sind unzulänglich bei dem Umstände, als die kultivierten Flächen immer größer und ausgedehnter, die Arbeitskräfte immer kostspieliger werden und man ist zu den »chemischen Mitteln« übergegangen, von denen einzelne schon früher ganz empirisch gebraucht wurden. Sie sind es, die dermalen die weitaus größte Anwendung finden, die sich vielfach, wenn auch nicht immer und unter allen Umständen gegen alle Krankheiten und jedes Ungeziefer gleich bewährt haben. Ihnen gegenüber haben die der neuesten Zeit angehörenden phytopathogenen Bekämpfungsmittel, so vielversprechend solche auch sind, sich noch nicht einzubürgern vermocht und es haben daher die chemischen Mittel für den praktischen Pflanzenschutz die weitest- und größte Bedeutung.

Die auf chemischer Basis aufgebauten Bekämpfungsmittel sind nach Dr. M. Holtrung (Chemische Mittel gegen Pflanzenkrankheiten) zusammengesetzt aus:

1. Einem Grundstoffe, auf dessen Eigenart die Wirkung des ganzen Mittels fußt:

2. einem Träger, zumeist Wasser, dem die Aufgabe zufällt, eine geeignete Verteilung des Grundstoffes zu bewirken, beziehentlich zu vermitteln und

3. aus Hilfsstoffen; die Aufgabe der letzteren ist es, die Grundstoffe erforderlichenfalls in Lösung zu bringen (beispielsweise Soda oder eine andere alkalisch wirkende Substanz bei sogenannten wasserlöslichen Ölen oder Spiritus), ihnen schädliche Nebenwirkungen zu benehmen (Kalk), ihre

Wirksamkeit zu verlangsamen und dadurch anhaltender zu gestalten;

die Ausbreitungsfähigkeit des Mittels zu erhöhen (Seife), dasselbe haftbarer zu machen (Melasse, Harz u. a. m.).

Die Wirkungsweise des Mittels ist entweder eine innere oder äußere. Im ersten Falle erfolgt die Beseitigung der Krankheit durch Aufnahme des Mittels in die Pflanze, also von innen heraus. Im letzteren Falle wird die äußerlich an den Gewächsen ersichtliche Krankheitsursache direkt entfernt.

Nach Art des zu beseitigenden Krankheitserregers werden unterschieden: Phytozide und Zoozide.

Zu den Phytoziden zählen alle jene Mittel, welche geeignet sind zur Verwendung gegen die durch pflanzliche Lebewesen verursachten Krankheiten, als Fungizide werden speziell die zur Vernichtung niederer Pilze dienenden Mittel bezeichnet.

In analoger Weise haben die gegen pflanzen-schädliche Insekten gerichteten Mittel die Bezeichnung Insektizide erhalten, während unter

Zooziden alle gegen tierische Pflanzen-schädlinge überhaupt gebräuchlichen Bekämpfungsmittel zu verstehen sind. Die letzteren kommen entweder als Magengifte oder als Kontaktgifte, d. i. Berührungsgifte, zur Wirkung.

Tiere, welche saugende Mundwerkzeuge besitzen, wie Schmetterlinge, Schnabelferse oder welche, obwohl mit beißenden Fresswerkzeugen versehen, doch gegen die Zuführung vergifteter Nahrung geschützt sind, wie Borkenkäfer, Samen-käfer, müssen mit Kontaktgiften zu vernichten getrachtet werden. Für alle auf freiliegenden Pflanzenteilen fressende Schädlinge eignen sich dagegen in erster Linie die in den Magen gelangenden und so durch Vergiftung den Untergang des Individuums herbeiführenden Magengifte.

Die in Verwendung kommenden Mittel sind entweder vorbeugender oder heilender (kurativer) Natur und daher strenge auseinander zu halten.

Bei den vorbeugenden Mitteln ist es deren Aufgabe, das Ausbrechen der Krankheit zu verhindern, wie beispielsweise bei Samenbeizen gegen Stein- und Flugbrand, so daß die Pflanzen ganz oder doch teilweise verschont bleiben. Bei den heilenden und kurativen Mitteln da-  
gegegen werden die schon bestehenden Krankheiten beziehentlich deren Erreger zu vernichten gesucht, so daß nach Beseitigung derselben die Pflanze wieder in den normalen Zustand zurückkehrt. Von diesem Gesichtspunkte aus geleitet hat man eine große Anzahl von chemischen Mitteln in Vorschlag gebracht, auch versuchsweise in größerem oder kleinerem Maßstabe angewendet, aber es hat sich doch nur eine geringe Zahl derselben praktisch bewährt und nur mit den Verbindungen des Kupfers, Eisens und Arsens, dann des Aluminiums, Kalziums, Magnesiums und Kaliums sowie Natriums wurden günstige Resultate erzielt; neben diesen sind es noch eine Reihe von Kohlenwasserstoffen, die in praktischer Anwendung stehen. Die Ursachen, warum insbesondere die anorganischen Verbindungen nicht in ausgedehntem Maße zur Anwendung kommen, liegen darin, daß man vielfach deren Verhalten gegen pflanzliche und tierische Schädlinge überhaupt nicht kennt, daß die Wirkungslosigkeit gewisser derselben erprobt ist, dann aber auch und vielleicht hauptsächlich deshalb, weil viele derselben das Gedeihen und Wachsen der Pflanzen schädigen. Vielfach haben Metallsalze, welche giftige Wirkungen auf Menschen und Tiere äußern, auch deshalb Bedenken erregt, weil man annehmen konnte, daß diese Verbindungen in den Pflanzenteilen sich einfinden, also beim Genuße dieser letzteren ihre schädlichen Einflüsse geltend machen können. Diese Bedenken traten namentlich bei dem Beginn der Verwendung von Kupfersalzen (Kupfer-Kalkbrühen) auf und haben sich sehr lange Zeit erhalten. Hollrung bemerkt, daß Befürchtungen, der wiederholte Gebrauch der Kupfersalze könne Vergiftungen der Pflanzen und Früchte, aber auch eine Benachteiligung der Reproduktionsfähigkeit im Gefolge haben, ungegründet sind. Slyske hält eine Vergiftung der mit Kupfer-

salzen besprengten Trauben für ausgeschlossen, Petermann hat Kartoffeln kupferfrei befunden und Schmidt hält Weinlaub, das mit nicht mehr als 2% Kupfer enthaltender Kalkbrühe begossen wurde, für ein unschädliches Viehfutter. Selbst Arsenik scheint als Schutzmittel unbedenklich, während es auf niedere Tiere vergiftend wirkt. Fletcher analysierte Äpfel, welche zweimal mit Schweinfurtergrün besprengt worden waren, fand aber keine Spur Arsenik. Hollrung führt aber auch an, daß eine Vergiftungsgefahr für Menschen und Tiere nicht mehr vorliegt, sobald die Pflanze innerhalb drei Wochen vor der Ernte, beziehungsweise vor dem Genuße der Früchte oder der Pflanze nicht mehr mit Arsenik besprengt worden ist. Jedenfalls ist insbesondere bei weißem Arsenik Vorsicht am Platze, während Schweinfurtergrün weniger bedenklich erscheint, da es vielfach mit verschiedenen Zusätzen versehen, also nicht reines Kupferazetatarseniat ist. Viele der chemischen Mittel verbrennen auch Laub und zarte Pflanzenteile, so daß man sie in Verdünnungen anwenden müßte, die auch den Schädling am Leben läßt, so daß die Behandlung zwecklos erscheint.

Nicht in letzter Linie kommen auch die Kosten der Mittel in Betracht, denn es handelt sich um einen Massenverbrauch und ein Mittel kann nur dann darauf rechnen, auch ausgedehnte Anwendung zu finden, wenn es eben der tatsächlich guten Wirkung auch entsprechend wohlfeil ist. Es steht beispielsweise das Quecksilberchlorid (Aksublimat), welches auch in stark verdünnter wässriger Lösung ( $\frac{1}{1000}$  für gewisse Schädlinge) noch vorzügliche Wirkungen aufweist, viel zu hoch im Preise, um Anwendung zu finden. Diesbezüglich werden wasserlösliche Petroleum- und Karbolineumsorten weit mehr auf allgemeine Verwendung rechnen können.

Von anorganischen Stoffen sind nach Dr. M. Hollrung (Handbuch der chemischen Mittel gegen Pflanzenkrankheiten) teils mit guten, teils mit unbefriedigenden Erfolgen, teils aber auch ohne Erfolg für die Bekämpfung der verschiedenen Pflanzenkrankheiten herangezogen beziehungsweise versucht worden:

Kupferverbindungen, als Kupfervitriol (schwefelsaures Kupferoxyd) für sich allein oder in Mischung und Verbindung mit Kalk, Kohlenstaub, Schwefelblüte, Gips, Talc, Zucker oder Melasse (Sirup), Seife, Salmiak, Ammoniak, Kali, Soda, Leim.

Salpetersaures Kupferoxyd, Schwefligsaures Kupferoxyd, Unterschwefligsaures Kupferoxydul, Schwefelkupfer, Kupferchlorid, Essigsaures Kupferoxyd, Phosphorsaures Kupferoxyd, Kieselsaures Kupferoxyd, Metaborisaures Kupferoxyd, Kupferferrozyanür.

Eisenverbindungen: Eisenvitriol (schwefelsaures Eisenoxydul), für sich allein und in Verbindung oder Mischung mit Schwefelsäure, Kalk, gelbem Blutlaugensalz; Eisenoxyduloxyd, Eisenchlorid, Schwefeleisen, Borisaures Eisenoxydul.

Zinkverbindungen: Zinkvitriol (schwefelsaures Zinkoxyd) für sich allein oder in Verbindung mit gelbem Blutlaugensalz), Schwefelzink, Borisaures Zinkoxyd, Chlorzink, Kieselsaures Zinkoxyd.

Bleiverbindungen: Essigsaures Bleioxyd.

Nickelverbindungen: Schwefelsaures Nickeloxyd.

Arsenverbindungen: Arsenwasserstoff, Weißer Arsenit (auch mit Zucker gemischt), Arsensaures Kupfer (Schweinfurtergrün) für sich und in Vermischung mit Kupferkalkbrühe, anderen Kupferverbindungen; Seife Petroleum; London Purple (Arsen-Kalkverbindung, Abfall von Teerfarbstofffabriken); Arsenigsaures Ammonium, Arsenigsaures Natron und Kali, Arsenisaures Blei, Arsenigsaures Kupferoxyd (Scheelsches Grün).

Quecksilberverbindungen: Quecksilberchlorid (Ägsublimat).

Chlorverbindungen: Salzsäure, Chlorkalium, Chlorkalzium, Chlorkalk (auch in Verbindung mit Fett), Chlormagnesium.

Schwefel und Schwefelverbindungen: Schwefel, Schwefelwasserstoff, Schweflige Säure, Schwefelsäure, Schwefelkohlenstoff, Schwefelkalium (Schwefelleber).

Kaliumverbindungen: Kaliumhydroxyd (Kalilauge), Natriumkalium, Rhodankalium, Schwefelsaures Kali auch in Vermischung mit Seife, Karbolsäure, Salpetersaures Kali auch in Mischung mit Tabakrückständen; übermangan-saures Kali, Kaliumalaun.

Natriumverbindungen: Kochsalz, Chlornatrium, Chilisalpeter (salpetersaures Natron), Unterschwefligsaures Natron, Bor-saures Natron (Borax).

Bariumverbindungen: Chlorbarium, Kohlen-saurer Baryt, künstlicher, auch in Vermischung mit Zucker, Mehl.

Kalkverbindungen: Kalk (Kalziumoxyd), Kalkmilch, Chlorkalzium, Chlorkalk.

Magnesiumverbindungen: Chlormagnesium, Schwefel-saure Magnesia.

Ammoniumverbindungen: Ammoniakflüssigkeit, Rhodan-ammonium, Kohlen-saures Ammonium.

Ferner: Wasserstoffsuperoxyd, Salpetersäure, Bor-säure, Kohlenstoff, Kohlenoxyd, Chloroform, Formaldehyd, Blau-säure, Oxalsäure.

Dann organische Stoffe allein oder in Vermischung oder Verbindung mit anorganischen, wie Ätzen-säure, Glycerin, Nitrobenzol, Antinonin (Orthodinitroresol-kalium).

Kohlenstoffverbindungen: Terpentinöl, Petroleum für sich allein, dann in Mischung mit Wasser, mit Kalkmilch, mit Seife, mit saurer Milch, mit Sand oder Erde, mit Reißwurz, mit Kupferkalkbrühe, mit Schweinsurtergrün usw., Benzin, auch Seifenemulsionen desselben, Paraffinöl in wässriger Emulsion, Karbolsäure (Phenol), Kreosol, Lyhol, Steinkohlenteer, Kreosot, Naphthalin, auch in Mischung mit Kalk oder in Benzin gelöst, Naphthol, Natriumnaphtholat, Kupfer-, Eisen- und Kalknaphthol, Kreolin, Thymol.

Von rein organischen Substanzen kommen nach demselben Autor in Anwendung: Tierfette, als Trane, dann Schweinefett, fast ausschließlich als Emulsionen oder Seifenlösungen für sich allein oder auch in Vermengung mit Tabaksasche.

Leimlösungen mit nicht gleichem Erfolg.

Pflanzenöle und -fette: Rüböl, Baumwollsamensöl mit freiem Alkali oder Seife emulgiert.

Harz (Kolophonium): In Form einer sehr verdünnten Seifenlösung, auch mit tierischen Fetten oder Ölen vermischt.

Holzteer und Holzteeröle: In verseifter Form (mit Alkali oder Seife) sehr stark mit Wasser verdünnt.

Terpentinöl: Auch mit Seife und Wasser emulgiert.

Insektenpulver: Für sich allein, als Auszug mit Wasser, Schmierseife, dann mit Spiritus, mit Spiritus und Salmiakgeist.

Tabak: Wässriger Extrakt, dieser mit Schmierseife, Alkohol und Wasser gemischt, auch Amylalkohol und Fuselöl zugefugt; dann mit Zusatz von Karbol und Kreolin.

Quassiaholz: Wässriger Extrakt desselben, auch mit Seifenlösung, Karbolsäure oder Petroleum gemischt.

Kiebwurz: Wässriger Extrakt, auch in Mischung mit Schmierseife und Paraffinöl.

Rittersporn: Wässriger Extrakt.

Walnuß: Wässriger Extrakt der grünen Rußchale (nach der Reife) und der Blätter.

Paradiesäpfel (Tomaten): Wässrige Abkochung.

Aloe: Lösung der Droge in Wasser.

Sabadillamen: Abkochung mit Wasser, vermischt mit Schmierseifenlösung.

Wurmfarnwurzel: Abkochung mit Wasser unter Zusatz von Schmierseife.

Wenn man nun die ganze Reihe der chemischen Mittel und deren Anwendbarkeit zur Vertilgung von Pflanzenschädlingen und Pflanzenkrankheiten durchgeht, so gelangt man, an Hand der wirklich erzielten Erfolge zu dem Schlusse, daß außer den wirklichen Giften, Arsen- und Quecksilberverbindungen und der Blausäure (die Entwicklung derselben und Anwendung ist nicht allein umständlich, sondern auch gefährlich), die in den Händen von Arbeitern nicht unbedenklich erscheinen, eigentlich nur wenige derselben durch-



schlagende Anwendung vermöge der guten Wirksamkeit gefunden haben. Es stehen hier in erster Linie die Kupferpräparate, die insbesondere bei der Weinrebe, dann aber auch bei vielen anderen Pflanzen gebraucht werden, dann Eisenvitriol, Tabakslauge, Schwefelkohlenstoff, Petroleum und Verseifungen des letzteren wie auch des Teers, tierischer und pflanzlicher Öle, Teer, Kreosot und einige andere. In der allerletzten Zeit ist es noch das Karbolineum, das, mit geeigneten Mitteln in eine mit Wasser emulgierbare Form gebracht, schon vermöge seiner Wohlfeilheit geeignet ist, sich ein ausgedehntes Feld zu erobern. Aber auch bei den chemischen Mitteln sehen wir, daß nur sorgfältige Anwendung und vielfach deren öftere Wiederholung auch tatsächlich gute Resultate liefern und es scheint, daß auch sie nicht unter allen Umständen Universalmittel sind, sondern daß an einem Orte die Erfolge gute, an anderen Orten aber unzureichende sein können.

Die flüssigen Vertilgungsmittel können je nach ihrer Zusammensetzung außerordentlich wirksam sein und sie töten oft augenblicklich, im Gegensatz zu den Pulvern, die oft erst nach einigen Stunden zur vollen Wirkung kommen. Es ist aber erforderlich, daß sie das Ungeziefer, beziehungsweise dessen Brut unmittelbar treffen, was ohne reichliche Anwendung nicht unmöglich ist. Abgesehen von den mehr oder weniger schnell flüchtigen Vertilgungsmitteln, wie ätherische oder alkoholische Lösungen oder Auszüge, Terpentinöl, Kienöl, Petroleum, sind aber gerade die die wirksamsten Präparate, welche Alkalien und Säuren enthalten, die nicht überall angewendet werden können, denn sie zerstören Gewebe, lösen Lacke und Polituren der Möbel usw. auf und sind eigentlich nur auf Wände und Fußböden, Türverkleidungen in Gebrauch zu nehmen.

Speziell bei den Käfern und auch bei anderen Insekten stößt man aber bei der Durchführung von Versuchen auf die größten Schwierigkeiten, da sich die Tiere nicht ganz willenlos und leicht dem Willen des Versuchsanstellers fügen, aber es ist Malenkovic doch gelungen, einige ganz interessante Ergebnisse zu erhalten. Es wurden Mehlwürmer,

das sind die Larven des Mehlkäfers (*Tenebrio molitor*) in eine Atmosphäre gebracht, die ausschließlich aus Blausäure, dem heftigsten der bekannten Gifte, bestand. Erst nach fünf Minuten schien es, als wären dieselben abgetötet. In freie Luft gebracht, lebten sie aber wieder auf. Dieselben Käferlarven wurden in ein fast gänzlich luftleer gemachtes Glasgefäß gebracht. Eine halbstündige Einwirkung der Luftleere schien die Larven auch nicht im geringsten zu schädigen. Wanzen wandeln auf Zyankalium, Sublimat, Arsenik und ähnlichen Giften in trockenem Zustande tagelang herum, ohne auch nur ein Zeichen eines Mißbehagens zu äußern. Aber sobald den Tieren diese Gifte in gelöstem Zustande geboten werden, sind sie gezwungen, solche in den Organismus aufzunehmen und gehen dann rasch, etwa in einigen Minuten bis wenigen Stunden, sicher zugrunde. Auch sonst scheint Feuchtigkeit vielfach ein Mittel zur Abhaltung von Insekten zu sein; es ist ja bekannt, daß das häufige Waschen von Fußböden am schnellsten die Flöhe vertreibt.

Gegen einzelne Gase und Dämpfe, wie jene von schwefliger Säure (hergestellt durch Verbrennen von Schwefel), Äther, Azeton, Chloroform, Essigsäure und vor allem Schwefelkohlenstoff sind Käfer höchst empfindlich. Eine Atmosphäre von Schwefelkohlenstoff, die ein Mensch vielleicht einige Zeit noch ertragen könnte, tötet beispielsweise den Bohrkäfer sehr rasch, und es gibt kein besseres Mittel gegen Insekten jeder Art, als sie den Dämpfen des Schwefelkohlenstoffes auszusetzen. Es genügt, wenn auf  $1\text{ m}^2$  des betreffenden Raumes  $100\text{ cm}^3$  Schwefelkohlenstoff entfallen. Eine 24stündige Einwirkungsdauer reicht unter allen Umständen hin. Zur Erzielung eines vollständigen Abschlusses bringt man das Holz in Gefäße, die nach Art der Unratkanäle mit Wasser abgeschlossen sind. Auch nasse Hitze oder halbstündige Einwirkung des Dampfes reicht vielfach hin, um Insekten sicher zu töten.

Wie schon auf S. 59 erwähnt worden ist, lassen sich die bei der Bekämpfung pflanzlicher und tierischer Schädlinge in Anwendung kommenden Mittel einteilen in:

1. Vorbeugende Mittel (Phytozide).
2. Insekten tötende Mittel (Insektizide).
3. Mittel zur Bekämpfung niederer Pilze (Fungizide); in diesen Gruppen werden solche nach den Schädlingen, auf welche sie Wirkungen äußern, nach Dr. Holkrug (Chemische Mittel gegen Pflanzenkrankheiten) zusammengestellt, nachstehend angegeben.

Als den Pflanzenschädlingen vorbeugende Mittel, also als Imprägniermittel der Samenkörner, der Stecklinge können mit Erfolg verwendet werden:

Gegen Flugbrand: Waschen mit Wasser, Behandeln mit heißem Wasser, Kupfervitriol.

Gegen Steinbrand: Waschen mit Wasser, Behandeln mit heißem Wasser, Schwefelsäure, Kupfervitriol.

Gegen Kartoffelschorf: Schwefelleberlösung, 1%ige Ätjsublimatlösung.

Gegen Haferbrand: Schwefelkalium.

Gegen Rost (Getreiderost): Salzsäure, Schwefelsäure, Rhodankalium, Kalisalpeter, Soda, Zinkvitriol, Kupfervitriol (2‰), Quecksilberchlorid, Essigsäure, Oxalsäure. Es beziehen sich diese Angaben auf Versuche, die mit der Keimung von Sporen von *Puccinia graminis* bei Getreidekörnern gemacht worden sind; über praktische Ergebnisse läßt sich nichts ausführen.

Als Insekten tötende Mittel, also als Insektizide dienen mit mehr oder weniger Erfolg:

Gegen weichhäutige Schädiger, insbesondere Pflanzenläuse, Schildläuse, Blattläuse: Fischölseife, Speckseife, Baumwollsaamenöl-, Harzbrühen, Holzteerseife, Teerölbrühe, dalmatinisches Insektenpulver, Tabakslauge, Quassiaholzbrühe (Hopfenlaus), Schwefelwasserstoff, Schwefelkohlenstoff und Gemische mit Alkohol und Seife, Kalilauge, weißer Arsenik, Ätjsublimat, Chloroform, Blausäure, Petroleum allein und mit verschiedenen anderen Substanzen gemischt, Paraffinöl, Karbolsäure, Krejöl, Lysol, Antinonin, Steinkohlenteeröl, Schwefelleber.

Gegen Blutlaus: Rüböl, emulgiertes Teeröl, Insektenpulverauszug, Tabaklauge, Quassiaholzabkochung, Eisenvitriol, Blausäure, Petroleum, Karbolsäure, Lysol.

Gegen Rindenläuse auf Apfel- und Birnbäumen: Schweinepeckseife.

Gegen die Reblaus: Harzbrühe, Wasser (durch Überschwemmen der Weingärten, Schwefelkohlenstoff (das bis jetzt einzig sichere Mittel), Benzin, Nitrobenzol, Petroleumemulsion, Schwefelkohlenstoffkalkium.

Laufrey schlägt zur Zerstörung der Phylloxera und anderer Insekten eine wässrige Pikrinsäurelösung vor (1 kg Säure auf 90 l Wasser). Von dieser Lösung soll zur Vernichtung der Phylloxera je 1 l an den Fuß eines Weinstockes gegossen, eventuell mittels eines Injektors zu tieferem Eindringen gebracht werden. Die Operation muß in den Monaten Juni, Juli und August vorgenommen werden.

Dieselbe Lösung kann auch zur Vernichtung von Insekten benutzt werden, welche die Wurzeln der Obst- und anderer Bäume angreifen.

Unter den Mitteln gegen die Reblaus (allerdings streng genommen nicht hierher gehörend) sind noch zu nennen:

1. Kräftigung der Weinstockpflanzungen durch konzentrierte Düngemittel (unter gleichzeitiger Anwendung von Schwefelkohlenstoffkalkium) und

2. Anbau der Reben auf Flugandboden. Sand verhindert das Eindringen der Reblaus und die Verbreitung derselben auf die Weinstockwurzeln, weil sich die Sandkörner fest an Stamm und Wurzel anlegen und die Bildung kleiner Erdspalten nicht stattfinden kann. In Frankreich und im südlichen Ungarn sind bereits große Sandflächen mit Reben besetzt worden und man hat günstige Resultate erzielt.

Gegen Heu- und Sauerwurm: Tabakauszug mit Kupfervitriol, Schmierseife usw., Insektenpulverauszug mit Seife, Quassiaholz- oder Karbolsäureauszug mit Schwefelkohlenstoff mit alkoholischer Seifenlösung, Schwefelkalkium, Petroleumbrühen, Nitrobenzol-Seifenbrühe, Naphthalin-Schwefelpulver, Kreolinbrühen;

gegen Aaskäfer: Rübölbrühe, Naphthalin;

gegen Ameisen: Leinölbrühe, Petroleum=Sauermilch=emulsion;

gegen Kohlräupen: Seife-Laugenlösung, Insektenpulver=Seifenbrühe, Tabakauszug, Paradiesäpfelabkochung, Rainfarnkrautabkochung, Schweinfurtergrün = Mehlpulver, Petroleumbrühe, Kreosolbrühe;

gegen den Traubenwickler: Seife-Laugenbrühe, Farnwurzel = Schmierseifebrühe (gegen Weisen, Raupen), Holzteerbrühe, Insektenpulver = Schmierseifebrühe, Benzin=emulsion;

gegen Schnabelkerfe: Leimlösung = Petroleum=emulsion;

gegen Milben: Leimlösung, Harzbrühe, schweflige Säure;

gegen Raupen: Holzteerbrühe=Kubina, schwefelsaures Kali, Chlorkalk, Benzinemulsion (graue Raupe), Holzteer=emulsion (Florraupe, Schwammispinnerraupe), Insektenpulver=Schmierseifebrühe (Gammaraupe), Quassiaholz=Seifenbrühe (Kohlweißling=raupen), Quassiaholzspäne-Karbolisäurebrühe (Obstbaumraupen), Ritterspornabkochung (graue Raupen), Rainfarnabkochung (Kohlräupen), Wurmfarnabkochung (Traubenwickler=raupen), heißes Wasser (Kohlräupen), Schwefel (Asträupen der Kirschblattwespe), Schwefelkalium (Asträupen der Kirschblattwespe), schwefelsaures Kali (Saateulenraupen), Kalziumoxyd (Asträupen der Kirschblattwespe), Chlorkalk, Schweinfurtergrün=Mehl oder Kalk (Kohlräupen), Schweinfurtergrünbrühe (Spanner=raupen), arsenisaures Blei (Schwammispinnerräupen), Petroleum=emulsion (Schwammispinnerräupen, Kohlweißling=raupen, Spanner=raupen), Benzinemulsion (graue Raupen), Kreosol (Kohlräupen).

gegen Blasenfüße: Insektenpulver = Seifenbrühe, Tabakslauge, Salpeter = Tabakbrühe, Paraffinölemulsion, Karbolsäure, Antinonin;

gegen Schnaken: Insektenpulver=Seifenbrühe, pulveriges Alkalkhydrat, Naphthalin-Kalkpulver;

gegen den Getreidelaufräfer: Tabakslauge, auch gegen das Getreidehähnchen;

gegen Engerlinge: Eräufen durch Wasser, schwefelkiesenthaltende Asche, aus der sich Schwefelwasserstoff entwickelt, Schwefelkohlenstoff, Petroleum-Wasseremulsion, Petroleum-Seifenemulsion, Benzin-Seifenemulsion, Steinkohlenteer-Naphthalin-Kalkemulsion;

gegen Erdföhe: Gemisch von Schwefelblumen-Ruß-Algalkpulver-Gaskalk, Petroleum-Sandmischung, Petroleumbrühe, Naphthalin-Kalkpulver;

gegen den Birnsäuger: 2%ige Petroleum-Seifenbrühe;

gegen Drahtwürmer: Chlorkalium, Köder aus mit Arsenit vergiftetem Alee und Luzerne, Benzin-Seifenemulsion;

gegen das Spargelhähnchen: Kalkdunst, Schweinfurtergrünbrühe, Karbolsäure (Spargelkäfer), Naphthalin-Kalkpulver;

gegen den Koloradokäfer: Schweinfurtergrün-Kupferkalkbrühe;

gegen Vorkenkäfer: Petroleum;

gegen Heuschrecken: Holzteerbrühe-Rubina, Schwefelleber, Arsenit-Kleie-Zuckermischung;

gegen Milbenspinnen: Holzteerbrühe-Rubina, Totmatenabkochung, Schwefelblumen, Blausäure, Antinonin, Lysol, Tabakslauge;

gegen den Kartoffelkäfer: Schweinfurtergrünbrühe, Krejöl;

gegen die Kirichblattwespen: Insektenpulverauszug-Seife, Rießwurzabkochung, Schweinfurtergrünbrühe.

Für die Bekämpfung niederer Pilze, also als Fungizide kommen nach Dr. Hollrung (Chemische Mittel gegen Pflanzenkrankheiten) in Frage:

Gegen falschen Mehltau: Schweinfurtergrün in Mischung mit Giften, Sodanaphtholbrühe, Tabakauszug mit Kupfervitriol, Schmierseife usw., schweflige Säure, Schwefelleber, Kochsalz, Borax, Kalkmilch, Schwefelkalkzium,

Doppelvitriolkalkbrühe, schwefligsaures Kupfer, Kupferkalkbrühe, Schwefelkupferkalkbrühe, ammoniakalische Kupfervitriollösung, ammoniakalische Kupferkarbonatlösung;

gegen Schwarzfäule der Reben: Kupferkalkbrühe, Kupfervitrioljodabrühe, ammoniakalisches Kupferkarbonat, Kupferkarbonatbrühe mit Wein, Schwefelleberbrühe, unterschwefligsaures Natron, Kalkmilch, Kupferchlorid, Grünspanbrühe;

gegen Rußtau: Fischölharzbrühe, Schwefelleber;

gegen Rosenweiße der Blätter; Teeremulsion;

gegen Getreiderost: Kupferphosphatbrühe, Schwefelleber-Kupfervitriolbrühe;

gegen echten Mehltau: Schwefelpulver, schwefligsaures Kupfer, Ljölbrühe;

gegen Blattfleckenkrankheit: Kupferkalkbrühe, Eisenvitriol-Kalkbrühe, Kupfervitriol-Boraxbrühe, Kupfervitriol-Wasserglasbrühe;

gegen Anthraknose oder schwarzen Brenner: Eisenvitriol, Kupferkalkbrühe, Kupfer-Schwefel-Kalkpulver, Eisen- und Kupfervitriolkalkbrühe;

gegen die Kartoffelkrankheit: Grünspanbrühe, 2%ige Kupferkalkbrühe;

gegen Blattbräune: Kupferkalkbrühe, Kupfervitriol.

Nach Dr. Hollrung (Chemische Mittel gegen Pflanzenkrankheiten) soll ein brauchbares, wirksames Vertilgungsmittel den nachfolgenden Anforderungen genügen:

1. Es muß die Vernichtung des Schädigers sicher und rasch herbeiführen;

2. es darf dabei für die erkrankte Pflanze keinerlei Nachteile mit sich bringen;

3. es muß die Eigentümlichkeit besitzen, sich über die befallenen Pflanzenteile und in die von den Schädlingen aufgesuchten Schlupfwinkel leicht zu verbreiten und alsdann längere Zeit haften zu bleiben;

4. die Kosten müssen sehr geringe sein;

5. es darf auch für den Laien hinsichtlich seiner Zubereitung erhebliche Schwierigkeiten nicht bieten;

6. es muß für Mensch und Tier unschädlich sein.

Die unter 1—4 genannten Eigenschaften sind unter allen Umständen von einem als empfehlenswert bezeichneten Mittel zu fordern. Dagegen wird den unter 5—6 genannten Forderungen nicht immer Genüge geschehen können.

Vielleicht wäre noch als 7. einzusetzen, daß die Pflanzen durch das Mittel nicht verunstaltet werden, beziehungsweise das Aussehen der Blätter usw. nicht wesentlich verändert wird.

Im Anschlusse an diese Ausführungen werden in der Folge einige jener Insektenvertilgungsmittel samt ihren Zubereitungen angeführt, deren Anwendung in größerem Maßstabe stattfindet und welche sich ziemlich eingebürgert und auch vielfach als brauchbar in der Praxis bewährt haben.

Es sind dies:

Kupfervitriol und Kupferkalzkompositionen in fester und flüssiger Form: Kupfer-Kalkbrühen, Kupfer-Ammoniakbrühen, Kupfervitriol-Kalkpulver, Kupferjoda, Kupfer-Kalk-Zuckerbrühen, Kupfer-Zucker-Kalkpulver, Arsen-Kupferlösungen, Schweinfurtergrünbrühen;

Eisenvitriol;

Schwefelkohlenstoff und Schwefelkohlenstoff-Emulsionen;

wasserlösliches Karbolineum;

Petroleum und Petroleum-Emulsionen;

Tabak;

Raupenleime und endlich

verschiedene Ungeziefervertilgungsmittel.

### **Kupfervitriol und Kupferkalz-Kompositionen in fester und flüssiger Form als Bekämpfungsmittel für tierische und pflanzliche Schädlinge.**

Kupfervitriol in wässriger Lösung und in Verbindung mit Kalk darf wohl als das älteste chemische Mittel insbesondere gegen die Krankheiten der Rebe und auch gegen andere tierische Feinde angesehen werden; wenn die Präpa-



rate auch gegen die Mehltau versagten und sich als wirkungslos erwiesen haben, so werden sie doch gegen Getreidebrand, gegen den Heu- und Sauerwurm und andere Mehlwürmer, allgemein für die Bekämpfung niederer Pilze angewendet, da sie sich zudem auch verhältnismäßig billig stellen und Schaden an den Pflanzen nicht verursachen. Die Bedenken, die man anfänglich gegen dieselben hegte, indem man annahm, daß das giftige Kupfer auch in die Endprodukte der Pflanzen (Trauben usw.) übergehe, sind durch Untersuchungen von berufener Seite als gänzlich haltlos (siehe Seite 60) erachtet worden; der Laie wird sich allerdings beim Betrachten der schön giftig-blaugrünen Weinblätter des Gedankens nicht erwehren können, daß die Sache doch gefährlich sei. Die Zubereitungen des Kupfervitriols sind verschieden und auch die Konzentrationen der Lösungen sind verschieden, je nach der Art der Pflanze, der Stärke der Infizierung und der Art des Präparates. Alle Zubereitungen müssen ziemlich schnell verbraucht werden, da sich solche beim Lagern zersetzen und wirkungslos werden; um dem zu begegnen, hat man auch pulverförmige Präparate in den Handel gebracht, die entweder vor dem Gebrauche in Wasser gelöst oder auf die vorher mit Wasser genetzten Pflanzen mittels Zerstäubers aufgestäubt werden.

Die Wirkung der Kupfervitriol-Kalk-Kompositionen beruht nach Hottung auf dem Kupferhydroxyd und auf der feinen Verteilung, in welcher dasselbe auf die Pflanzenteile gelangt. Unter dem Einflusse der im Regen enthaltenen Kohlensäure geht das Kupferhydroxyd nach und nach in lösliches, kohlensaures Kupferoxyd über. Sofern in der Brühe ein Überschuß von Kalk vorhanden ist, bindet dieser zunächst eine Zeitlang die Kohlensäure des Regens und erst dann, wenn aller Kalk in Kalziumkarbonat verwandelt worden ist, kann Kupfer in Wirkung gesetzt, d. h. zu Kupferkarbonat umgewandelt werden.

Neben den reinen Kupferkalkbrühen werden auch solche mit Zusätzen von Seife, Salmiak, dann mit Ammoniak (ammoniakalische Kupferlösungen), dann an Stelle von Kalk

mit Kalilauge und Zucker hergestellt. Ferner erzeugt man Kupferkarbonatbrühen durch Behandeln von Kupfervitriollösungen und Lösungen von Soda, wobei das kohlensaure Kupfer als grünliche Masse ausfällt. Dieses wird dann nach dem Auswaschen und Abfügenlassen mit Wasser 0.06 bis 0.10 Gewichtsteile auf 100 Gewichtsteile Wasser gleichmäßig vermischt. Auch mit Zucker oder Melasse, dann mit Leim und Seife wird Kupferkarbonat zusammengebracht oder solches in starkem Salmiatgeist gelöst. Dr. Hollrung gibt in seinem mehrfach angeführten vorzüglichen Werke eine ganze Anzahl von Vorschriften für die Herstellung.

Um eine gute und zuverlässige Wirkung zu erzielen, ist es erforderlich, die richtigen Mengen der einzelnen Bestandteile anzuwenden; allerdings sind nach den zahlreichen Vorschriften, die für die Bereitung der Brühen angegeben wurden, die Ansichten hierüber sehr voneinander abweichend; auch die Art der Herstellung wird nicht gleichmäßig gehandhabt.

Dr. Hollrung (Chemische Mittel gegen Pflanzenkrankheiten) sagt, daß es von besonderer Wichtigkeit sei, daß die Kupfervitriolbrühe freie Kupferjulsatlösung nicht enthalte, denn dieselbe bietet Anlaß, das Laub zu beschädigen. Das Vorhandensein freien Kupfervitriols läßt sich erkennen:

1. Zu der fertigen Brühe wird ein wenig einer Lösung von gelbem Blutlaugensalz in Wasser hinzugesetzt und weist Rotfärbung darauf hin, daß man noch Kalkmilch hinzusetzen muß, denn normale Kupferkalkbrühe weist keinerlei Färbung durch das Reagens auf. Um die Prüfung zu vereinfachen tränkt man Fliesspapierstreifen mit einer Lösung von gelbem Blutlaugensalz, trocknet und taucht jeweils einen solchen Streifen in die zu prüfende Brühe, welcher sich bei unverändert vorhandener Kupfervitriollösung rot, sonst aber nicht färbt.

2. Neutrales Lackmuspapier kann ebenfalls als Reagens dienen; ein in die Kupferkalkbrühe getauchter Streifen wird bei Kalküberschuß blau, bei Überschuß von Kupfervitriol rot; tritt diese letztere Färbung ein, so muß man noch

Kalkmilch so lange hinzusetzen, bis die rote Färbung verschwindet.

3. Auch durch Eintauchen einer blanken Stahlklinge, überhaupt eines Gegenstandes aus Stahl, kann man freie Kupfervitriollösung erkennen. Überzieht sich das Metall nach kurzem Verweilen in der Flüssigkeit mit einer dünnen Schicht von metallischem Kupfer, wird also rot, so ist die Lösung noch mit freiem Kupfervitriol versehen, der mittels Kalkmilch abzustumpfen ist.

4. Es bietet auch die Färbung der Kupferkalkbrühe einen Maßstab dafür, ob sie die gewünschte Beschaffenheit besitzt oder nicht. Ist ein zu großer Überschuß von Kalkmilch vorhanden, so weist die Brühe eine etwas ins Purpurne spielende Färbung auf. Ist zu wenig Kalk darin, so ist die Färbung grünlichgrau, während normale Kupferkalkbrühe schön himmelblau gefärbt und klar ist.

5. Ist genügend Kalk vorhanden, so bildet sich beim Ausblasen von Luft mit dem Mund auf der auf eine flache Porzellan- oder Schale gegossenen Flüssigkeit ein dünnes kalkiges Häutchen, im anderen Falle nicht.

In der richtig hergestellten Brühe darf sich nur sehr langsam ein himmelblauer, flockiger Niederschlag absetzen.

#### 1. Bouille rationelle hydrocuprique.

Flüssigkeit zur Bekämpfung und Vorbeugung von Krankheiten der Rebstöcke, besteht aus:

- 7·35% kohlensaurem Natron,
- 9·68% Kupfervitriol,
- 37·48% Kieselsäure und kieselhafter Magnesia (Talkum),
- 40·58% Wasser (Chlorbarium),
- 4·91% Verunreinigungen (Kalk, Eisen etc.).

2. Oregonbrühe gegen Schildläuse nach Marlatt besteht aus:

- |      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 18   | Gewichtsteilen gelöschtem Kalk, |
| 18   | „ Schwefelpulver,               |
| 150  | „ Wasser,                       |
| 0·15 | „ Kupfervitriol.                |

3. Kalifornische Brühe gegen Schildläuse nach Marlatt, ist zusammengesetzt aus:

60 Gewichtsteilen gelöschtem Kalk,

30                    »      Schwefelpulver,

1000                »      Wasser,

20                    »      Kochsalz; letzteres ist erst kurz

vor dem Gebrauche der Flüssigkeit zuzusetzen.

4. 3 Teile Kupfervitriol,

2    »    Kalk oder

5. 2 Teile Kupfervitriol,

1 Teil Kalk auf

95 beziehungsweise 97 Teile Wasser.

6. Nach Dr. Zucker:

8 Teile frisch gebrannter Kalk werden gelöscht und mit Wasser auf 250 Teile verdünnt. Die hierbei zurückbleibenden Teile des Kalkes (Verunreinigungen, Unlösliches) werden entfernt. Andererseits werden

15 Teile Kupfervitriol in

200 Teilen Wasser gelöst und unter Umrühren der Kalkbrühe zugefügt. Das Gemisch wird auf 500 Teile mit Wasser ergänzt. Die Flüssigkeit enthält demnach in 100 Teilen: 3 Teile Kupfervitriol, 1.6 Teile Kalk.

7. Nach Dammer:

Man gießt in einen Bottich oder in einen anderen Behälter aus Holz oder Steinzeug (aber nicht aus Metall)

90 l Wasser und läßt darin

2 kg Kupfervitriol auflösen. Andererseits nimmt man frisch gebrannten Kalk in Stücken, bringt ihn in einen Korb und senkt denselben dann in reines Wasser, aber nicht in das Gefäß mit dem Kupfervitriol. Der Kalk wird hierauf auf einer festen, harten und selbstverständlich reinen Unterlage ausgebreitet, wo er in kurzer Zeit zu Pulver zerfällt; dieses wird durch ein feines Sieb gesiebt und dann mit Wasser zu dünner Kalkmilch angerührt. Ist der Kalk fett, von guter Beschaffenheit und frisch gebrannt, so genügt ein wenig mehr als der dritte Teil des Gewichtes an Kupfervitriol. Für 2 kg Kupfervitriol nimmt man also 700 bis

1000 g Kalk, den man mit dem Wasser, 10 l, innig vermischt, so daß man eine zarte, nicht krümelige Kalkmilch erhält. Diese wird nach und nach unter andauerndem Umrühren in die Kupfervitriollösung eingerührt. Man erhält eine trübe, blaue Mischung, aus der sich beim längeren Stehen ein blauer Niederschlag abscheidet. Bleibt die Flüssigkeit, die ganz klar sein soll, noch bläulich getrübt, so muß man noch so viel Kalkmilch zusetzen, bis die Flüssigkeit klar ist. An Stelle von frisch gebranntem Kalk kann man auch Kalkmörtel zusetzen, von dem man aber vier- bis fünfmal so viel gebraucht, als von reinem Kalk.

8. Bordeaux-Lösung (Bordelaiser Brühe) besteht aus

- |     |        |                        |
|-----|--------|------------------------|
| 20  | Teilen | Kupfersulfat,          |
| 20  | »      | gebranntem Kalk,       |
| 30  | »      | gewöhnlichem Schiefer, |
| 800 | »      | Wasser.                |

9. Azurin, auch Eau céleste, ammoniakalische Kupfervitriollösung nicht gleichmäßiger Zusammensetzung:

- |    |        |   |
|----|--------|---|
| a) | 10 kg  | Kupfervitriol,                              |
|    | 15 l   | Ammoniakflüssigkeit von 22° B $\acute{e}$ , |
|    | 2000 l | Wasser.                                     |
| b) | 5 kg   | Kupfervitriol,                              |
|    | 1.7 l  | starkes Ammoniak,                           |
|    | 1000 l | Wasser.                                     |
| c) | 10 kg  | Kupfervitriol,                              |
|    | 15 l   | starkes Ammoniak,                           |
|    | 3791 l | Wasser.                                     |
| d) | 60 kg  | Kupfervitriol,                              |
|    | 75 kg  | Soda,                                       |
|    | 10 l   | Ammoniak,                                   |
|    | 1000 l | Wasser.                                     |

10. Bouillie unique usage. Schutzmittel gegen Nebenschädlinge und -krankheiten. Die unter diesem Namen in den Handel kommende Ware ist eine klare, braune Flüssigkeit mit etwas Bodensatz, und ist nach der Anpreisung zur Behandlung von durch Pilze und Insekten

hervorgerufenen Krankheiten, insbesondere der Reben, bestimmt Die Flüssigkeit enthält:

18·71% Natronsalze,  
16·31% Schwefelsaures Kupfer,  
64·98% Wasser.

Heufelder Kupferjoda gegen Pflanzenkrankheiten ist ein pulverförmiges Gemisch von

70% Kupfervitriol und  
10% Soda.

### Kupfervitriol-Kalkpulver.

Man empfindet die Bereitung der Kupfervitriol-Kalkbrühen vielfach als eine beschwerliche und zeitraubende Arbeit und hat daher pulverförmige Mischungen von Kupfervitriol mit Kalk, Gips, Speckstein, Kohlenstaub in den Handel gebracht; diese Mischungen müssen von so feinpulveriger Beschaffenheit sein, daß sie sich auf die zu schützenden Pflanzenteile verstäuben lassen.

#### 1. Cognets-Pulver.

- |    |     |               |                            |
|----|-----|---------------|----------------------------|
|    | 10  | Gewichtsteile | Kupfervitriol,             |
|    | 20  | "             | totgebrannter Gips.        |
| a) | 25  | Gewichtsteile | Kupfervitriol,             |
|    | 75  | "             | zu Pulver gelöschter Kalk, |
|    | 125 | "             | Schwefelblüte,             |
|    | 75  | "             | Steinkohle, gemahlen.      |
| b) | 45  | Gewichtsteile | Kupfervitriol,             |
|    | 7·5 | "             | zu Pulver gelöschter Kalk, |
|    | 100 | "             | Steinkohle, gemahlen.      |
| c) |     |               | Foßtit.                    |
|    | 20  | Gewichtsteile | Kupfervitriol,             |
|    | 35  | "             | Talkum.                    |

#### 2. Kupfervitriol-Kalkpulver nach Whitehead.

##### a) Skawindsky-Pulver

- |  |     |               |                          |
|--|-----|---------------|--------------------------|
|  | 50  | Gewichtsteile | Kupfervitriol, gemahlen, |
|  | 7·5 | "             | Kalk, zu Pulver gelöst,  |
|  | 170 | "             | Steinkohlenstaub.        |

- |    |      |               |                          |
|----|------|---------------|--------------------------|
| b) | 12·5 | Gewichtsteile | Kupfervitriol, gemahlen, |
|    | 3·75 | "             | Kalk, zu Pulver gelöst,  |
|    | 46   | "             | Steinkohlenstaub,        |
|    | 62·5 | "             | Schwefelblüte.           |

### Kupferkalkbrühen mit Zucker.

Der Zusatz von Zucker bewirkt ein besseres Haften auf den Pflanzen, aber nach Barth bildet sich auch Kalkkupferjaccarat, welches rasch in das Blattgewebe eindringt.

#### 1. Nach Peglion:

- |    |     |               |                 |
|----|-----|---------------|-----------------|
| a) | 15  | Gewichtsteile | Kupfervitriol,  |
|    | 100 | "             | Wasser.         |
| b) | 15  | Gewichtsteile | Kalk, gebrannt, |
|    | 100 | "             | Wasser,         |
| c) | 75  | Gewichtsteile | Zucker,         |
|    | 100 | "             | Wasser.         |

Lösung c) wird mit Lösung a) gemischt, dann die Kalkmilch hinzugefügt und schließlich die Mischung mit 700 Gewichtsteilen Wasser verdünnt.

#### 2. Nach Barth:

- |  |                |                             |
|--|----------------|-----------------------------|
| 20   | Gewichtsteile  | Kupfervitriol in            |
| 400  | Gewichtsteilen | Wasser lösen, in Lösung von |
| 3  | "              | Zucker in                   |
| 300  | "              | Wasser eingießen, dann      |
| Kalkmilch aus 15 Gewichtsteilen gebranntem Kalk      |                |                             |
| 300 Gewichtsteilen Wasser hinzufügen und schließlich |                |                             |

alles gut durchmischen.

#### 3. Nach Berret:

- |     |               |                |
|-----|---------------|----------------|
| 15  | Gewichtsteile | Kupfervitriol, |
| 30  | "             | Fettkalk,      |
| 30  | "             | Melasse,       |
| 750 | "             | Wasser.        |

### Kupfer-Zucker-Kalkpulver nach Dr. Hollrung.

- |    |               |                                     |
|----|---------------|-------------------------------------|
| 40 | Gewichtsteile | falzinierter (entwässerter) Kupfer- |
|    |               | vitriol,                            |

50 Gewichtsteile zu Pulver gelöchter Kalk,  
10 » gemahlener Zucker.

Bei der Anwendung wird das Pulver zunächst in der Menge von 10 Gewichtsteilen mit 120 Gewichtsteilen Wasser gut vermischt und dann noch

213 Gewichtsteile Wasser zugelegt. Die Brühe muß sofort nach der Bereitung verwendet werden.

### **Kupferlösungen gegen Pflanzenschädlinge an Feldfrüchten, Obstbäumen und in Weingärten, nach Riche.**

1. 20 Gewichtsteile Kupfervitriol,  
20 » gelöchter Kalk,  
24 » Schweinfurtergrün,  
1500 » Wasser.

Der Kupfervitriol wird in einem gewissen Anteil des Wassers gelöst, das Schweinfurtergrün mit Wasser verrührt, dem Kalk zugelegt, diese Mischung mit dem Rest des Wassers vermischt und schließlich die Kupfervitriollösung unter einigem Durchmischen hinzugegeben. Vor dem Gebrauche ist das Präparat stets gut aufzurühren.

2. 10 Gewichtsteile Roggenmehl,  
240 » Schweinfurtergrün,  
1000 » Wasser.

Roggenmehl und Schweinfurtergrün werden mit Wasser zu einem gleichmäßigen Brei verrührt und hierauf das verbliebene Wasser diesem unter kräftigem Mischen beigegeben.

3. 8 Gewichtsteile Roggenmehl,  
900 » Wasser,  
2 » gelöchter Kalk,  
10 » Schweinfurtergrün,  
100 » Wasser.

Die einzelnen Bestandteile werden in gleicher Weise wie bei 1. gemischt.

4. 20 Gewichtsteile Kupfervitriol werden in  
500 Gewichtsteilen Wasser gelöst und der Lösung zugelegt:



15	Gewichtsteile	Natriumarsenit in
10	Gewichtsteilen	Wasser,
10	Gewichtsteile	gelöschter Kalk in
500	Gewichtsteilen	Wasser.

### Schweinfurtergrünbrühen.

Man verwendete früher vielfach Aufschlemmungen von Schweinfurtergrün in Wasser allein, im Verhältnisse von 40 bis 60 Gewichtsteilen auf 1000 Gewichtsteile Wasser, jetzt aber meistens dieses Material in Vermischung mit Kalk, auch mit Kupferkalkbrühen, Arsenikbrühen, Harzbrühen, Seifenlösungen, zur Vertilgung niederer Pilze.

Bei Schweinfurtergrünbrühen, wie bei allen Vertilgungsmitteln, welche nicht Lösungen, sondern Flüssigkeiten darstellen, in denen ein, wenn auch noch so feiner, fester Körper verteilt ist, ist häufiges Durchmischen während der Anwendung unbedingt erforderlich. Die aufgeschlemmten Teilchen haben das Bestreben, sich zu Boden zu setzen, so daß die Flüssigkeit bei dem Verstäuben oder Besprühen in den oberen Teilen weniger an der eigentlich wirksamen Substanz enthält als der unteren. Hierdurch wird dann eine ungleichmäßige Verteilung und damit naturgemäß auch ungleichmäßige Wirkung erzielt. An Stelle von Schweinfurtergrün wird auch Scheel'sches Grün vorgeschlagen.

### Harzjaures Kupfer u. als Ungeziefervertilgungsmittel.

Nach dem französischen Patente Nr. 385.062 vom 25. Februar 1907 (F. Schirmer) werden Resinate, z. B. Natrium-Kalziumresinat, Natrium-Kupferresinat und Gemische dieser mit Alkaliresinaten in trockener Form oder gelöst oder in Wasser oder anderen Mitteln fein verteilt, als Schutzmittel für Bäume, Reben usw. gegen Insekten verwendet.

**Eisenvitriol.**

Man verwendet Eisenvitriol in sehr verschieden starken Lösungen, von 6%, bis 40 und 50% in Wasser, zur Bekämpfung verschiedener Schädlinge, dann aber auch in Verbindung mit Kalk, gelbem Blutlaugensalz (Berlinerblaubrüh), mit Schwefelsäure, doch sind die damit erzielten Wirkungen hinter denen mit Kupfervitriol zurückstehend. Es werden Eisenvitriollösungen gebraucht gegen die Blutlaus, gegen die Blattfleckenkrankheit, gegen Anthraknose oder den schwarzen Brenner und einige andere Pflanzenkrankheiten.

**Eisenvitriollösungen gegen niedere Pilze.**

Nach Bolle:

- 100 Gewichtsteile Eisenvitriol in
- 200       »       Wasser kochend lösen, dann
- 10        »       Schwefelsäure hinzufügen.

Nach Binnet:

- 100 Gewichtsteile Eisenvitriol werden in
- 3 Gewichtsteilen Schwefelsäure gelöst, dann dieses
- Gemisch in
- 200       »       Wasser eingerührt.

Nach Galloway:

- 6 kg Eisenvitriol werden in
- 250 cm<sup>3</sup> Schwefelsäure gelöst, dann mit
- 100 kg Wasser vermischt.

Man hat auch Gemische von Eisenvitriol und Kupfervitriol für die Bekämpfung verwendet und gibt Pellegrini an, daß man

- 10 Gewichtsteile Eisenvitriol in
- 50 Gewichtsteilen Wasser,
- 10 Gewichtsteile Kupfervitriol in
- 10 Gewichtsteilen Wasser löst, beide Lösungen vermischt,
- 800 Gewichtsteile Wasser und dann aus
- 10 Gewichtsteilen Kalk und
- 100       »       Wasser bereitete Kalkmilch hinzusetzt.

## Karbolineum.

Das gewöhnliche Karbolineum (Teerölprodukt) ist in der Praxis schon lange als Konservierungsmittel für Holz bekannt und man benützt es für Gegenstände der verschiedensten Art. Der Weinbauer schützt damit die Rebpfähle vor dem Morischwerden, der Gärtner bestreicht damit Holzzäune, der Landwirt benützt es für die verschiedensten Holzgeräte. Überall tritt es uns in seiner konservierenden Eigenschaft entgegen und wenn dies auch begründet ist in der starken Giftigkeit des Karbolineums für die kleinsten Lebewesen, die Bakterien, so tritt diese Tatsache doch nicht in das Volksbewußtsein ein. Es ist begreiflich, daß unsere Praktiker ein solches Mittel, das ihnen als guter Freund schon lange bekannt ist, auch in seiner Eigenschaft als Pflanzenschutzmittel vielfach gerne aufnehmen und ihm überall Aufnahme zu verschaffen suchen. Wenn der oberflächliche Schluß vieler Praktiker, daß das, was dem Pfahl und dem Zaun nützt, auch den Pflanzen gut sein müsse, auch sehr trivial klingt, so birgt er doch ein gutes Körnchen Wahrheit. Das Karbolineum soll ja doch auch unsere Pflanzen gegen die verderbliche pilzliche oder tierische Kleinlebewelt schützen.

Das Karbolineum ist ein Steinkohlenteeröl, tiefbraun gefärbt, teerartig aussehend und ebenso riechend, welches, wie schon erwähnt, zum Konservieren von Holz in der Erde und an der Luft benützt wird. Die wirksamen Bestandteile im Karbolineum sind schwere Teeröle (Anthrazen, Phenol und dessen Homologe) und es ist jenes Produkt, welches den höchsten Gehalt an Phenol und dessen Homologen (45 bis 48% als Maximum) aufweist, am wirksamsten. Auch Avenarius, dessen Produkt noch mit Chlor, beziehungsweise Chlorzink behandelt ist, führt aus, daß dem Kreosotöl, das vielfach den Hauptbestandteil von Karbolineumsorten des Handels bildet, die konservierenden Eigenschaften mangeln, daß solches also minderwertig sei.

Für die Zwecke der Vernichtung tierischer und pflanzlicher Schädlinge kommt jedoch nicht das Karbolineum in Anwendung, wie es bei der Konservierung von Holz gebraucht wird; dieses besitzt in seiner Zusammensetzung die unangenehme Eigenschaft, zerstörend auf die Pflanzen einzuwirken, solche, wie man sich ausdrückt, zu verbrennen, auch dann, wenn es dieselben nur in sehr dünner Schicht bedeckt. Man hat aber die guten Eigenschaften dieses Steinkohlenteerdestillates in der Weise sich zu Nutzen zu machen gewußt, daß man solches unter Zuhilfenahme von Seife, ätzenden Alkalien und anderen Mitteln in eine solche Form bringt, daß es mit Wasser vermischbar wird; man emulgiert es und in dieser emulgierten Form, gemeinhin als wasserlösliches Karbolineum bezeichnet, ist es möglich, es in so geringen Mengen auf die Pflanzen zu bringen, auf denselben zu verteilen, daß die nachteiligen Wirkungen vermöge der geringen Mengen nicht mehr zur Geltung kommen können. Das Emulgieren, also das Wasserlöslichmachen von vegetabilischen und animalischen Ölen, unterliegt keinen besonderen Schwierigkeiten (ölsaure, fett-saure Alkalien, Seifen), da es sich um tatsächliche Verbindungen handelt und ist schon lange bekannt; aber erst nach und nach im Verlaufe der letzten zehn Jahre ist es gelungen, auch Öle mineralischen Ursprunges (Teeröle, Petroleum und seine Destillate) so zu präparieren, daß sie mit Wasser dauerhafte Emulsionen geben; aber diese dauernde Emulsion ist abhängig von der Beschaffenheit der mineralischen Öle, sowohl deren Menge, als auch der Menge der die Emulgierung vermittelnden Stoffe und wenn der eine dieser letzteren (wie Salmiakgeist oder Spiritus) teilweise verflüchtigt, wird das Gleichgewicht in der Mischung gestört und die Emulsion wird nicht mehr innig, das Öl scheidet sich vorzeitig ab. Es ist weniger schwierig, die zu emulgierenden Öle klar herzustellen, als haltbare Emulsionen daraus bereiten zu können. Für die Herstellung wasserlöslicher Präparate gibt es eine große Anzahl von Verfahren, von denen einige hier in der Folge erörtert

werden; gründliche Anleitungen dafür finden sich in Andés, »Die Beseitigung des Staubes«.

Professor Dr. Lüstner, Vorstand der pflanzenpathologischen Versuchsstation in Geisenheim, berichtet (1905, Jahresbericht der königl. Lehranstalt) über die vortrefflichen Erfolge, die er seit mehreren Jahren durch den Karbolineumanstrich der Bäume im Winter erzielte. Auffallend war in dem Versuchsergebnis namentlich das vollständige Verschwinden der Schildläuse (*Diaspis fallax*) bei den mit Karbolineum behandelten Bäumen, sowie deren sehr üppiger Trieb. In dem gleichen Jahresbericht weist Lüstner darauf hin, daß ein einfaches Bestreichen von Krebswunden mit Karbolineum diese allmählich zum Abheilen bringe.

Nach Uderhold hat sich das Karbolineum auch gegen die Blutlaus bewährt. Es besitzt hier, wie alle Blutlausmittel, jedoch auch den Nachteil, daß einige Zeit nach dem Bestreichen die Läuse sich doch an den alten Stellen wieder ansiedeln.

Die Frage der Sommerbehandlung der Bäume mit Karbolineum hat Professor Lüstner in Gemeinschaft mit Garteninspektor Junge in Geisenheim aufgenommen und lassen sich die Ergebnisse in folgenden Sätzen zusammenstellen: »Wie unsere mehrjährigen gemeinsam ausgeführten Versuche zeigten, kann das Karbolineum mit bestem Erfolg gegen verschiedene tierische Schädlinge, besonders gegen Schildläuse verwendet werden, bei denen die Behandlung der Bäume in unbelaubtem Zustande erfolgen kann und für diese Fälle sind die Karbolineumemulsionen wiederholt empfohlen worden. Die Behandlung der Bäume in belaubtem Zustande ist von uns jedoch bisher nicht empfohlen worden und beabsichtigen wir dies auch vorläufig in Zukunft noch nicht zu tun, denn die von uns in diesem Frühjahr in den hiesigen Anlagen eingeleiteten Versuche haben zum größten Teil so schlechte Resultate gezeigt, daß wir dringend davor warnen, das Karbolineum bei der Sommerbehandlung der Obstbäume an Stelle von

alten, erprobten und bewährten Maßnahmen in der Praxis zu verwenden.«

Auch bei der Winterbehandlung der Bäume mit Karbolineum muß man, um sich vor empfindlichem Schaden zu bewahren, immer noch mit einiger Vorsicht vorgehen. Es spielen hierbei namentlich die Verschiedenartigkeit der im Handel befindlichen Karbolineumsorten eine bedeutende Rolle. Uderhold hat auf diesen Umstand schon als einen sehr gewichtigen hingewiesen. Er machte darauf aufmerksam, daß unter dem Namen Karbolineum Produkte im Handel sind, die wohl von demselben Rohstoffe (Stein- oder Holzkohlenteer) herkommen, in ihrer Herstellung und Endbeschaffenheit aber nicht übereinstimmen. Dementsprechend sei auch die Einwirkung auf die Bäume eine verschiedene. Eine Karbolineumsorte rief bei den Versuchen Uderholds Wundheilung hervor, eine andere gab Veranlassung zu einer nicht unerheblichen Vergrößerung der Wunden.

Auch Lüstner weist auf diesen Umstand hin und sagt: Die verschiedenen Ergebnisse bei der Prüfung des Karbolineums sind darauf zurückzuführen, daß die einzelnen Versuche hinsichtlich der Verwendbarkeit für Baumkrankheiten nicht mit ein und demselben Karbolineum vorgenommen wurden, sondern daß dabei Karbolineumsorten von ganz verschiedener chemischer und physikalischer Beschaffenheit zur Anwendung kamen.

Eine noch nicht zu übersehende Bedeutung scheint das Karbolineum für den Weinbau und die Landwirtschaft zu besitzen. Die schönen und grundlegenden Versuche Doktor Hiltners in München berechtigen hier zu sehr weitgehenden Hoffnungen. In der Rebkultur darf nach diesem Forscher als sicher angenommen werden, daß das Karbolineum ein ausgezeichnetes Mittel gegen die Schildläuse der Reben, sowie gegen jene Milben, welche die Pilzkrankheit verursachen, ist. Vielversprechend sind auch die Wahrnehmungen, welche Ökonomierat Fröhlich bezüglich des Springwurmes gemacht hat. Für die Beurteilung der Frage, wie die Karbolineumbespritzung auf die Winterpuppen des

Heumurmes einwirken, sind die Versuche noch nicht entscheidend.

Hiltner führt dann noch weiterhin aus: Von der Verwendung des Karbolineums in der Landwirtschaft oder in der eigentlichen Gärtnerei hat man bisher noch nichts gehört und doch scheint es berufen, auch hier unter Umständen eine bedeutsame Rolle zu spielen. Zahlreiche, an der Agrikultur-botanischen Anstalt seit nunmehr drei Jahren durchgeführte Versuche haben allmählich ergeben, daß wir in Karbolineum ein ausgezeichnetes Bodendesinfektionsmittel besitzen, das zugleich den außerordentlichen Vorteil bietet, den Boden nach einer gewissen Ruhepause erheblich fruchtbarer zu machen. Es verhält sich nach beiden Richtungen hin ganz ähnlich wie Schwefelkohlenstoff, ist diesem aber weit überlegen durch die Stärke der Wirkung und vor allem auch durch den erheblich billigeren Preis, während es anderseits der für die Anwendbarkeit des Schwefelkohlenstoffes so bedeutsamen Eigenschaft, rasch alle Bodenteile zu durchdringen, ermangelt.

Von Hiltner wird auch noch auf die Bedeutung des Karbolineums zur Vernichtung von Unkrautsamen und Bodenschädlingen aller Art aufmerksam gemacht.

Wie bei einem Präparate, welches erst verhältnismäßig kurze Zeit in die Praxis eingeführt ist, sich nicht anders erwarten läßt, erheben sich natürlich auch Stimmen gegen dessen Geeignetheit und es wird von berufener Seite darauf hingewiesen, daß, im Gegensatz zu den voranstehenden Ausführungen, es als Bodendesinfektionsmittel sich nicht eignet. Es soll auf den Pflanzenwuchs nicht nur nicht fördernd, sondern im Gegenteil schädigend einwirken und für die Bodendesinfektion sei ungelöschter Kalk das beste Mittel.

Es scheinen aber alle bisher erzielten Resultate darauf hinzuweisen, daß das Karbolineum in vieler Hinsicht ein für den Obst- und Weinbau (und in der Landwirtschaft?) hervorragendes Mittel ist, dessen volle wirtschaftliche Bedeutung und praktische Verwendbarkeit erst durch weitere,

sehr umfassende und zum Teil langwierige Forschungen und Versuche vollkommen klargestellt werden muß.

Immerhin aber scheint es festzustehen, daß das Karbolineum zum mindesten für die Behandlung der Bäume (Obstbäume) ein sehr wertvolles Mittel ist, das sich eignet, das an den Bäumen überwinternde Ungeziefer abzutöten und eine gesunde und glatte Rinde zu schaffen. Das Karbolineum ist nach dieser Hinsicht ein viel wertvolleres Mittel als der vielfach übliche Kalkanstrich, dessen Wert, wie durch neuere Untersuchungen gezeigt wurde, sehr fraglich ist.

Der billige Preis des Karbolineums sowie seine leichte Anwendungsweise hat auch nicht wenig dazu beigetragen, dieses Schutzmittel so rasch volkstümlich zu machen, doch muß man strenge darauf sehen, daß nur solche Sorten von Karbolineum zur Anwendung gelangen, die auch tatsächlich den Anforderungen entsprechen. Die guten Sorten des Produktes sollen mindestens 10—15% wirksames wasserlösliches Karbolineum enthalten, es gibt aber auch Sorten, die aus über 90% Wasser bestehen. Dieses Produkt ist daher nur gleichwertig einer 4—5%igen, statt einer 10—15%igen Lösung eines anderen, ohne den großen Wasserzusatz hergestellten Karbolineums.

Das gewöhnliche Karbolineum, wie es im Handel für das Konservieren des Holzes vorkommt, ist weder für die Behandlung der Bäume noch für Baumdesinfektion geeignet, sondern nur das sogenannte wasserlösliche.

Von gewissen Teerpräparaten, so etwa Kreosot, das als Gemenge von Phenolen und ihren Äthern bezeichnet wird und das man aus Holzteer durch Behandeln mit Natronlauge gewinnt, behauptet man jedoch, daß solche sich nicht als unbedingt überall verwendbar erweisen und muß man jedenfalls eine gewisse Vorsicht walten lassen, um nachträglich nicht Schaden zu erleiden.

In der Lehranstalt für Weinbau in Geisenheim wurde nachgewiesen, daß an mit Kreosot imprägnierten Rebpfählen gezogene Trauben auch als fertiger Wein einen Kreosot-



geschmack hatten. Ebenso wurden weitere üble Erfahrungen mit Kreosotimprägnierungen beim Hopfenbau gemacht, zwar nicht durch Beeinflussung des Aromas der Hopfendolden, soweit kommt es nicht, sondern durch Verhinderung des Wachstums der Pflanze überhaupt. Es wird hierüber folgendes berichtet: Bekanntlich wird bei Drahtanlagen die Hopfenrebe mit Bindfaden in die Höhe gezogen; derselbe kann nur einmal verwendet werden und um denselben wiederholt gebrauchen zu können, kam man auf den Gedanken, denselben behufs Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse mit Kreosot zu tränken. Der junge Hopfen, welcher sehr kräftige Triebe hatte, wurde angeleitet, aber nach einigen Tagen war die ganze Anlage, über 1700 Stöcke, welf! Da die Witterung bei Tage sonnig und heiß, dagegen nachts kalt war, nahm man an, die Ranken seien erfroren, obwohl die benachbarten Stangenanlagen schön und gesund aussahen. Die Erscheinung wurde auf das geringe Wärmehaltungsvermögen des Bindfadens gegenüber der Hopfenpflanze geschoben, die welfen Triebe vom Bindfaden entfernt und frische angeleitet. Aber nach einigen Tagen waren auch diese wieder welf, obgleich es nachts warm gewesen war. Nun stellte es sich heraus, daß das Kreosot die Ursache des Verderbens der Hopfenranken gewesen war und es blieb nichts anderes übrig, als die kreosotierten Bindfäden zu entfernen und durch neue zu ersetzen. Frische Hopfenranken wurden angeleitet und dieselben wuchsen tadellos weiter; den Hopfenstöcken hat es weiter nicht geschadet und die Drahtanlage überholte noch ihre Nachbarn an Wachstum und Ertrag.

### Wasserlösliches Obstbaumkarbolineum.

1. An Materialien werden für dieses Präparat verwendet:

60	Gewichtsteile	Teeröl,
15	"	dunkles Kolophonium,

3·5 Gewichtsteile Ölsäure,

7·5         »         Natronlauge von 30° Bé.

Das Kolophonium wird mit einem kleinen Teil des Teeröles zusammengeschmolzen, nach dem völligen Verflüssigen des ersteren die Gesamtmenge des Teeröles, dann die Ölsäure und endlich die Natronlauge unter Umrühren hinzugefügt und die Mischung so lange über schwachem Feuer erhitzt, bis solche ganz klar geworden ist und sich mit Wasser emulgieren, also zu einer milchigen Flüssigkeit vermischen läßt. Da gewöhnlich  $\frac{1}{2}\%$ ige Lösungen des Karbolineums in Anwendung kommen, so verwendet man ein Teeröl, das 21% Rohphenol enthält und vermischt 3·2 kg des Produktes mit 100 l Wasser, so daß man eine etwa 3%ige Karbolineumlösung erhält. Verwendet man Teeröl, das mehr als 21% Rohphenol enthält, will aber die früher genannte Menge zusetzen, also mit einer Flüssigkeit von bestimmter Zusammensetzung arbeiten, so muß man eine zum Verdünnen des Teeröles auf 21% Rohphenolgehalt hinreichende Menge Mineralöl hinzumischen; ist dagegen der Gehalt an Rohphenol geringer, so hilft man sich in der Weise, daß man Rohkresol, wie solches im Handel vorkommt, beigibt. Bei höherprozentigem Teeröl das Präparat durch eine größere Wassermenge zu verdünnen, geht nicht an, da die Emulgierbarkeit desselben durch die bestimmte Menge Ölsäure und Natronlauge bedingt ist. Durch Erhitzen des Obstbaumkarbolineums mit Wasser erhält man ebenfalls eine Emulsion, die sich durch Zusatz von Wollfett beständiger machen läßt. Nur lösliches Obstbaumkarbolineum kann durch Vermischen gleicher Teile Rohkresol mit Schmierseife erhalten werden.

Teeröle, wenn sie eine hinreichende Menge Kresole und Phenole enthalten, lassen sich mit wässrigen Alkalilösungen allein emulgieren, doch sind die Mischungen wenig beständig, beständiger dagegen jene, bei welchen entweder unmittelbar eine Seifenlösung, etwa in Gestalt einer Schmierseifenlösung zugegeben wird oder solche, bei denen mit dem Teeröl und Kolophonium durch die Natronlauge Ölsäure

verseift wird. Man findet häufig als Zeichen einer besonderen Emulsionsfähigkeit angegeben, daß die Mischung des Obstbaumkarbolineums mit Wasser milchweiß werden muß, indes bietet die Färbung kaum einen zuverlässigen Anhaltspunkt für die Beschaffenheit des Produktes. Die weiße Färbung der Emulsion kann durch eine geringe Menge Mineralöl und vermehrten Zusatz seifenbildender Substanzen erzielt werden. Dagegen ist die Beständigkeit der Emulsion von Wert für die Wirksamkeit, damit das Teeröl sich überall gleichmäßig verbreitet. Verwendet man zu wenig Seife, beziehungsweise Seife bildende Materialien, so fällt die Emulsion schlecht, d. h. mit geringer Haltbarkeit aus. Wasserlösliches Karbolineum ist ein ganz ähnliches Produkt wie die in der Schmiertechnik, der Textilindustrie usw. verwendeten wasserlöslichen Öle. Wie schon erwähnt, ist Wollfett ein geeignetes Mittel, die Emulsion beständig zu machen, auch Leim, Stärke, Dextrin usw., doch sind die letzteren Stoffe für den hier in Rede stehenden speziellen Zweck weniger empfehlenswert. Das wasserlösliche Obstbaumkarbolineum dient zum Vernichten und zum Vertreiben von Erdflöhen, Spinnen, Schaben, Würmern, Raupen, Milben, Blutläusen, Blattläusen, Wanzen, Schildläusen, Ameisen usw. Zum Besprühen belaubter Bäume verwendet man es durchaus in Emulsion, die  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}\%$  Rohkresol enthält. Stämme und Äste werden mit stärkeren Lösungen, bis zu 1% Rohkresol enthaltend, besprüht. Die Behandlung der Bäume mit dem Präparat kann zu jeder Jahreszeit, selbstredend den Winter ausgenommen (steht im Widerspruch mit den Ausführungen auf Seite 85), stattfinden, doch müssen bei Verwendung starker Lösungen die Unterkulturen sorgfältig geschützt werden.

Wirksame Verbindungen in dem Obstbaumkarbolineum sind die Kresole und Phenole, wie solche in den Steinkohlenteeren vorkommen und sie sind es natürlich auch, die den Wert des Produktes bestimmen; zu große Mengen Kresole und Phenole können an den Obstbäumen selbst, besonders aber an den unter denselben befindlichen Pflan-

zungen bedeutenden Schaden anrichten, während geringe Mengen derselben die damit zu erzielenden Erfolge bedeutend vermindern. Es ist daher wichtig, die zu verarbeitenden Teeröle auf ihre Verwendbarkeit zu prüfen und geschieht dies mittels Natronlauge.

50 g einer gut durchgeschüttelten Probe des Teeröles werden mit 50 g Natronlauge von 36° Bé vermischt, im Wasserbad gelinde erwärmt und mit der zweifachen Menge heißen Wassers in einen Scheidetrichter gespült. Nach dem Abkühlen werden die auf der wässerigen Schichte schwimmenden Kohlenwasserstoffe mit Petroläther abgenommen und nach dem Klären die untere wässerige Schicht in einen zweiten Scheidetrichter abgelassen. Zu dieser Flüssigkeit setzt man so viel Salzsäure unter Umschütteln, bis dieselbe deutlich sauer reagiert und sich das Kohphenol oben abscheidet. Dieses Kohphenol nimmt man mit wenig Äther auf und läßt die Ätherlösung nach Entfernung der unteren wässerigen Schicht in ein gewogenes Becherglas laufen. Den Äther läßt man bei Zimmertemperatur verdunsten, trocknet zirka 30 Minuten bei 50° C und wiegt nach dem Erkalten die Masse als Kohphenol. Ein Uebelstand ist es, daß sich die Ätherschichten von der wässerigen Schicht schlecht trennen lassen, da beide stark dunkel gefärbt sind. Man muß hierbei besonders vorsichtig sein und die Arbeit bei durchfallendem Licht vornehmen, auf allzu große Genauigkeit kann diese Bestimmung nicht Anspruch machen, doch ist sie für den vorliegenden Zweck genügend. Aus dem Phenol- und Kreosolgehalt bestimmt man dann die zur Verdünnung beziehungsweise zur Emulgierung anzuwendende Wassermenge.

- |       |  |
|-------|--|
| 2. 20 | Gewichtsteile Teeröl (spezifisches Gewicht 1.03, |
| 0.456 | „ Natronlauge von 1.23 (spezifischem Gewicht,    |
| 0.952 | „ Kolophonium.                                   |

Das Harz wird mit dem Teeröl zusammengeschmolzen, worauf man die Natronlauge langsam zupfießen läßt und tüchtig umrührt. Einen Eßlöffel voll von dieser Lösung verdünnt man mit 1 l Wasser und bestreicht damit die Bäume.

3. *Truncus Carbolineum Plantarium* stellt eine dunkelbraune, alkalisch reagierende, stark nach Teer riechende Flüssigkeit dar, die nach einer chemischen Analyse aus

81·85% Wasser,

11·81% Steinkohlenteeröl und

6·34% Seife besteht. Die Seife ist in gelöster Form vorhanden und dient dazu, das Teeröl in einen wasserlöslichen Zustand überzuführen.

4. *Folia Carbolineum Plantarium*. Diese graubraune, alkalisch reagierende, stark nach Teer riechende Flüssigkeit ist zusammengesetzt aus:

92·41% Wasser,

5·49% Steinkohlenteeröl,

2·10% Seife, die, in gelöster Form vorhanden, ebenfalls die Emulgierbarkeit des Teeröles bezweckt.

5. Wasserlösliches Kreosotöl.

50 Gewichtsteile dunkles amerikanisches Kolophonium,

50 „ Kreosotöl,

56 „ Kalilauge von 25° Bé,

10 „ denaturierter Spiritus.

Das Kolophonium wird mit einer kleinen Menge des Kreosotöles zusammengeschmolzen und so bald alles flüssig ist, der Dampf des Duplikatorgefäßes abgestellt oder das Feuer ausgezogen, worauf man den Rest des Kreosotöles einrührt, wodurch gleichzeitig eine Abkühlung der ganzen Menge stattfindet. Nun beginnt man mit dem Eintragen der Lauge und dieses wird so lange fortgesetzt, bis das Öl fast klar erscheint. Die Menge der Kalilauge ist nur annähernd angegeben, denn die Beschaffenheit der Kreosotöle ist sehr verschieden und sie erfordern durchaus nicht gleiche Mengen Lauge. Ist das Öl fast ganz klar geworden, so setzt man so viel Spiritus hinzu, bis solches vollkommen blank erscheint: es ist in Wasser klar löslich. Soll es hingegen nur emulgierbar sein, so ersetzt man einen Teil des Kreosotöles durch ein billiges Mineralöl.

6. Emulgiertes Teeröl nach M. Walt. Spalteholz. Die Umwandlung von Teerölen und ihrer Bestandteile in einen Zustand, in dem sie sich mit Wasser leicht mischen lassen (emulgieren), geschieht derzeit vielfach mit Seifen. Die so hergestellten Emulsionen haben den großen Nachteil, daß die fettsauren Alkalien oder Seifen, welche sie enthalten, durch den Gehalt des Wassers an Salzen teilweise oder ganz zersetzt werden, was eine Trennung der Emulsion im Gefolge hat. Nun hat es sich gezeigt, daß die alkalischen Lösungen des Kaseins oder der Albuminate sich vorteilhaft zur Emulgierung von Teerölen, Phenolen und Mineralölen eignen. An Stelle der alkalischen Kaseinlösungen kann man mit Vorteil auch die alkalischen Lösungen derjenigen Zersetzungsprodukte des Kaseins oder anderer Eiweißsubstanzen (Leim) verwenden, welche sich bei der Einwirkung von Alkalien oder alkalischen Salzen oder durch schwache Fermentation dieser Produkte bilden. Man erhält z. B. eine emulgierende Flüssigkeit, welche zersetztes Kasein enthält, wenn man 1 kg Kasein mit 15 kg einer 1—2%igen Lauge behandelt. Es entwickelt sich hierbei Ammoniak und es bilden sich eiweißhaltige Zersetzungsprodukte, welche teils in verdünnten Säuren löslich, teils unlöslich sind. Diese Produkte können getrennt werden, um jedes für sich allein zur Verwendung zu gelangen, oder man kann die alkalische Mischung unmittelbar für die Emulgierung der Öle verwenden. In manchen Fällen erweist es sich als vorteilhaft, die Wirkung des Kaseins und seiner Zersetzungsprodukte durch einen kleinen Zusatz von Harz zu unterstützen, während in anderen Fällen sich ein solcher als nutzlos erweist. Die mit Hilfe der alkalischen Lösungen des Kaseins oder seiner Zersetzungsprodukte hergestellten Emulsionen von Steinkohlenteerölen und Phenolen haben nicht den Nachteil, sich bei Gegenwart von hartem Wasser, das viele Salze enthält, zu zersetzen, weil sie Seifen nicht enthalten. Diese Produkte geben aber mit Salzlösungen beständige Produkte, so daß die Möglichkeit der Verwendung eine allgemeinere wird, als diejenige des Arcolins, Nysols und anderer ähnlicher Produkte. Man mischt beispielsweise:

650 kg Kreosotöl, das einen Gehalt von ungefähr 60% an Phenolen besitzt, mit 350 kg Kaseinlösung, welche 12 kg Kasein und 12 kg Salmiakgeist von 0.985 enthält.

Man bekommt auf diese Weise eine mehr oder weniger milchige Flüssigkeit, welche man mit Wasser in jedem Verhältnisse mischen kann und deren Zusammensetzung folgende ist:

Rohees Kreosotöl (50—60%ig) . . . . .	65.7%
Wasser . . . . .	32.9%
Kasein . . . . .	1.2%
Ammoniak . . . . .	0.2%

Diese Mischung besitzt einen Gehalt von 30—35% an Phenolen, welcher Gehalt bei der Herstellung von Kreolin mittels Harzseifen nicht erzielt werden kann, da es sonst nicht mehr möglich wäre, die Emulsion haltbar zu machen.

### Prüfung wasserlöslicher Karbolineumsorten.

Um sich ein Urteil bilden zu können, welche Garantien man beim Kaufen einer Karbolineumsorte fordern darf, gibt Dr. E. Molz, Leiter der Pflanzenschutzabteilung der chemischen Fabrik Flörsheim, ein Verfahren bekannt, welches es dem Praktiker ermöglicht, wenigstens über zwei wichtige Punkte der Karbolineumpräparate, die Wasserlöslichkeit und den Wassergehalt derselben, sich Klarheit zu verschaffen.

1. Prüfung auf Wasserlöslichkeit. Man gibt zuerst 10 Löffel voll destilliertes Wasser oder ganz klares Regenwasser und hierauf einen Löffel wasserlösliches Karbolineum in einem Glase zusammen und läßt dann das Glas mit der Flüssigkeit einige Tage oder eine Woche stehen. Gutes Karbolineum muß hierbei eine weiße, milchartige Flüssigkeit geben, die sich ohne Abscheidung mehrere Wochen lang hält, da andernfalls durch Abscheiden von (konzentriertem, beziehungsweise reinem) Karbolineum Schädigungen auf den Pflanzenteilen hervorgerufen werden können. Scheidet sich aber sofort oder nach kurzer Zeit am Grunde der Flüssigkeit oder auf deren Oberfläche eine ölige oder schmierige Schicht ab, so ist das Karbolineum als wasser-

lösliches Produkt sehr minderwertig. (Es ist aber erforderlich, daß Karbolineum in sehr feiner Verteilung, die nur durch hohe Emulsionsfähigkeit erreicht werden kann, zur Anwendung kommt, sonst wirkt solches auf zarte Pflanzenteile zerstörend.)

2. Prüfung auf Wassergehalt. Man mischt drei Löffel voll des zu prüfenden wasserlöslichen Karbolineums mit drei Löffel voll klarem aber gewöhnlichem Petroleum in einem Arzneiglase durch kräftiges Schütteln. Bei den mit Wasser nicht verdünnbaren Karbolineumsorten erhält man auf diese Weise eine klare, einheitliche Flüssigkeit, die sich auch bei längerem Stehen nicht trübt oder in mehrere Schichten trennt. Tritt nach dem Mischen eine erhebliche Trübung ein, so ist das Produkt in der Regel durch unzulässige Mengen Wassers verdünnt. Die Verdünnung ist um so stärker, je größer die unten im Glase befindliche Wasser-schicht, beziehungsweise Schicht wässriger Flüssigkeit ist. Die Petroleumprobe ermöglicht dem Praktiker, sich wenigstens gegen eine übermäßige Verdünnung mit Wasser zu schützen. Es muß jedoch betont werden, daß im übrigen die verschiedenen Karbolineumsorten, die seit neuerer Zeit auch vielfach unter verschleiierter Bezeichnung im Verkehr sind, in ihrer chemischen Zusammensetzung große Verschiedenheiten aufweisen und davon ihr Wert oder Unwert als Pflanzenschutzmittel in erster Linie abhängig ist.

In der Jahresversammlung des Schweizerischen Vereins analytischer Chemiker in Schwyz (1907) stellte Kellhofer-Wädenswil folgende Forderungen auf, welche sowohl für die zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten, als auch für die zu Desinfektionszwecken bestimmten Krezolpräparate Gültigkeit haben sollen: 1. Dieselben sollen vollkommen klar sein, sowie in Wasser, Alkohol, Äther, Petroleum, Benzin, Benzol, Chloroform und Glycerin löslich; 2. sie müssen wenigstens 50% Phenole (Kresole) vom Siedepunkt 187—210° C enthalten, was dann zutrifft, wenn 100 cm<sup>3</sup> in einem etwa 300 cm<sup>3</sup> fassenden Fraktionierkolben mit stets gleich tief eingesetztem Thermometer (Kugel etwa 1 cm unter



dem Ansatz der Übergangsröhre) im Metallbade bis zu  $210^{\circ}\text{C}$  destilliert, nach Zusatz von etwas Kochsalz zum Destillate und gemischt eine Krejolschicht von mindestens  $45\text{ cm}^3$  liefern.

### Schwefelkohlenstoff und Emulsionen.

Schwefelkohlenstoff, hauptsächlich noch in der Weise hergestellt, daß man in geschlossenen Retorten Schwefeldämpfe über glühende Holzkohlen leitet und dann neuerlich behufs Reinigung destilliert, ist in rohem oder unvollkommen gereinigtem Zustande eine blaßgelbe, höchst widerwärtig riechende Flüssigkeit von  $1.293$  spezifischem Gewicht. In reinem Zustande ist die Flüssigkeit wasserklar, leicht beweglich, stark lichtbrechend von durchdringend chloroformartigem Geruch; sein spezifisches Gewicht ist  $1.2684$ , sein Siedepunkt liegt bei  $46.5^{\circ}\text{C}$ . Er verflüchtigt sich schon bei gewöhnlicher Temperatur, ist sehr leicht entzündlich und verbrennt mit blauer Flamme. Mit Luft gemischt, sind die Dämpfe sehr explosibel. Er löst sich zu weniger als  $1\%$  in Wasser, ist mit Alkohol, Äther, Chloroform, Benzol usw. in allen Verhältnissen mischbar.

Schwefelkohlenstoff wird noch immer als das einzig sicher wirkende Mittel gegen die Reblaus erachtet und findet ausgedehnte Anwendung.

Sehlinge der Reben, die unter der Behandlung wenig oder gar nicht leiden, wenn man solche zu einer Zeit vornimmt, wo der Saft noch nicht zur Entwicklung gekommen ist, werden durch eine Zeitdauer von  $\frac{1}{2}$  bis 12 Stunden bei einer Temperatur von  $20^{\circ}\text{C}$  der Einwirkung von Schwefelkohlenstoffdämpfen ausgesetzt und hierbei allenfalls vorhandene Rebläuse und deren Eier sicher getötet. In den Weingärten selbst werden in Entfernungen von  $50$  zu  $50\text{ cm}$  mittels besonderer Stoßeisen  $60\text{ cm}$  tiefe Löcher in den Grund gemacht, dann mit  $150\text{--}200\text{ g}$  Schwefelkohlenstoff ausgegossen und mit Erde wieder bis zum normalen Niveau bedeckt. Um das schnelle Entweichen des Schwefelkohlenstoffes

zu verhindern, wird schließlich mit Wasser begossen; Wasser ist zwar leichter als Schwefelkohlenstoff, aber es verhindert die feuchtgemachte Erde doch die Verdampfung desselben, und zwingt ihn, sich in dem Erdbreich auszubreiten. Die Arbeiter müssen sich natürlich durch Respiratoren oder Zumbinden des Mundes und der Nase vor dem Einatmen sichern und Rauchen ist denselben unbedingt zu verbieten.

Neben Schwefelkohlenstoff ist auch das aus demselben durch Versetzen mit einem alkoholischen Kaliumhydroxyd hergestellte Kaliumxanthogenat (xanthogensaures Kalium), das allerdings wesentlich höher im Preise steht, als Mittel gegen die Reblaus im Gebrauch.

Auch gegen die Engerlinge, Wurzelmaden verschiedener Art, Wurzelläuse, kann Schwefelkohlenstoff vorteilhaft angewendet werden; man bringt denselben ebenfalls in Löcher, die jedoch weniger tief sind, und in wesentlich geringerer Menge in den Erdboden, in dem er sich dann in Gasform verbreitet und die Schädlinge abtötet. Die Geeignetheit des Mittels zur Vertilgung von Rüben nematoden ist noch nicht vollständig erprobt, dagegen hat man gegen Läuse auf Pflanzenteilen durch Aufstellen mit Schwefelkohlenstoff gefüllter kleiner Schalen und Überdecken dieser und der Pflanzen versuchsweise gute Resultate erzielt, jedoch dürfte sich das Verfahren in der Praxis als zu umständlich erweisen.

Nach allen bisher gemachten Erfahrungen, scheint der Schwefelkohlenstoff ganz im allgemeinen ein sehr geeignetes Mittel zur Behebung der sogenannten Bodenmüdigkeit zu sein.

Dem Schwefelkohlenstoff wird nachgerühmt, daß er alle jene Hindernisse beseitige, die bis dahin der Entwicklung der Bodenorganismen entgegenstünden, wodurch der im Acker festgelegte, den Pflanzen unzugängliche Stickstoff frei und von ihnen aufgenommen würde. Der Schwefelkohlenstoff wird in den Gärtnereien zum Treiben von Ziersträuchern und Blumen vielfach verwendet, besonders aber bei der Reblausbekämpfung, da er nach den vorliegenden Angaben zum größten Teil die Rebläuse vernichtet, die Neben-

müdigkeit des Bodens aufhebt und dessen Fruchtbarkeit erhöht.

### Schwefelkohlenstoff-Emulsionen.

Diese Emulsionen haben im allgemeinen keine besonderen Erfolge erzielen lassen, da wenn dieselben stärker gehalten werden bei Behandlung der Weinreben schon Schaden an denselben eintritt.

1. Nach der entomologischen Versuchsstation in Florenz:

16.0 Gewichtsteile Schmierseife

10.0 „ Alkohol

12.0 „ Schwefelkohlenstoff;

das Mittel ist vor der Anwendung auf 1 Gewichtsteil mit 45—50 Gewichtsteilen Wasser zu verdünnen.

2. Nach Targioni und del Guercio:

I.

II.

Schwefelkohlenstoff . . 10 Gewichtsteile 5 Gewichtsteile

Spirituöse Seifenlösung 10 „ 10 „

Wasser . . . . . 980 „ 985 „

### Petroleum.

Das Petroleum wird schon seit langen Jahren als bewährtes Vertilgungsmittel der Wanzen verwendet und es hat sich auch bei Pflanzen, insbesondere als Schutzmittel gegen Insekten mit saugenden Mundwerkzeugen und gegen solche Schädlinge, deren Körperbedeckung weich ist, bewährt. Allerdings ist das Petroleum an und für sich gegen Pflanzen von nicht ungefährlichem Einflusse und muß man dasselbe vorsichtig und am besten in Vermischung mit Sand oder Erde, in Mischung mit Wasser, die aber schwer homogen, d. h. in gleichmäßig vermischtem Zustande zu erhalten ist, verwenden; als besonders geeignet haben sich die wasserlöslichen, d. h. mit Wasser emulgierbaren Petroleumkompositionen bewährt, die aus Petroleum, Seife, Soda, auch wohl aus Alkali, Olein, Spiritus und Petro-

leum in Verbindung mit Wasser hergestellt werden. Bei diesen Kompositionen gelangt das Petroleum in sehr geringen Mengen auf die Pflanzen, scheidet sich nach dem Zerlegen der Emulsion auf den Teilen derselben aus, ist von nachhaltiger Wirkung und vermag keinen oder nur wenig Schaden anzurichten. Petroleumemulsionen werden besonders angewendet gegen Engerlinge, verschiedene Larven, gegen Erdflöhe, Kohlraupen, Spannerraupen, gegen den Heu- und Sauerwurm, gegen die Apfelmotte, Graseulenraupen, die Möhrenfliege, junge Kohlwanzen, Zikaden, Blatt- und Schildläuse.

Das Petroleum kann sowohl in Form von Rohöl, wie es aus den Gruben kommt, wo es zu sehr billigen Preisen erhältlich ist, als auch in raffiniertem, gereinigtem Zustande (Petroleum, Leuchtöl) zur Anwendung kommen und werden wohl die Lokalverhältnisse zumeist ausschlaggebend sein, welche der beiden Sorten in Anwendung zu kommen hat. Bei der Behandlung des Bodens mit Petroleum gegen unter der Erde vorhandene Schädlinge werden in angemessenen Entfernungen Löcher in den Boden gestoßen und diese mit der Flüssigkeit gefüllt; diese letztere verteilt sich dann sehr bald in dem gesamten Erdreich und angesichts der Insekten tötenden Wirkung werden bald alle Lebewesen vernichtet sein. Mit den Petroleum-, Sand- oder Erde- oder Sägespänemischungen kann man die Bodendecke überstreuen, den obersten Teil der Erdrume auch damit mischen; das Petroleum kommt dann durch Eindringen sehr bald auch in die unteren Erdschichten. Die Petroleum-Emulsionen werden wie alle flüssigen Insekten-Vertilgungsmittel mittels der geeigneten Vorrichtungen in sehr fein verteiltem Zustande aufgestäubt. Nachstehend werden einige Anleitungen für Petroleum-, Sand- und Sägespänemischungen und Petroleum-Emulsionen gegeben.

### Petroleumpulver.

1. Man vermischt 12 Gewichtsteile Rohpetroleum unter beständigem Durchmischen mit annähernd 85 Gewichtsteilen

trockener Erde oder trockenem Sand, so daß ein gleichmäßig durchtränktes Pulver sich bildet.

2. 30 Gewichtsteile Sägespäne oder Holzmehl weicher Hölzer werden mit 15 Gewichtsteilen Rohpetroleum innig vermischt und dann noch so viel Sand oder Erde hinzugesetzt, daß nach tüchtigem Durcharbeiten ein eben noch feuchtes Pulver vorhanden ist.

Bei Verwendung von Leuchtöl muß man, der Dünnschmelze Rechnung tragend, die Menge desselben entsprechend verringern.

### Petroleum-Emulsionen.

1. 210 Gewichtsteile Rohpetroleum,  
     20       »       raffiniertes Harzöl,  
     20       »       Destillat-Ölein,  
     7.5      »       Natronlauge von 18° B $\acute{e}$   
     7.5      »       denaturierter Spiritus.

Die Herstellung ist sehr einfach und erfordert keine besonderen Kenntnisse. Man rührt Mineralöl, raffiniertes Harzöl und Ölein in einem Kessel zu einer gleichmäßigen Mischung zusammen. Andererseits stellt man eine Mischung von gleichen Gewichtsteilen Natronlauge und Spiritus her und fügt hiervon vorsichtig so viel zu der Öllösung, daß solche nach dem Durchmischen klar ist und sich mit Wasser, neunmal so viel als Öl, dauernd emulgiert.

2. 100 Gewichtsteile Rohpetroleum,  
     45       »       Harzöl, roh,  
     25       »       raffiniertes Harzöl,  
     60       »       Ölsäure,  
     40       »       Türkischrotöl.
3. 230 Gewichtsteile Rohpetroleum,  
     75       »       Ölsäure auf 50° C erwärmt,  
     60       »       Natronlauge von 30° B $\acute{e}$  einrühren,  
     abkühlen lassen, dann 67.5 Gewichtsteile denaturierten Spiritus hinzumischen. Eine allenfällige Trübung wird durch Hinzugabe von Ölein, die nicht genügende Emulsions-

fähigkeit durch Vermehrung der Menge der Lauge in das richtige Verhältnis gebracht.

### **Tabak als Bekämpfungsmittel von Ungeziefer.**

Tabakerxtrakt, der jetzt vielfach in Zigarren- und Tabakfabriken im großen dargestellt wird, ist ein ganz vorzügliches Bekämpfungsmittel gegen tierische Pflanzenschädlinge und wird hierbei eine Lösung von 2 kg derselben in 100 l Wasser angewendet; dieselbe ist leicht herstellbar, da der Tabakerxtrakt sich sofort auflöst und die Anwendung geschieht durch Aufspritzen gleich nach dem Abtrocknen des Morgentaus, ehe die sengenden Sonnenstrahlen auf die Pflanzen einwirken können. Tritt unmittelbar nach dem Bespritzen feuchtes Wetter oder Regen ein, so muß das Verfahren wiederholt werden. Gegen Blattläuse, Raupen, den Erdsloh, das Spargelhähnchen, die Acker Schnecke bewährt sich die Tabakerxtraktlösung vorzüglich. Auch bei der Blutlaus ist die Wirkung sicher, nur muß die Bespritzung wiederholt vorgenommen werden. Auch Saatbeete von Lebkuchen und Kohlrarten werden durch Tabakerxtrakt vom Erdsloh befreit und überall, wo sich tierische Pflanzenschädlinge gezeigt haben, bildete die Tabakerxtraktlösung ein verlässliches Schutz- und Bekämpfungsmittel.

Der Tabakrauch wird bekanntlich von allen Gegenständen leicht angenommen und Räume, in denen viel geraucht wird, sind für viele Personen zum Aufenthalt ungeeignet, weil der Geruch der Verbrennungsprodukte des Tabakes ein äußerst unangenehmer und sehr lang anhaltender ist. Es ist bekannt, daß sich unter der Einwirkung des Tabakrauches alles bräunt, aber es sind die Wirkungen des Tabakrauches noch wenig beobachtet worden, obwohl sie sehr interessant und von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind. Ein Stück rohes Rindfleisch in dünne Scheiben geschnitten, dem Tabakrauch ausgesetzt, wird von den Hunden nicht berührt; gelingt es aber, ihnen ein solches Stück in einer Umhüllung von Brotkrume beizubringen, so erfolgt der Tod

in einer Stunde. Ein Stück Kalbfleisch mit Tabakrauch gesättigt, im Ofen ausgebraten, so daß der Saft ausgeflossen ist, bringt Ratten, die davon fressen, gleichfalls den Tod (ein sehr einfaches und leichtes Mittel, sich von dieser Plage zu befreien). Gekochtes Rindfleisch erregt unter allen Umständen Erbrechen. Dieses gar gemachte Fleisch, gekocht oder gebraten, nimmt den Tabakrauch mehr oder weniger an, je nach dem Grade des Garseins, Roastbeef, Beefsteaks am meisten, dann der Braten, am wenigsten das auf andere Weise zubereitete Fleisch. Das Eindringen des Rauches vermindert sich mit dem Kaltwerden des Fleisches. Die Wirkung hängt auch von der Beschaffenheit des Rauches ab und teilt sich der Rauch von frischem oder naß gewordenem Tabak leichter mit, als der von leicht brennendem, dessen Rauch weniger schwer ist. Am gefährlichsten, also am meisten schädlich wirkend, sind die letzten Züge aus einer Zigarre oder aus einer kurzen Pfeife.

Die Verschiedenheit der Tabake hat ebenfalls verschiedene Wirkung. Erdbeeren oder Himbeeren, dem Rauche ausgesetzt, sind vollständig ungenießbar. Wenn nun schon Nahrungsmittel wie Fleisch, bei welchem das Eindringen des Tabakrauches doch nur schwer erfolgen kann, so gefährliche Wirkung haben, wie viel mehr andere Produkte, wie beispielsweise Mehl, welches der Rauch vollkommen durchdringen kann, Milch usw. Bedingung für das sich Geltendmachen der Schädlichkeit des Tabakrauches ist natürlich in erster Linie, daß die Nahrungsmittel unmittelbar der Einwirkung desselben ausgesetzt werden — je mehr sich der Rauch in einem Raume verbreitet, um so weniger wird er empfunden —; zweitens aber wird auch ein gewisser Feuchtigkeitszustand des anzuräuchernden Objektes erforderlich sein, damit der Tabakrauch auf demselben haftet. Ganz trockene Nahrungsmittel werden weniger der Gefahr des Vergiftens ausgesetzt sein.

Jedenfalls könnten die vorgenannten Beobachtungen der vergiftenden Wirkungen des Tabakrauches für die Verhütung von kleinen Säugetieren nutzbar gemacht werden,

wenn diese letzteren nicht vor dem Geruche zurückschrecken, der allerdings durch sogenannte Witterungen zu verdecken wäre, indem man in besonderen Vorrichtungen Tabak verbrennt, dessen Rauch unmittelbar auf Fleisch usw. einwirkt. Ob der Tabakrauch auch Insekten, wie Wanzen usw., zu beseitigen imstande ist, könnte durch einfache Versuche des Verbrennens von Tabak in geschlossenen Räumen leicht erprobt werden.

Gegen Blattläuse auf Rübsenfeldern und in Hopfenpflanzungen hat sich nach Direktor Brien der Tabakertrakt sehr gut bewährt. Eine 2%ige Lösung desselben hat die im Jahre 1903 sehr von Blattläusen befallenen Sommerrübsenfelder vollständig von diesen Ungeziefer befreit, obgleich nur eine einmalige Bespritzung angewendet wurde. Zum Bespritzen diente die Austriaspritze, doch muß bei derselben ein Mundstück benützt werden, das die feinste dunstartige Verstäubung der Flüssigkeit gestattet. Ein ähnlicher Erfolg wurde mit diesem Mittel von einzelnen Landwirten in Hopfengärten erzielt. Aus verlässlichster Quelle weiß man, daß Landwirte, welche ihren von Blattläusen befallenen Hopfengarten rechtzeitig mit 2%iger Tabakertraktlösung bespritzten, 20 Meterzentner Hopfen ernteten, während Nachbarn, welche dies unterließen, nur 4.5 Meterzentner gewinnen konnten.

### Verschiedene Tabakertrakt-Präparate.

Zur Herstellung des Tabakertraktes werden die starken und schwachen Rippen der Blätter, die zum Beizen der Blätter verwendeten Saucen und endlich überhaupt alle Abfälle verwendet, indem man solche mit geeigneten Wassermengen andauernd kocht und die Flüssigkeit nach dem Durchsiehen auf einen bestimmten Nikotingehalt einkocht. Es ist nun natürlich für die Wirksamkeit des Präparates der Gehalt an Nikotin außerordentlich wichtig, denn davon hängt es ab, mit wieviel Wasser ein solches zu verdünnen ist. Sajo gibt als gut wirkendes Mittel eine Lösung von



2 Gewichtsteilen Tabaklaugenextrakt mit 14·5%  
Nikotingehalt in

100 Gewichtsteilen Wasser an, in anderen Vorschriften findet man nur Tabakauszug oder Tabakslauge angegeben. Vielfach wird der Tabakextrakt auch mit Seife, Holzgeist, Amylalkohol und Kreolin, Kupfervitriol, Kochsalz kombiniert.

1. Nach Reßler

9	Gewichtsteile	Tabakauszug
6	»	Seife,
7½	»	Kartoffelspirit,
30	»	Weingeist,
150	»	Wasser.

2. 45 Gewichtsteile Tabakblätter werden in 50 Gewichtsteilen Wasser ausgekocht und das daraus erhaltene Filtrat in einer Lösung von

8·25	Gewichtsteilen	Seife in
100	»	Wasser gelöst, erkalten lassen und

2·10 Gewichtsteile Fuselöl zugelegt, eingerührt.

Dr. Hollrung erwähnt noch die nachstehenden Zusammenstellungen.

3.	50	Gewichtsteile	Tabakauszug,
	0·75	»	Seife,
	100	»	Wasser; gegen die Hopfenlaus.

4. Gegen den Heu- und Sauerwurm.

	6	Gewichtsteile	karbolisierter Tabaksaft,
	2·75	»	Kreolin,
	1·5	»	Seife.
	150	»	Wasser. Anwendung in 2 5" iger Lösung.

5.	1¾ bis 2	Gewichtsteile	eingedickter Tabakauszug,
	1¾ bis 2	»	Kochsalz,
	110	»	Wasser; als Spritzmittel gegen Kohlräupen.

6. 4 Gewichtsteile Tabaksaft,  
 0·1 „ Kupfervitriol,  
 100 „ Wasser, gegen Heu- und Sauerwurm und falschen Mehltau.

7. Nach Jamina gegen falschen Mehltau, Heu- und Sauerwurm

- 5·5 Gewichtsteile Tabaksaft,  
 33·0 „ Schmierseife,  
 2·5 „ Kreolin,  
 2·5 „ Kupfervitriol,  
 11·0 „ Kalilauge,  
 100·0 „ Wasser.

Die Schmierseife wird in der angegebenen Wassermenge gelöst, ebenso der Kupfervitriol in der Kalilauge; beide Lösungen unter kräftigem Umrühren mischen, schließlich Tabaksaft und Kreolin hinzusetzen und alles durch kräftiges Durchmischen vereinigen.

### Raupenleime.

Man bezeichnet als Raupenleime stark klebende, dabei aber nicht austrocknende Kompositionen aus Harz (Koloophonium), Ölen, dann auch Teer, welche bestimmt sind, auf die Stämme der Obst- und Waldbäume in einem Gürtel oder Ring von 4 bis 10 cm Breite aufgestrichen zu werden; mitunter trägt man den Raupenleim auch nicht unmittelbar auf den Stamm, sondern auf entsprechend breite Streifen von Pergament- oder Ölpapier auf, legt dieses dann um die Stämme und bindet es mittels Schnur oder Draht fest, derart, daß das Papier fest anliegt und Insekten dazwischen nicht durchschlüpfen können.

Guter Raupenleim muß eine entsprechende Konsistenz aufweisen, zäh und dickflüssig sein, doch unter dem Einflusse der Sonnenwärme nicht so weit erweichen, daß er abrinnt und nicht mehr klebt; er darf aber auch bei niedriger Temperatur nicht fest und trocken werden, dann würden die Insekten nicht darauf haften, sondern darüber hinweg-

kriechen, wie es auch der Fall ist, wenn der Leim nach längerer Zeit austrocknet. Es ist nicht sehr leicht, einen unter allen Einflüssen der Temperatur und den Niederschlägen bis zu einem gewissen Grade unveränderlichen, den Zwecken ganz entsprechenden Leim herzustellen; die nachfolgenden Anleitungen ergeben gute Resultate, doch wird man da und dort Verschiebungen in den Mengenverhältnissen müssen eintreten lassen.

1. Peringscher Brumataleim.

Man schmilzt

700 g Holzteer mit

500 g Kolophonium und

500 g schwarzer Seife zusammen, vermischt gut und verdünnt die Masse dann mit

300 g reinem Fischtran.

2. 500 g schwarzes Pech werden mit

200 g dickem Terpentin zusammengeschmolzen und der Masse noch

375 g Leinöl behufs Verflüssigung zugelegt.

3. 500 g Rüböl werden mit

1000 g Schweinefett unter Umrühren auf dem Feuer vermischt und

1000 g Kolophonium darin zum Schmelzen und Lösen gebracht.

4. In gleicher Weise werden vereinigt:

500 g Kolophonium,

2000 g Schweineschmalz,

2000 g Stearinöl (Ölsäure).

5. 200 Teile Fichtenharz,

1000 > Kolophonium,

140 > Terpentin,

80 > Picis Liquid.,

500 > Schweinefett,

240 > Rüböl,

200 > Seb. Ovil.

6. 50 Teile Kolophonium,  
40 » Schweinefett,  
40 » Stearinöl (Ölsäure).
7. 30 Teile Kolophonium,  
40 » Rüböl,  
20 » Schweinefett,  
10 » Schmierseife,  
100 » Holzteer.

Diese Klebmasse wird in geschmolzenem, also warmem Zustande mittels eines steifen Borstenpinsels auf Klebgürtelpapier gestrichen, wie man sich solches durch Tränken von dünnem Packpapier mit Firnis herstellt. Die Breite des Klebgürtels braucht 10 cm nicht übersteigen. Derselbe wird ungefähr 1 m über der Erde am Stamme mit zwei Bindfäden (oben und unten) befestigt. Vor Anlegen des Papiers muß noch die Rinde des Stammes glatt gemacht werden und, nachdem das Klebgürtelpapier befestigt ist, wird dasselbe mit dem sogenannten Raupenleim bepinselt. Übrigens ist der geeignetste Zeitpunkt des Anlegens Ende Oktober oder Anfangs November. Der Zweck des Klebgürtels ist bekanntlich der, die Weibchen des Frostspanners (*Cheimatopia brumata* L.), welche flügellos sind und innerhalb der erwähnten Zeit von dem Erdboden aus am Stamme aufwärtsklettern (aufbäumen) abzufangen. Zur selben Zeit sieht man die Bäume an sonnigen Tagen von kleinen grünen Schmetterlingen, den Männchen, umschwärmt, welche die an den Zweigen sitzenden Weibchen zur Begattung aufsuchen.

8. Gewöhnliche Harzwagenschmiere wird als das beste Mittel bezeichnet, um die Weibchen des Frostspanners von den Bäumen fern zu halten. Es wird ein Ring von Papier mit Schnüren oder Draht um den Baum befestigt und die Wagenschmiere auf das Papier gestrichen. Sollte die Schmiere etwas zu dick sein, so setzt man etwas Ölsäure hinzu.

9. 1000 g dicker Terpentin.  
500 g Kolophonium werden mit  
750 g Kiefernteer zusammengeschmolzen.

10. Man schmilzt

30 Gewichtsteile rohes Wollfett mit  
 10 Gewichtsteilen Blau- oder Paraffinöl zu-  
 sammen und rührt dem Gemenge nach dem Abkühlen auf  
 30° C noch ein Gemisch von  
 15 Gewichtsteilen Harzöl,  
 25 „ rohem Harzöl und  
 10 „ hellem Blauöl ein. Nach gutem  
 Umrühren bringt man noch 30 Gewichtsteile Anisat (Mutter-  
 fett) zu und rührt bis zum Erkalten die stetig dicker  
 werdende Masse.

11. Es werden gemischt

50 Gewichtsteile blaues Harzöl,  
 50 „ dickes Harzöl (Stocköl) und  
 0.5 „ Parakautschuklösung und ver-  
 seift mit  
 5.6 Gewichtsteilen Kalkbrei.

12. 100 Gewichtsteile Kolophonium,  
 70 „ Schweinefett,  
 66 „ Rapsöl.

## **Verchiedene Ungeziefer-Vertilgungsmittel.**

1. Gegen Kissen, Schwaben und größere Käfer.

10 g frisch geglühter Kienruß,  
 10 g Saftgrün,  
 240 g weißer Arsenik in Pulver.

2. Das Ungeziefer-Vertilgungsmittel »Puffi«

besteht aus einer mit fettlöslichem Teerfarbstoff grün ge-  
 färbten Mischung von  
 Petroleum und  
 Amylacetat (essigsaures Amyloxid).

### 3. Nach Verein. Staat. Pat. Nr. 896.094.

1 Gewichtsteil auf etwa 30° B $\acute{e}$  eingedampfte Lauge der Sulfitzellstoffabrikation wird mit

2 Gewichtsteilen Xerolin (Leuchtpetroleum) oder einem anderen ähnlichen Öle vermischt; die sich bildende klare Lösung ist sehr wirksam zur Vernichtung von Ungeziefer in Gärten usw. Behufs Gebrauches wird die Flüssigkeit mit

10 Gewichtsteilen Wasser verdünnt.

### 4. Nach Ferdinand von Strantz in Berlin

(D. R. P. Nr. 200.305).

Während in vielen Fällen, insbesondere bei grünen Pflanzen, nur schwache Kalklösungen angewendet werden können, die nicht mit Sicherheit wirken, weil stärkere Konzentrationen die Pflanzen schädigen und gleiches auch bei Ammoniak der Fall ist, können bei der gleichzeitigen Verwendung beider Flüssigkeiten so schwache Konzentrationen benutzt werden, daß die Pflanzen keine Schädigung erleiden; die Schädlinge aber werden sicher abgetötet. Die Flüssigkeit besteht aus einem Gemisch von Gaswasser mit Kalkwasser (Mgkalk), mit der die zu schützende Pflanze behandelt wird.

### 5. Nach Emil Eskenajm im Pansdorf

(D. R. P. Nr. 168.186).

Es handelt sich hier um ein Verfahren zur Entfernung und Tötung von Ungeziefer, gekennzeichnet durch die Verwendung von Äthylentetrachlorid. Das Äthylentetrachlorid kann nach D. R. P. Nr. 154.657 leicht dargestellt werden, ist eine aromatisch riechende, indifferente, nicht brennbare Flüssigkeit, die bei 145° siedet und kann ohne jedes Bedenken hinsichtlich der Feuergefährlichkeit oder Giftigkeit überall zur Vertilgung von Ungeziefer angewendet werden.

6. Nach E. Fichtenau (Schwed. Pat. Nr. 23.418).

Jettsäure, Harzsäure oder ein Gemisch beider mit Aocextrakt versetzt, gut gemischt und getrocknet. Erforderlichenfalls kann auch Petroleum oder Lavendelöl mit Alaun zugefügt werden.

7. Nach Dr. F. Sauer in Potsdam

verwendet man zum Töten von schädlichen Lebewesen in geschlossenen Räumen die Gasgemische, welche schwerer als Luft sind, derartig, daß man die Gasgemische dem zu behandelnden Raum von der tiefsten Stelle aus zuführt. Die tödlichen Gase dringen sicher in alle Räume ein. Bei dem zunächst erfolgenden Verdrängen der Luft von unten nach oben werden auch die abzutötenden Tiere nach oben getrieben, so daß ihr Einfangen oder Einsammeln erleichtert wird. Um die Räume wieder mit Luft zu füllen, saugt man das Gas in die Zuführungsleitung ab.

8. Knodolin

besteht aus 400 Teilen Kaliseife mit 60% igem Wassergehalt,  
600 „ Amylalkohol,  
2 bis 3 Teilen Nitrobenzol,  
10 Teilen xanthogen-saurem Kali.

9. Eclair von Balmorel.

bildet ein hellgrünes Pulver und enthält  
38.9% eßigsaures Kupfer,  
24.6% schwefelsaures Natron neben Kaolin.

10. Keletis Antipora

ist zusammengesetzt aus  
80% Talkum (Federweiß),  
15% Karbolsäure,  
5% Wasser.

### 11. Tur von Ermisch.

Gemisch aus  
 86·7% Karbolsäure,  
 6·1% Kalk, von welchen etwa 5% als schwefelsaurer  
 Kalk vorhanden sind.

### 12. Jenkers Antidin

ist anscheinend ein Gasfabrikprodukt, welchem ein Zusatz  
 von Kalk gegeben wurde; es enthält  
 8·6% freien Schwefel und  
 1·6% Kalziumsulfit.

### 13. Insektenvertilgungsmittel »Tineol«.

Dieses ziemlich wirksame Präparat besteht aus  
 500 g Tabakrippenpulver,  
 500 g gemahlenen Pyrethrumblüten,  
 50 g » Borax,  
 50 g » rotem, chromsaurem Kali,  
 50 g » Paprika, innig miteinander vermischt  
 und mit  
 5 g Mirbanöl und  
 5 g Oleum sabadillae parfümiert.

### 14. Schwaben- und Rattenpulver.

Ein derartiges Präparat bestand nach einer Unter-  
 suchung aus einem weißen, stark alkalisch reagierenden Pulver  
 aus Kalk, Borax, Zucker und Zerealienmehl; gegen Ratten  
 dürfte sich das Mittel kaum als wirksam erweisen.

### 15. Rattenwurf

besteht aus mit Meerzwiebel und mit Wachholderöl ver-  
 mengtem Mehl. Das Mittel wurde an verschiedenen Orten  
 verkauft und sollen viele Ratten an demselben zugrunde ge-  
 gangen sein.



## 16. Apteripte

zur Vernichtung von Ungeziefer im Erdboden.

Das Produkt ist eine feste, jedoch leicht zerbröckelnde Masse von grauer Färbung und stark kreolinartigem Geruche. Nach der chemischen Untersuchung besteht sie aus etwa

33% Rohnaphtalin,

16% natürlichem Tonerdesilikat (Ton) und

50% Kalkschwefelleber, hergestellt durch einen mechanischen Miischprozeß.

## 17. Fichteninseife zur Vertilgung von Ungeziefer

hat sich bei der Untersuchung als gewöhnliche Fettseife erwiesen, der etwas ätherisches Öl zugelegt ist, die aber antiseptische oder die Insekten oder pflanzliche Parasiten tötende Substanzen nicht enthält. Sie kann also besondere Wirkungen nicht äußern und an ihrer Stelle kann jede andere Seife angewendet werden.

## 18. Hanföl gegen Hautschmarozer.

Als ein vorzügliches Mittel zur gefahrlosen Vertreibung von Hautschmarozeren ist Hanföl anzusehen. Zwei bis drei Stunden nach dem Einreiben desselben hört bei den mit Ungeziefer bedeckten Haustieren das Jucken auf, die Schmarozer sind abgestorben. Das Hanföl ist billig und leicht zu beschaffen und besitzt nicht wie andere Mittel dieser Art giftige Eigenschaften. Seiner Anwendung steht deshalb auch bei Pferden gegen Stechfliegen usw., wie bei Hunden und Kälbern, welche die Einreibungen abzulecken pflegen, nichts im Wege. Ganz besonders bewährt sich die Einreibung von Hanföl gegen Schmarozer beim Federvieh.

## 19. Harz- und Öl-Seifenlösungen gegen Schild- und Blattläuse.

Diese Schutzmittel werden im allgemeinen hergestellt, indem man pflanzliches Öl (Leinöl, Rüböl, Baumwollamen-

öl) oder Kolophonium mit einem Alkali (Soda, Pottasche) im Überschuß und Wasser so lange erhitzt, bis Verseifung eingetreten ist; der Wert dieser Mittel liegt ebenfalls in der stark alkalischen Beschaffenheit der Seifenlösung und dem dünnen Überzug von Seife auf den einzelnen Pflanzenteilen. Bei einer Seife, welche in 100 Teilen 10 Teile Öle und 5·1 Teile Lauge enthält, verdünnt man bei der Verwendung mit der 10- bis 50fachen Wassermenge.

## 20. Herrings Masse zum Beiprizen von Obstbäumen

besteht aus

1	Gewichtsteil	Chlornatrium,
2·3	Gewichtsteilen	Quecksilberjulfid,
8	»	Quecksilberjubilmat,
0·7	»	Schwefel und
500 bis 5000	»	Wasser.

## 21. Holzölkuchen

als Insektenvertilgungsmittel und Bodendesinfizienz.

In China und auch in Japan werden aus den Früchten (Nüssen) des Ölfirnisbaumes (*Aleurites cordata*, *Elaeococca vernicia*) große Mengen von Holzöl gewonnen, die sowohl in den Produktionsländern selbst, als auch in Europa und Amerika zu Anstrichzwecken und zur Lackfabrikation dienen. Die bei der Öldarstellung als Rückstand hinterbleibenden Kuchen sind stark giftig und daher als Viehfutter nicht geeignet, aber sie bilden ein sehr wertvolles Düngemittel und haben noch die besondere Eigenschaft, alle Insekten, welche sich von den Wurzeln der Pflanzen nähren, abzutöten. Diese Eigenschaft macht die Verwendung des Abfallproduktes ganz besonders wertvoll für die weinbautreibenden Bezirke Deutschlands, und L. Hoffmann in Shanghai hat in einer besonderen Eingabe an das preußische Ackerbauministerium diesbezügliche praktische Erfahrungen zur Kenntnisaufnahme übermittelt.

## 22. Vertilgen von Insekten und Larven in technischen Drogen.

Man stellt in einem offenen Gläschen eine kleine Menge Schwefelkohlenstoff in das Gefäß mit der betreffenden Droge und schließt letzteres dann möglichst luftdicht ab.

## 23. Insektenvertilgungsmittel von H. Bösch in Stuttgart.

Daselbe besteht aus einer Nitrophenolwasserlösung, welcher wasserlösliches (d. h. mit Wasser emulgierbares) Harzöl zugelegt wird. Diese Flüssigkeit kann auch durch Aufsaugen mittels Leichtsipat, Infusorienerde in Pulverform gebracht werden; daselbe wird dann als Verstäubungsmittel angewendet.

## 24. Insektenvertilgungsmittel von Brda in Fulnek (Mähren).

Es handelt sich hier um ein ganz seltenes Mittel welches Schlossgärtner Brda zum Schutze seiner Pflanzen gegen Erdsflöhe, Kohlweißlinge, Würmer, Raupen usw. in Anwendung bringt. Er bereitet eine Tinktur, indem er die verschiedenen Gemüse- und sonstigen Pflanzenfeinde, das heißt alle erreichbaren schädlichen Insekten in eine entsprechend große Flasche füllt, darauf ungefähr 6 Teile gereinigte Kuhjauche (Urin) und 1 Teil Spiritus bringt und die ganze Mischung durch einige Tage in der Sonne mazerieren läßt. Er weicht in diese Tinktur die verschiedenen zur Aussaat bestimmten Samen ein, sät sofort aus, behandelt sie weiter wie üblich und teilt mit, daß solche Pflanzen rasch und üppig wachsen und gegen tierische Schädlinge unempfindlich sind. Diese Mitteilung wird mit aller Reserve gegeben, jedoch bemerkt, daß in vielen derartigen Versuchen oft eine bedeutende Wahrheit liegt und

viele wertvolle Erfindungen basieren darauf. Vielen Fachleuten dürfte bekannt sein, daß verschiedene Tiere vor dem Geruch der Kadaver von ihresgleichen zurückschrecken und in dieser Tatsache dürfte vielleicht ein Hinweis betreffend die Wirksamkeit des eigenartigen Mittels zu suchen sein.

## 25. Insektenvertilgungsmittel in flüssiger Form.

Von flüssigen Insektenvertilgungsmitteln sind eine große Anzahl Kompositionen teils in Gebrauch, teils empfohlen worden, die sich je nach der Art der in denselben enthaltenen Bestandteile, als auch der Widerstandsfähigkeit der Insekten gegen dieselben mehr oder weniger bewährt haben. Substanzen, welche unmittelbar den Tod des Insektes zur Folge haben, sind natürlich von größerer Wirksamkeit als solche, welche nur betäubend wirken oder vor dessen Geruch die Tiere die Flucht ergreifen.

- a) 2·000 Gewichtsteile Petroleum,  
0·100 Gewichtsteil Kienöl (sogenanntes russisches Terpentinöl),  
0·002 Gewichtsteile Polehöl.
- b) Petroleum mit etwas Wintergrünöl parfümiert.
- c) 4 Gewichtsteile Petroleum,  
 $\frac{1}{2}$  Gewichtsteil Terpentinöl,  
0·1 „ Benzin, parfümiert mit Lavendelöl.
- d) 1·200 Gewichtsteile Petroleum,  
0·150 „ Kienöl,  
0·150 „ Benzin,  
0·075 „ Eukalyptusblätter,  
0·010 „ Eukalyptusöl.

Man mischt Petroleum, Kienöl und Benzin, behandelt die Eukalyptusblätter 24 Stunden lang mit der Flüssigkeit, seigt dann durch Gewebe und setzt das Eukalyptusöl hinzu.

e) Sehr gut haben sich Emulsionen aus Seife und Petroleum oder Seife, Paraffinöl und Naphthalin als Schutzmittel gegen Pflanzenschädlinge bewährt.

Man löst beispielsweise:

1 $\frac{1}{2}$  Gewichtsteile Waltranseife in 50 Gewichtsteilen Wasser, fügt 50 Gewichtsteile Rohdestillate unter tüchtigem Umrühren zu und setzt das Vermischen so lange fort, bis eine gelbe, cremartige Emulsion entstanden ist. Durch Zusatz von Naphthalin, welches sowohl in Seife wie in Mineralölen löslich ist, wird eine bessere Emulsion erzielt und ein derart hergestelltes Präparat soll von vorzüglicher Wirksamkeit sein.

f) 10 kg Schmierseife,

3 $\frac{1}{2}$  kg Wasser,

1 kg Naphthalin,

3 $\frac{1}{2}$  kg Petroleum.

g) 10 Gewichtsteile Waltranseife,

7 „ Rohpetroleum,

$\frac{1}{4}$  Gewichtsteil Naphthalin.

Die Herstellung dieser Präparate erfolgt in der Weise, daß man die Seife in einem Kessel schmilzt und das Petroleum, in welchem das Naphthalin vorher gelöst wurde, unter Umrühren zusetzt, worauf man abkühlen läßt. Die derart hergestellte Emulsion hält sich durch Monate hindurch. Zum Gebrauche löst man 1 kg in 100 l Wasser und besprüht die Pflanzen damit. Diese Behandlung ist sehr wirksam gegen Blattläuse und andere Pflanzenschädlinge. Auch bei Tieren ist eine Abwaschung mit einer Lösung dieser Emulsion von gutem Resultat, um dieselben von den Parasiten zu befreien.

## 26. Insecticide liquide (flüssiges Insektenvertilgungsmittel).

Dieses in Flaschen in den Handel kommende Präparat stellt nach vorgenommenen Untersuchungen eine gelbliche, beim Schütteln schäumende und stark alkalisch reagierende Flüssigkeit dar, die nach Melissenöl riecht. Die Trockensubstanz beträgt 11.9% und der Nischenrückstand 2.9%. Erstere enthält nach Abzug der mineralischen Be-

standteile etwa 9% Seife und ganz unerhebliche Mengen eines narkotischen Stoffes, der als Nikotin bezeichnet werden kann.

## 27. Krämers Plantol I

a) besteht aus Mineralöl, Harz, Pottasche, Harzseife und Wasser, während

## Plantol II

b) an Stelle des Mineralöles flüchtige Steinkohlenteeröle und wahrscheinlich auch geringe Mengen ätherischer Öle enthält.

28. Mittel zum Töten von Pilzen auf Kulturpflanzen aller Art von Pierre Ducaniet und Société S. Gonthiere & Cie., Paris.

Die Herstellung des Mittels geschieht in der Weise, daß man einer Lösung von Kalziumcyanid ( $\text{CN} \cdot \text{Ca}$ ) eine äquivalente Menge eines Kupferosalzes, wie Sulfat, Nitrat, Azetat, Chlorid usw. zufügt. Es bildet sich dann neben dem entsprechenden Kalziumsalz ein flockiger, braunschwarzer und sehr leichter Niederschlag von Kupfercyanamid. Es ist vorteilhaft, überschüssiges Kupferialz anzuwenden, damit die erhaltene Kupferbrühe zwei wirksame Bestandteile hat, ein unlösliches Kupferialz in Form von Kupfercyanamid und ein lösliches in Form von Nitrat, Sulfat, Azetat usw.

29. Parajitol zur Vertilgung von Insekten und Schmarotzern auf Pflanzen.

Man vermischt

100 kg grünes Sulfurölivenöl, das vermöge seiner Herstellungsweise immer noch etwas Schwefelkohlenstoff enthält, unter beständigem Umrühren bei 32—40° C mit

10 kg Nohnaphthalin. Nach vollständiger Lösung wird das ganze durch ein Sieb getrieben, um allenfalls vorhandene feste Teilchen auszuscheiden. Dann wird der Mischung eine Lösung von

2 kg Kreosotöl in

120 kg Kalilauge von 18—20° Bé bei 25° C unter beständigem Umrühren zugeetzt und mit dem Rühren so lange fortgefahren, bis völlige Verseifung erzielt ist. Die auf diese Weise erhaltene Seife bildet eine dicke, in Wasser vollständig lösliche Flüssigkeit, welche sich lange Zeit unverändert hält, ohne daß Naphthalin oder Kreosotöl sich auscheiden. Die Wirksamkeit des Parasitols gründet sich teilweise auf den Seifengehalt, hauptsächlich aber auf den Gehalt an Naphthalin, Kreosot und Schwefelkohlenstoff, welche, ohne die Pflanzen ungünstig zu beeinflussen, Insekten und Schmaröcker sicher vernichten. Behufs Anwendung wird das Parasitol mit 90—96% Wasser vermischt auf die Pflanzen aufgespritzt oder mittels Zerstäubers aufgebracht; es haftet sehr gut und wird von Niederschlägen nicht leicht weggewaschen.

### 30. Pyrethrum-Seifenextrakt gegen Heu- und Sauerwurm der Neben.

Man löst

45 Gewichtsteile Schmierseife, gelbe oder grüne, in 1500 Gewichtsteilen Wasser auf, bringt auf

22 Gewichtsteile Pyrethrumpulver so viel von der Seifenlösung, daß beim Durcharbeiten ein dünnflüssiger Brei entsteht und verdünnt diesen nach und nach, bis man 200 Gewichtsteile Seifenlösung einverleibt hat. Die Mischung wird mittels Spritze oder Zerstäubers aufgebracht. Für besonders kräftig wirkende Präparate kann der Gehalt an Schmierseife selbst bis zu 5% betragen.

### 31. Quassiaholzextrakt.

Quassiaholz findet schon seit langer Zeit als Mittel gegen verschiedene Insekten, so insbesondere Fliegen, Mücke usw.

Anwendung, und zwar immer die Abkochung desselben in Wasser. In der neueren Zeit ist die Abkochung auch gegen Pflanzenläuse, Milben, Raupen und auch gegen Neben-  
schädlinge verwendet worden, zumeist mit Seife, dann auch mit Petroleum und Karbolsäure kombiniert.

a) Nach Witehead (gegen die Hopfenlaus):

1 Gewichtsteil Quassiaholzspäne wird mit  
100 Gewichtsteilen Wasser tüchtig gekocht, dann  
24 Stunden stehen gelassen, die durchgeseigte Flüssigkeit  
mit einer Lösung von

1 Gewichtsteil Schmierseife in  
100 Gewichtsteilen Wasser gemischt.

b) 4 Gewichtsteile Quassiaholzspäne,

3 » weiche Seife,

500 » Wasser. Gegen die Knospengallmilbe.

c) Nach Klein (gegen Blatt- und Blutlaus):

α)  $7\frac{1}{2}$  Gewichtsteile Quassiaholzspäne,

50 » Wasser.

β)  $12\frac{1}{2}$  Gewichtsteile Schmierseife,

50 » Wasser. Bei Gebrauch werden

gemischt:

1 Gewichtsteil Quassiaholzextrakt,

1 » Seifenlösung mit

8 Gewichtsteilen Wasser oder

10 Gewichtsteile Quassiaholzextrakt,

0·6 » Seifenlösung mit

8·4 Gewichtsteilen Wasser.

Wie man ersieht, handelt es sich um verschiedene Kon-  
zentrationen und Mengenverhältnisse zwischen Quassiaholz-  
spänen und Seife.

d) Nach Gardeners »Chronicle«:

α) 1·5 Gewichtsteile Quassiaholzspäne,

20·0 » Wasser.

β) 0·9 Gewichtsteile weiche Seife,

100·0 » Wasser,

0·7 » Petroleum.



e) Spritzmittel gegen Raupen:

0·5 kg Quassiaholzspäne,  
0·6 kg weiche Seife,  
0·4 kg Karbolsäure,  
110·0 kg Wasser.

f) Nach Gilardi (gegen den Heu- und Sauerwurm):

$\frac{1}{2}$  Gewichtsteil Quassiaholzauszug,  
 $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  „ Karbolsäure,  
100 Gewichtsteile Wasser.

32. Rubina, Mittel gegen Blattläuse, Milben-  
spinnen usw.

100 Gewichtsteile Holzteer und

100 „ Natronlauge von 25° Bé werden andauernd zusammen erhitzt, bis der Holzteer emulgiert ist. Behufs Verwendung wird das Gemisch in der 25- bis 50fachen Menge Wasser gelöst und mittels Zerstäubers auf die Pflanzen gebracht. Auch kann man behufs Erzielung einer noch besseren Verteilung des Teeres im Wasser Schmierseife, zur Erhöhung der tötenden Wirkung auf Insekten auch Petroleum hinzufügen. Für die Vernichtung niederer Pilze genügen Teeremulsionen, welche neben  $1\frac{1}{2}\%$  Alkali nur  $\frac{1}{2}\%$  Teer enthalten.

33. Mittel, um Vögel, Mäuse usw. von Obstbäumen  
abzuhalten.

In Frankreich wendet man nachstehendes Mittel an: Alle Samen mit harter Schale kommen vor der Ausfaat in ein Gefäß, welches mit Bleimennige gefüllt ist (jedenfalls in mit einem Bindemittel versehener Form) und werden damit gehörig angefeuchtet. Kein Vogel, keine Ratte oder Maus, kein Insekt berührt solcherart behandelten Samen.

## Mittel gegen pflanzliche Schädlinge.

### Bekämpfung des Hederichs.

Von Ritter in Damerow bei Rostock sind in den letzten drei Jahren Versuche zur Bekämpfung des Hederichs mit Kalkstickstoff ausgeführt worden, wonach der Kalkstickstoff eine ähnliche Wirkung gehabt hat, wie das Bespritzen der Felder mit Eigenvitriollösung. Ganz junge Hederichspflanzen werden durch beide Mittel zum Absterben gebracht, größere Pflanzen aber nicht, jedoch unterdrückt, so daß sie von den Kulturpflanzen überwachsen werden. Freilich ist der Erfolg gering, oder auch ganz ausgeschlossen, wenn der Hederich bei der Anwendung der genannten Mittel schon vor oder in der Blüte steht. Die beste Zeit zur Bekämpfung ist dann, wenn der Hederich das dritte bis vierte Blatt hat. Um den Kalkstickstoff leicht mit der Kugmannschen Maschine »Westfalen« ausstreuen zu können, vermengte Ritter denselben mit Sand. Er streute auf 1 ha 70 kg Kalkstickstoff. Der Erfolg war ein guter, der Hederich wurde unterdrückt, der Kalkstickstoff wirkte düngend und nicht schädlich auf den Hafer. Während des ersten Wachstums des Sommergetreides herrschte warmes, regnerisches Wetter in allen drei Versuchsjahren, so daß Ritter über die Ergebnisse bei trockener Witterung kein Urteil abgeben kann.

### Mittel gegen die Herbstzeitlose.

Die Herbstzeitlose ist nicht nur, weil sie unnützen Platz einnimmt, sondern auch wegen ihrer giftigen Eigenschaften als ein schädliches Unkraut zu betrachten. Als Mittel zu ihrer Vertilgung lassen sich hauptsächlich die folgenden drei anführen: Man bricht die Wiese auf, nimmt das Land einige Jahre unter den Pflug und legt es dann wieder zu Gras nieder. Daß der Zweck vollkommen erreicht wird, ist sicher, denn auf Ackern kommt sie nie vor, sondern immer nur auf Wiesen, Weiden und solchen Pflanzungen, die keine

Bearbeitung zulassen oder erhalten. Indessen entschließt man sich nicht gerne zum Ausbruch einer Wieje und es dürfte daher, wenn dieses Unkraut nicht schon die ganze Wieje bedeckt und der Ertrag derselben auf Nichts gesunken ist, eines der beiden nachgenannten Mittel vorzuziehen sein. Man sticht jede Pflanze im Herbst, wenn sie blüht oder auch im Frühjahr samt der Wurzel aus, was mit einem langen Messer oder mit einem besonderen Instrument, einer Art Erdborher geschieht. Das Verfahren scheint zeitraubender und mühsamer als es wirklich ist und ein Teil des Aufwandes kann sogar noch durch den Verkauf vermindert werden.

Man läßt im Frühjahr, sobald die Blätter der Pflanze etwa Handlänge erreicht haben, sämtliche Pflanzen ausraufen. Bei diesem Verfahren bricht zwar der Stengel der Pflanze oberhalb der Zwiebel gewöhnlich ab, aber die Hauptzwiebel verfault oder verdorrt im Boden und es zeigen sich im Spätjahre keine Blumen mehr. Wiederholt man nun dieses Verfahren durch zwei Jahre, so kann man versichert sein, daß bald das gänzliche Verschwinden dieser Pflanzen herbeigeführt wird. Auch kann dieses Mittel dem Ertrag der Wieje, da das Gras um diese Zeit erst etwa 9 cm lang ist, nicht schaden. Andere in Vorschlag gebrachte Mittel bestehen darin, daß man entweder im Herbst jeden Morgen, sobald die Blüte der Herbstzeitlose sich zeigt, sie abreißt, um die Befruchtung zu verhüten, oder im Herbst vor der Heuernte die Samenkapseln abpflückt, wodurch die alten Pflanzen allmählich absterben und eine neue Besamung verhindert wird; oder man mäht zu diesem Zweck die ganze Wiesenfläche vor der Samenreife dieser Pflanze, also früher als gewöhnlich ab. Indessen scheinen die letzteren Mittel, da sie auf jeden Fall mehrere Jahre hindurch fortgesetzt werden müssen, nicht ohne ziemlichen Kostenaufwand und Verlust an Heuertrag ausführbar zu sein. Um endlich das Aufkommen dieses Unkrautes auf Wiesen, welche frei davon sind, zu verhindern, muß man sich hüten, Dünger oder Kompost, unter welchem sich Samen dieser Pflanzen be-

finden, auf die Wiesen zu bringen. Ebenjowenig darf man den Heubodenabfall oder sogenannte Heublumen, wenn solche viel von diesem Samen enthalten, zum Aufstreuen auf die Wiesen benützen.

### Mittel gegen den Kartoffelpilz.

Dr. von Weinzierl gibt für die Bespritzung des Kartoffelkrautes, um den Kartoffelpilz zu bekämpfen, die folgenden Vorschriften an.

1. Zur Herstellung der Kupfervitriol-Kalkbrühe sind zu nehmen:

2 kg Kupfervitriol,  
2 kg gebrannter Kalk,

100 l Wasser.

Man verwendet zwei Holzgefäße, am besten gut gereinigte, gebrauchte Petroleumfässer. In das eine dieser Fässer bringt man 50 l Wasser und hängt darin 2 kg Kupfervitriol in einem Säckchen aus engmaschigem Gewebe so auf, daß dasselbe einige Finger breit tief in der Flüssigkeit untertaucht. Über Nacht ist dann die Auflösung vollständig erfolgt. Im anderen Gefäß werden die 2 kg Kalk mit 50 l Wasser abgelöscht und die erhaltene Kalkmilch durch ein engmaschiges Sieb in die Kupfervitriollösung gegossen (jedoch nicht umgekehrt). Die auf diese Weise hergestellte Lösung muß frei sein von festen Bestandteilen, sonst ist eine Verstopfung des Sprickapparates zu befürchten.

2. Mit dem Bespritzen darf nicht gewartet werden, bis das Kraut vollkommen ausgebildet ist und vielleicht gar schon die Krankheit zeigt, sondern mit demselben soll schon begonnen werden, wenn das Kraut zwei Drittel seiner Entwicklung erreicht hat; am sichersten wirkt zwei- bis dreimaliges Bespritzen, und zwar Mitte Juni, beziehungsweise Mitte Juli und Mitte August.

3. Für ein Joch genügen bei einmaligem Bespritzen 500 l Lösung, das ist also 10 kg Kalk, so daß sich der

Bedarf bei dreimaligem Bespritzen auf 30 kg Kupfervitriol und 30 kg Kalk stellt.

4. Das Bespritzen erfolgt bei trockenem Wetter mit der teils tragbaren, teils fahrbaren Peronosporasprize. Für große Felder empfiehlt sich die Syphoniaasprize.

5. Die Leistung ist beiläufig die gleiche wie bei der Heberichbekämpfung, es kann ein Mann in einem Tage etwa  $1\frac{1}{2}$  Joch mit einer Sprize bespritzen.

### Mittel gegen die Klee-seide.

Um die Klee-seide bei ihrem ersten Auftreten zu entdecken, ist große Aufmerksamkeit erforderlich, da sie sich meist erst nach dem ersten Kleeschchnitt bemerkbar macht. Deshalb lasse man, besonders um die Zeit der ersten Fechung die Felder durch einen zuverlässigen Arbeiter begehen und die dem einigermaßen Geübten sofort erkennbaren Seidestellen durch Stöcke bezeichnen. Das sicherste und beste Mittel, die Seide dann zu vernichten, besteht darin, daß man sie nebst dem Klee umgräbt. Kühn empfiehlt zu diesem Zwecke, den Klee an den mit der Seide behafteten Stellen zunächst mit der Sichel abzuschneiden und alles Abgeschnittene wegen der Fähigkeit der abgerissenen Seidenstengel, unter Umständen wieder auf anderen Kleepflanzen weiterzuwachsen, in Säcke zu verpacken und vom Felde zu entfernen. Dann läßt man eine kurze Zeit verstreichen, bis die Seidenflecke sich recht scharf durch die beginnende Neubildung der Ranken abzeichnen. Die Flecke sehen dann wie überspannen aus. In diesem Stadium gräbt man ohne weiteres in schmalen Stichen um, indem man eine kleine Sicherheitszone vom Gebiete des scheinbar nicht befallenen Klees zugibt. Mit der Neusaatauf dem abgelagerten Lande wartet man mindestens etwa vier Wochen, bis sicher alle, auch die weniger tief mit Erde bedeckten Teile der Pflanze abgestorben sind. Es dürfte kaum ein Grund vorliegen, diesem einfachen, billigen Verfahren die vielfach empfohlenen, chemisch wirkenden Mittel vorzuziehen. Unter diesen dürfte Eisenvitriol noch das zweckmäßigste

sein. Man löst nicht weniger als 30 kg desselben in 100 l Wasser auf und begießt damit die Seidenstellen mittels einer Gießkanne mit feiner Brause bei warmem, trockenem Wetter tüchtig, so daß Klee und Seide sicher vernichtet werden. Alle Mittel, welche erst nach der Samenbildung angewendet werden, sind im Erfolg nicht durchschlagend und stellen sich in ihrer Anwendung sehr kostspielig.

Als einigermaßen brauchbar soll hier noch das Abbrennen der Seidenester angeführt werden. Man sichelt die betreffende Stelle in genügend weitem Umkreis ab, füllt in Säcke und verbrennt deren Inhalt an geeigneter Stelle sorgfältigst. Benützt man das Abge schnittene dagegen zu Futterzwecken, so läuft man Gefahr, die Seidekörner, welche nachgewiesenermaßen unbeschädigt den Verdauungsapparat der Tiere passieren können, mit dem Stallmist wieder auf den Acker zu bringen. Die abgesichelte Stelle muß gut mit Häcksel bedeckt, reichlich mit Petroleum begossen und darauf angezündet werden. Es kommt hierbei darauf an, daß das Feuer ein nachhaltiges ist und möglichst auch die auf dem Boden liegenden Samen vernichtet, was sich indessen nur in sehr unvollkommenem Grade erreichen läßt. An Orten, wo Moor- und Heidebrände zu befürchten sind, ist dieses Verfahren nicht verwendbar.

### Mittel gegen den Meltau der Rosen.

Ein gutes Mittel zur Bekämpfung des Meltaus der Rosen ist der Schwefel, aber nur, wenn er rechtzeitig und zweckmäßig angewendet wird. Am vorteilhaftesten ist es, ihn als Vorbeugungsmittel zu gebrauchen und die Rosen zu schwefeln, ehe die Krankheit ausgebrochen ist, denn eine Bekämpfung des Übels ist schwerer, als das Verhindern der Keimung der den Blättern aufliegenden Sporen. Da sich die Zeit des Auftretens der Krankheit nicht genau vorher sagen läßt — in der einen Gegend macht sie sich bereits Mitte Juni, in der anderen erst etwa zu Anfang Juli bemerkbar — so empfiehlt es sich, schon Mitte Juni eine

Schwefelung vorzunehmen. Man verwendet den feinsten gemahlten Schwefel und bringt ihn mittels eines geeigneten Zerstäubers derart auf die Pflanzen, daß diese aussehen, als ob sie mit gelbem Staub bedeckt wären; auch die jungen Triebe soll man so viel als möglich zu treffen suchen. Falls der Schwefel Neigung zum Zusammenballen zeigt, so kann man leicht Abhilfe schaffen, indem man je 5 kg Schwefel mit  $\frac{1}{2}$  kg Kalk kräftig durchmischt. Beim Bestäuben der Pflanzen tritt man nicht dicht an dieselben heran, sondern bleibt etwa 75 cm davon entfernt. Der Schwefel wird dann wie eine feine Wolke sich über die Pflanzen ausbreiten, wodurch in der Regel alle Teile gut getroffen werden. Die Arbeit muß in Zwischenräumen von drei bis vier Wochen, je nach dem Wetter, wiederholt werden, auch ist darauf zu achten, daß, wenn ein Regen den Schwefelüberzug abgewaschen hat, die Schwefelung von neuem auszuführen ist, sobald die Blätter abgetrocknet sind. Auch soll man die Arbeit erst dann beginnen, wenn kein Tau mehr auf den Blättern liegt. Ist die Krankheit bereits ausgebrochen, muß man alle 14 Tage schwefeln, um die Gefahr der Ansteckung gesunder Pflanzen zu verhindern, beziehungsweise zu vermindern und die bereits vorhandene Krankheit einzudämmen.

### Mittel gegen den Mehltau der Reben.

Zur Vorbeugung, beziehungsweise Heilung der Mehltaufrankheit (*Oidium Tuckeri*) hat man baldmöglichst, und zwar während, sowie nach der Blütezeit bei trockenem Wetter, später wiederholt möglichst bei nach vorangegangenen Regen, wieder eintretendem Sonnenschein, feingepulverten Schwefel auszustreuen; der Schwefel wird in einer ganz dünnen Schicht mittels Blasbalges oder der Puderquaste auf alle einjährigen Rebstockteile verteilt und diese Behandlung ist so lange zu wiederholen, als sich noch Mehltau zeigt. Bei sonnigem Wetter muß dies geschehen, weil sich dann unter dem Einflusse des Luftauerstoffes mehr schweflige Säure aus dem Schwefel entwickelt, die das *Oidium* tötet. Zu dick

aufgestreutes Schwefelpulver bewirkt nur schwarzborfige Beerenhautmißbildung und vorzeitigen Beerenabfall. Meltaufranke Blätter sollen abgeschnitten und abgefallene Blätter vom Boden aufgelesen und verbrannt werden.

### Mittel gegen die Mistel.

Die Mistel zieht ihre Nahrung unmittelbar aus dem von ihr befallenen Baume, indem sie ihre Saugwurzeln in das Zellgewebe (Splint) hineinzwängt, darin sich rasch verbreitet und mit diesem geradezu verwächst. So unscheinbar und harmlos auch diese Pflanze dem Beschauer dünken mag, so gefährlich wird sie dem Gastgeber, dem sie allmählich den Saft aus dem letzten Ästchen zieht, ihn so unmittelbar dem Verderben entgegenführend. Die Verbreitung der Mistel erfolgt fast ausschließlich durch Vögel, namentlich die Drosselarten (Krammetsvögel). Die Frucht der Mistel, welche einen Leckerbissen für die erwähnte Vogelgattung bedeutet, besteht aus einer weißen, runden, schleimigen Beere, worin drei bis vier Samenkerne enthalten sind. Letztere durchwandern, da sie eine sehr harte Hülle besitzen, unverändert und mit voller Keimkraft den Verdauungskanal und senken, sobald sie mit dem Kot der Vögel auf die Äste gelangen, wieder die Saugwurzeln in die Rinde, um ihr Vernichtungswerk von neuem in der geschilderten Weise zu beginnen. Im Obstgarten trifft man diese Schmarozer nur auf älteren Apfel-, seltener auf Birn-, niemals aber auf Steinobstbäumen, im Walde auf höheren Tannen, Birken, Eichen usw. In Anbetracht der großen Gefährlichkeit der Mistel für unsere Obstanlagen liegt es auf der Hand, daß es Pflicht eines jeden Obstzüchters ist, diesem Schädlinge ganz energisch an den Leib zu rücken und ihn auf jede nur mögliche Art und Weise auszurotten. So leicht ist dies nun freilich nicht, da sie ein recht zähes Dasein besitzt und ihre Wurzeln tief und weitverzweigt in die Rinde eindringen. Es muß deshalb der ganze Strauch samt der Baumrinde sorgfältig mit einem scharfen Messer ausgeschnitten werden,



wobei man die Saugwurzeln so tief als möglich mit auszuscheiden hat. Die Wundstelle muß dann gut mit Steinkohlenteer, dem zweckmäßig auch etwas Steinkohlensaße beigemischt werden kann, verstrichen werden. Erscheint die Mistel im nächsten Jahre wieder, was sehr häufig vorkommt, so verfährt man in der gleichen Weise. Auf jeden Fall aber hat die Vertilgung zu geschehen, bevor die Beeren reif geworden sind, indem sonst diese durch die Drosseln weitergetragen und so der Ausbreitung dieser Parasiten wesentlich Vorhub geleistet wird.

### Vertilgen von Moos und Flechten an Bäumen.

In ein entsprechend großes Gefäß gibt man

1 Teil Holzasche, dann

1 » gebrannten Kalk und füllt solches dann mit 8 Teilen Wasser, worauf man einige Zeitlang umrührt. Nach etwa einer Woche läßt sich die Flüssigkeit, welche sich immer schnell abklärt, verwenden. Mit Hilfe eines alten Maurerpinzels wird die Flüssigkeit auf die Rinde der mit Moos und Flechten bewachsenen Bäume gestrichen. Kalk und Kali wirken nun zerstörend auf das Moos und die Flechten ein und nach einigen Tagen färben sich die Schmarozer rötlich und fallen ab. Hüten muß man sich vor zu starker Lößung, dies erkennt man daran, daß die Parasiten sich sehr schnell rot färben; zu schwache Lößungen aber sind von ungenügender Wirkung. Das Mittel erweist sich bei jüngeren Bäumen als vortrefflich, ältere Bäume aber werden mit der Baumkrone gereinigt und dann mit Kalk bestrichen.

### Vertilgen des Moojes auf Rasenflächen.

Auf älteren Rasenflächen und vorwiegend an schattigen Stellen bildet sich Moos, und in dem Maße als dieses überhand nimmt, geht der Bestand an Graspflanzen zurück, so daß oft völlig kahle Stellen auf den Rasenflächen ent-

stehen. Diesem Übelstand kann man durch Düngekalk, der im Herbst möglichst fein verteilt auf den Rasenflächen ausgestreut wird, vorbeugen, aber solchen nicht dauernd beseitigen. Weit vorteilhafter und sicherer wirkt Eisenvitriol; die Anwendung desselben geschieht am besten in den Herbst- und Wintermonaten, und zwar für kleinere Rasenflächen, indem man sich eine 10%ige Eisenvitriollösung herstellt, d. h. in einem Liter Wasser 100 g Eisenvitriol auflöst, und mit dieser Lösung mittels einer Gießkanne mit Brause die in Frage kommenden Rasenflächen bespritzt. Sind größere Rasenflächen mit Eisenvitriol zu behandeln, so ist die Verwendung in flüssiger Form etwas zeitraubend und es ist besser den Eisenvitriol in feinpulveriger Form auszustreuen. In letzterer Weise verwendet, rechnet man auf ein Quadratmeter etwa 10 bis 15 g. Es ist jedoch darauf zu sehen, den Eisenvitriol nur in Form eines feinen Pulvers zu verwenden, damit er sich gleichmäßig auf den Flächen verteilt und die Wirkung eine vollkommene wird. In größerem Pulver oder gar in kleinen Körnchen ausgestreut, tritt leicht der Übelstand ein, daß hier und dort Graspflanzen zu stark angegriffen werden und schließlich absterben. Der Erfolg der Behandlung mit Eisenvitriol macht sich schon nach Verlauf von einem Tage bemerkbar, indem das Moos im Rasen vollständig schwarz wird und abstirbt, während die Graspflanzen nicht im geringsten beschädigt werden. Die Behandlung der Rasenflächen mit Eisenvitriol gegen die Moosbildung hat sogar noch den Vorteil, daß die Graspflanzen zu üppigem Wachstum angeregt werden und eine tiefdunkelgrüne Färbung annehmen. Im Sommer ist die Verwendung des Eisenvitriols nicht empfehlenswert, da die Grasnarbe sehr leicht leidet.

#### Mittel zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten auf Pflanzen nach Dr. Rumm.

Das Verfahren besteht darin, daß die Pflanzen mit Kupfer-Zuckerfalk behandelt werden. Die Spritzflüssigkeit

enthält auf je 1 Molekül Kupferjulfat und Zucker 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> bis 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Moleküle zu Pulver gelöschten Kalk. In dieser Lösung ist das Kupfer viel feiner verteilt, als in den sonstigen ähnlichen Präparaten. Es kann daher keine Verstopfung der Sprengapparate eintreten und man kann die Pflanzen viel gleichmäßiger behandeln. Die festen Austrocknungsprodukte sind auf den Pflanzen viel gleichmäßiger verteilt, so daß auf den Blättern das unlösliche Kupfer in viel wirksamerer Form ausgeschieden wird.

### Mittel gegen den Rostpilz auf Spargelfeldern.

Gegen den Rostpilz auf Spargelfeldern hat sich das Aufstreuen von Holzasche bewährt; man verwendet von derselben in feingeseibtem Zustande etwa 250 g auf einen Quadratmeter.

### Mittel gegen den Schwamm (Holz-, Gebäude-, Haus-, Ader- und Mauerchwamm).

Einer der gefährlichsten, wenn nicht der gefährlichste Feind des Holzes in Baulichkeiten ist der unter den vorstehenden Namen bekannte pflanzliche Parasit, eine kryptogamische Pflanze, deren Heimat die Nadelholzwaldungen sind, in denen er sich an feuchten Plätzen, welche dem Licht wenig zugänglich sind, an angefaulten und abgestorbenen Baumstämmen, Wurzelsködern usw. zeigt und in seinem Äußeren den anderen ballenartigen Pilzen ähnlich ist. Die Formen seiner äußeren Erscheinung sind höchst mannigfaltig und weniger von seiner Eigentümlichkeit als von äußeren Umständen bedingt. Die Fortpflanzung erfolgt nicht durch zufällige äußere Umstände, Feuchtigkeit, Nässe, wie viele noch immer glauben, sondern durch Samen, wie bei anderen Pflanzen, die hier Sporen genannt werden. In tiefster Verborgenheit entwickelt sich zuerst ein aus zarten zylindrischen Zellen bestehendes Gewebe, Myzelium genannt, welches bei Pilzen die Stelle der Wurzel, Stengel und

Blätter vertritt. Rasch wächst es empor, klettert sich an altes Holz, wächst ohne einen bestimmten festen Typus, wie er sonst bei Pflanzen wahrnehmbar ist, sondern richtet sich, wie schon erwähnt, nach der Beschaffenheit der ihn umgebenden Räumlichkeiten, verbreitet sich in groben spinnenwebartigen Fasern über Holz- und Mauerflächen bis zu 70 bis 100 cm Länge, mit Neigung zu fächerartiger Ausbreitung, dringt dabei in die Zellen, Gefäße und Markstrahlen des Holzes, umspinnt es und löst derart insbesondere das Nadelholz in längliche viereckige Stäbchen oder Stücke auf und verwandelt sie, in einer verhältnismäßig kurzen Zeit, in eine leicht brüchige Masse. Bei örtlichen Hindernissen oder bei Mangel an Flächenraum bilden sich schmale Bänder oder Stränge, welche durch alle Fugen, selbst durch den Mörtel zwischen den Ziegeln, auch in morsche Ziegel dringen, und sich vom tiefsten Keller bis in alle Stockwerke hindurch in verhältnismäßig kurzer Zeit ausbreiten. An einigermaßen geeigneten Stellen sucht er freien Horizont zu gewinnen, um zur Bildung des Fruchtlagers, dem verderblichsten, die Fortpflanzung bewerkstelligenden Stadium zu gelangen, um so gefährlicher, als man dies lange Zeit hindurch gar nicht beachtete. Äußere Umstände üben auch hier großen Einfluß auf die Formen des Pilzes aus, von denen hier nur so viel erwähnt sei, als zum näheren Verständnis erforderlich scheint. Anfänglich im Dunkeln, erheben sich auf den von den Sporen bewohnten Stellen rundliche, warzenartige, besonders fästige, erbsengroße oder auch größere Flecken, welche nebartige Aldern bilden, sich in der Mitte verstärken und schon Samen oder Sporen entleeren. Allmählich vergrößern sich diese neartigen Stellen, fließen zusammen und bilden rundliche Flächen, die eine große Menge zimtbrauner Sporen absondern. An dem bandförmig zwischen dem Holzwerk schnell vordringenden Myzelium entsteht ein dickeres Fruchtlager, das sich anfänglich als eine wie von einem schimmelartigen zarten Flaum überzogene Masse darstellt, dann sich gelblich-rosenrot färbt, mit mächtigen fästigen Rändern und An-

deutungen konzentrischer Kreise versehen ist. In ihrer Mitte entsteht ebenfalls eine nekartige, auch mit Sporen erfüllte Schicht, welche die Wissenschaft mit dem Namen Hymenium bezeichnet. Beim Berühren verfärbt es sich, wird fast augenblicklich weinrot, später schmutziggelblich, endlich schwarz. Die Sporen, von äußerst geringer Größe, sind zimtbraun gefärbt und werden bei der Reife mit einer fast unglaublichen Kraft meterweit hinweggeschleudert, so daß man oft ziemlich ausgedehnte Räumlichkeiten mit ihnen bedeckt findet. In diesem Zustande der Reife sondert das Fruchtlager eine anfänglich wasserhelle, später milchartige, trübe Flüssigkeit von widrigem Geschmack ab, die noch nicht chemisch untersucht worden ist.

Dieser abtropfenden Flüssigkeit verdankt der Schwamm die Bezeichnung *Merulius lacrymans*, Tränenschwamm. Die Flüssigkeit arbeitet gleichsam die Weiterverbreitung durch das fortwährende Befechten des Holzes vor, indem sie dessen Zersetzung und die Herrichtung eines geeigneten Nährstoffes befördert. Zieht sich das Myzelium mittels sehr geeigneter feiner Fäden ins Innere des Holzes weiter, es durchdrängend und zersetzend, so nennt man dieses Vorkommnis gewöhnlich Trockenfäule.

Die Vegetation des Schwammes dauert stets so lange, als überhaupt noch gesunde Holzteile, welche ihm zur Nahrung dienen können, vorhanden sind; er stirbt erst dann ab, wenn zerstörbares Holz nicht mehr vorhanden ist. Er zieht seine Nahrung also aus dem Holze und zerstört dasselbe dadurch, wobei sich Kohlensäure entwickelt und dem Holze Wasser entzogen wird; welches vorher mit dem nicht oxydierten Kohlenstoff der Holzfaser verbunden gewesen ist. Es beschränkt sich indessen der Einfluß des Pilzes nicht auf die Vermehrung der Kohlensäure und auf die Verminderung des Sauerstoffes, sondern er zerlegt auch, indem sein Fruchtwasser als Ferment eine Art künstliche Fäulnis oder Gärung einleitet, die seinem Einflusse unterliegenden organischen Körper in die Spaltungs- und Endprodukte ihres Zerfallens, wie Kohlenwasserstoffe, Ammoniak, Kohlensäure und Wasser.

Die Ausscheidungen und Ausdünstungen dieser Pilze, welche einen feuchten, modrigen, leichenartigen Geruch verbreiten, sind für die Gesundheit höchst nachteilig und können sich infolge derselben nervöse Zustände, wie Kopfschmerz und Schwindel, dann Affektionen der Schleimhäute des Halses, Fieber usw. bilden.

Die Grundbedingung für die Entstehung des Hauschwammes und auch dessen Weiterverbreitung ist die Feuchtigkeit. Ist man imstande, der Einwirkung dieses Agens zu begegnen, so verhindert man die Bildung und zerstört den Fortschritt des Schwammes. Diesem Gesichtspunkt hat man lange Zeit hindurch nicht die erforderliche Aufmerksamkeit geschenkt und es blieben daher viele der Mittel, die man in Vorschlag und in Anwendung brachte, erfolglos. Hat sich der Schwamm schon eingefunden, so läßt er sich am sichersten dadurch vertilgen, daß man alle von demselben befallenen Teile des Holzes, Mauerwerks usw. aus dem Gebäude entfernt und durch neue ersetzt und wenn es angeht, durch Zugöffnungen unter den Fußböden in den Mauern, welche unter Umständen auch mit Schornsteinröhren in Verbindung gesetzt werden, die beständige Zirkulation der Luft herbeizuführen sucht. Luftzug und Sonnenlicht sind die besten Mittel zur Vertilgung des Holzschwammes, nachdem die vom Schwamm ergriffenen Stellen ausge schnitten und mit Chemikalien behandelt wurden.

Alle in Vorschlag gebrachten Chemikalien lassen sich nur dann mit mehr oder weniger Erfolg verwenden, wenn der Pilz noch nicht in das Holz eingedrungen ist. Erfolgt die Anwendung erst nach der Bildung des Fruchtlagers, so helfen diese Mittel nicht, da in diesem Stadium das Holz bereits durch den eingedrungenen Pilz zerlegt worden ist. Die Benützung der verschiedenen in Anwendung gebrachten Mittel wird nur dazu dienen, die Weiterverbreitung des Pilzes von einem Holzstück auf das andere zu verhüten. Nach Göppert läßt sich das aus dem infizierten Holz kommende Myzel viel besser durch Verbrennen mit einer Fackel als mittels Chemikalien vernichten.

Malenkovics (Mitteilungen über Gegenstände des Artillerie- und Geniewesens 1904) nennt neben dem *Merulius laerimans* und anderen *Merulius*-arten insbesondere die folgenden Holzschwammarten:

*Polyporus vaporarius* und verwandte Arten insbesondere in Weinkellern, Unterständen aus Holz, Holzstöcken, auf Nadelholzbaumstrünken (unter der Rinde an den eisblumenartigen oder netzförmigen Verzweigungen leicht erkennbar);

*Polyporus ignarius*. falscher Feuerichwamm, auf Laubholz, besonders Eichen, häufig im Freien auf Geländern;

*Daedalea quercina*. auf Laubholz, besonders der Eiche (Balken, Türpfosten und Gebäuden), im Freien unter Brücken häufig;

*Trametes odorata* und *Tr. radiciperda*, auf Fichten- Kiefern- und Tannenholz (Balken, Brettern);

Kortiziumarten (sollen auf demselben Stückholz wie der echte Hauschwamm neben diesem vorkommen);

*Psathyrella disseminata* (*Agaricus disseminatus*) im Freien auf alten Stämmen, in Weinkellern auf Holz, Mauern und Weinsläschen in Form einer dunkelbraunen Watte umhüllend;

*Agaricus melleus* mit eßbarem Fruchtträger (in Wien Hallimajsch genannt), auf lebenden Baumstrünken, Eisenbahn-schwellen, Grubenhölzern, hölzernen Brunnenröhren usw. Von diesem Pilz befallenes Holz leuchtet im Dunkeln.

*Paxillus acheruntus* auf feuchten Kellerdecken, dann unterhalb der Dielen.

Lenzitesarten, ein wichtiger, sehr oft vorkommender Holzzerstörer, der oft auf Planen und auf Nadelholz zu finden ist, welches im Freien (auf Holzplätzen usw.) lagert. Auch unter Brücken ist er sehr oft wahrnehmbar. Sein Fruchtträger (Hut) bildet meist Konsolen auf dem Holz und ist im Herbst leicht zu finden. In Gebäuden kommt dieser Pilz an Fenster- und Türstöcken, dann auf dem Dachgehölz vor und ist durch hohen Harzgehalt ausgezeichnet.

*Lentius squamosus*, auf Nadelholz, auf Bauholz, in Gebäuden fest.

Die dem *Polyporus* angehörenden Löherspizze wachsen an lebenden Bäumen, so *P. fomentarius* L. an Bächen (liefert den Feuerichwanm), *P. igniarius* Fr. an Weiden, Obst- und anderen Bäumen (Weidenichwanm, unechter Feuerichwanm), *P. officinalis* Fr., *P. laricis* Jacq. (Lärchenichwanm für Zunder verwendet), die wenig schädlich sind.

Der Wurzelichwanm ist ein sehr gefährlicher Parasit unserer Waldbäume, und zwar für Kiefern, Fichten, Tannen, Wacholder usw., welcher sowohl an jungen Pflanzen wie an alten Stämmen, besonders aber häufig in Kiefernstangen auf altem Ackerboden vorkommt. Das Myzel des Wurzelichwanmes zerstört zunächst die Wurzeln und steigt in die unteren Stammesteile, bei der Kiefer nicht über Stockhöhe, bei Fichten höher empor und erzeugt Rotfäule. Das zersekte Holz ist an den weißumrandeten schwarzen Punkten zu erkennen. Sobald die wasserführenden Gewebe getötet sind, werden die Pflanzen blaßgrün und sterben endlich ab. Bräunliche, heller veränderte, gezonte, krusten- oder konjolförmige Fruchtträger treten an den Wurzeln oder an dem oberirdischen Wurzelstock auf. Außerdem ist der Wurzelichwanm an den zarten, weißen Myzelhäutchen zwischen den Rindenschuppen zu erkennen. Aus der Rinde der erkrankten Stämme tritt gewöhnlich Harz aus.

Zur Bekämpfung des Wurzelichwanmes wird das Ausziehen, auch Verbrennen der befallenen jungen Pflanzen, der Aushieb der erkrankten Stämme, Roden und Verbrennen oder Überroden der Stöcke, ferner Einmischen von Laubhölzern in die befallenen Bestände oder vollständiges Ersetzen der Nadelhölzer durch sie auf den gerodeten Stellen empfohlen.

Die Mittel, welche zur Beseitigung des Hausichwanmes empfohlen und angewendet wurden, sind außerordentlich zahlreich, es seien hier genannt: Anwendung von heißem Sand, Aufstreuen von gebranntem Kalk, Weizen aus Schwefel-



Salpetersäure, Salpetersäure, salpetersaurem Quecksilber, Alaun, Chlorkalk, Eisen- und Kupfervitriol, Kochsalz, Kochsalz mit Holz- oder Torfasche gemischt, dann holzessigsaures Eisen, hydraulischer Kalk, Kreosot, Petroleum, verschiedene als Mykothanaton und Antimerulion bezeichnete Präparate, mit Kochsalz und Bor säure imprägnierte Infusorienerde, Teer usw.

Professor Sorokin, der sich eingehend mit der Vertilgung des Hauschwammes befaßte, ist zu folgenden Resultaten gekommen:

1. Zugluft vertilgt den Hauschwamm binnen 24 Stunden: die Versuche wurden in einem Treibhause vorgenommen und schon nach 24 Stunden war der Hauschwamm eine verdorrte runzelige braune Masse.

2. Luft ist ebenfalls geeignet, den Schwamm zu töten; wird derselbe gleichzeitig der Einwirkung des Lichtes und des Luftwechsels ausgesetzt, so vertrocknet er binnen wenigen Stunden.

3. Das Benetzen des Holzes mit Kochsalzlösung verhindert das Auftreten des Holzschwammes; je konzentrierter die Lösung, um so nachhaltiger ist die schützende Wirkung. Besonders konzentrierte Kupfervitriollösung übt eine noch kräftigere Wirkung aus; Karbolsäure tötet den Schwamm sehr schnell.

4. Gewöhnlicher Birkenteer ist ein sehr wirksames Mittel gegen den Hauschwamm, durch Bestreichen der Balken, der inneren Fläche der Fußbodenbretter mit demselben wird fast sicher dem Auftreten des Schwammes vorgebeugt, die große Billigkeit des Materials und die Einfachheit seiner Anwendung machen den Birkenteer zu einem der bequemsten und billigsten Mittel zur Vertilgung des Hauschwammes.

Eine Reihe von Vorschlägen bezwecken bauliche Massregeln, durch welche der Schwamm in Gebäuden überhaupt unmöglich gemacht wird, deren Ausführung aber hier zu weit gehen würde; im allgemeinen soll es genügen, Neubauten vollkommen gegen Schwammbildung zu schützen, wenn man die beim Bau allgemein üblichen Vorsichtsmaßregeln kon-

sequent durchführt und dafür sorgt, daß nur trockener Sties, Schlacken, Infsufriererde als Füllmaterial der Böden, sowie nur trockenes Holz als Bauholz verwendet wird, daß man auf entsprechende Isolierung der Balkenlager usw. sein Augenmerk richtet und, um ja recht sicher zu gehen, das gut trockene Holz mit verdünnten Lösungen von kieselbarem Natron vor seiner Anwendung bestreicht. Über die chemischen Mittel zur Vertilgung des Hausschwammes liegen sehr verschiedene Erfahrungen vor, die zweifelsohne auch mit den Orten, an denen der Pilz bekämpft wurde, in einigem Zusammenhang stehen. Das eine Mittel hat bei einer oder mehreren Verwendungen sich als vorzüglich geeignet gezeigt, an anderer Stelle aber vollkommen versagt. Über die verschiedenartige Beurteilung der Schwammvertilgungsmittel geben die nachstehenden Ausführungen Aufschluß.

Nach S. Langenberger (Der Hausschwamm) erweisen sich von den Mitteln für die Anwendung in der Praxis nur wenige als ziemlich zweckdienlich. So ist z. B. die Wirkung von Afsal eine sehr wenig befriedigende. Durch Versuche im botanischen Institut der königl. tierärztlichen Hochschule in München konnte an einer mit 2½%iger Afsallösung versetzten Nährgelatine noch üppige Pilzvegetation festgestellt werden. Antiformin, eine Chlorkalklösung mit Sodazusatz, verliert infolge der unter der Einwirkung von Luft eintretenden Veränderung der Zusammensetzung der Lösung sehr bald seine Wirkung. Im übrigen greift Chlor das Holz stark an. Antimerulion, eine Lösung von kieselbarem Natron, vermag nicht zu verhindern, daß an dem damit behandelten Holz in verhältnismäßig kurzer Zeit wieder Hausschwammbildungen auftreten.

Antinonnin, Orthodinitroresolsalium, kann als das geeignetste Mittel zur Vertilgung des Hausschwammes gelten. Es kommt als gelbfarbige PASTE in den Handel, ist völlig geruchlos, in Wasser leicht löslich und erweist sich in 2—3%iger Lösung als äußerst wirksam zur Vernichtung von Pilzwucherungen. Dasselbe kann in solchen Lösungen mit Vorteil auch bei der Mörtelbereitung Verwendung finden.

zum Schutze gegen Fäulnis, beziehungsweise Schimmelbildungen usw. Karbolineum, das bekannte Steinkohlenteerprodukt, gewährt wirksamen Schutz gegen Fäulnis und Pilzbildungen am Holz, kann aber wegen seines Geruches nicht in allen Fällen angewendet werden. Chlor, beziehungsweise Chlorkalk kann wegen der sich stark entwickelnden Chlorgase für Wohnräume kaum in Betracht kommen; außerdem gilt hier auch das bei Antiformin gesagte. Ferner kann sich infolge Verbindung von Chlor mit Kalk Chlorkalzium, ein hygroskopisches Salz bilden, durch das dem Holz oder dem dasselbe umgebenden Mauerwerk erhebliche Mengen von Feuchtigkeit zugeführt werden können. Formalin ist ein vorzügliches Desinfektionsmittel, wird jedoch infolge von Drydation in verhältnismäßig kurzer Zeit wirkungslos. Wird es in Wohnungen angewendet, so ist für ergiebige Lüftung zu sorgen, da die Formalindämpfe auf die menschlichen Schleimhäute und Atmungsorgane heftige Reizwirkungen ausüben. Kreosot wird in seiner Wirkung gegen Pilzbildungen von keinem anderen Mittel übertroffen, kann jedoch wegen seines starken und anhaltenden Geruches in Wohnungen wenig Anwendung finden. Überdies macht sich auch seine stark ätzende Eigenschaft unangenehm fühlbar. Kupfervitriol wird vielfach zur Bekämpfung parasitärer Pilze mit bestem Erfolge angewendet. Zur Vernichtung des Hauschwammes erweist er sich aber nicht immer wirksam genug, was zum Teil wohl auch darauf zurückzuführen sein dürfte, daß er mit Kalk schwefelsauren Kalk und unlösliche Kupferverbindungen bildet. Kochsalz- und Eisenvitriollösungen können nach den von Hartig angestellten Versuchen ebenfalls nicht als wirksam erachtet werden. An dem damit behandelten Holz zeigte sich nach einigen Monaten neuerliche Entwicklung des Hauschwammmyzels. Mikrokol, eine in Wasser leicht lösliche Masse von grünlicher Farbe, ist schon in 1½–2%iger Lösung geeignet, den Hauschwamm zu vernichten. In solcher Verdünnung ist es auch nahezu farb- und geruchlos. Bei Vorhandensein von Kalk in der Umgebung des Holzes kann

jedoch die im Mikrosol enthaltene freie Schwefelsäure teilweise in schwefeligen Kalk sich umsetzen und infolgedessen das Mittel an Wirksamkeit verlieren. Mineralsäuren, Schwefelsäure, Salzsäure usw. können selbst in sehr großer Verdünnung dem Holze noch beträchtlichen Schaden zufügen. Mykothanoton, als sogenannter Schwammtod angepriesen, zeigte bei den von Hartig angestellten Versuchen, daß nach vorschriftsmäßiger Anwendung des Mittels an Holzteilen diese schon nach wenigen Wochen wieder von Holzwurm ergriffen wurden. Teer erweist sich zwar als ein wirksames, pilztötendes Mittel, verliert jedoch allmählich seine pilztötende Wirkung. Er dringt nur wenig in das Holz ein und kann unter Umständen dem Holz nachteilig werden, weil er das Entweichen von Feuchtigkeit aus diesem verhindert. In Wohnungen kann Teer auch wegen seines Geruches zur Schwammtötung nur beschränkte Verwendung finden. Quecksilberchlorid ist schon wegen seiner giftigen Eigenschaften sowie wegen seiner Flüchtigkeit und der hieraus sich ergebenden Gefahren in größeren Mengen Anwendung zu finden nicht geeignet, keinesfalls aber in den zum Aufenthalt für Menschen bestimmten Räumen.

Malenkovic hat über die Geeignetheit verschiedener Mittel die folgenden Erfahrungen gemacht:

1. Niedrig siedende Phenole sind zur Konservierung nicht geeignet; auch phenolsulfosaure Salze sind nicht brauchbar.
2. Hochsiedende Phenole und  $\beta$ -Naphthol eignen sich.
3. Flüchtige Stoffe, z. B. Formaldehyd, sind in der Regel nicht geeignet.
4. Chlorzink und Kupfervitriol sind schlechte Holz-konservierungsmittel.
5. Alle Fluorverbindungen sind geeignet, vor allem aber die freie Flußsäure, weniger die freie Kieselflußsäure.
6. Kupferverbindungen verdienen vor anderen Salzen keinen Vorzug.
7. Von den im Handel befindlichen Mitteln gegen Holzwurm bewähren sich Antinonin, Antigermine und Antipolypin recht gut, Mikrosol minder, Pinol nicht.

$2\frac{1}{2}\%$ iges Phenolnatrium und  $2\frac{1}{2}\%$ iges Kresolnatrium waren nach 2 und nach 6 Monaten nicht pilzfrei;  
 $2\frac{1}{2}\%$ iges  $\beta$ -Naphtholnatrium nach 2 und nach 6 Monaten pilzfrei;

$2\%$ iges Mikrokol nach 2 und 6 Monaten nicht pilzfrei;

$10\%$ iges Pinol nach 2 Monaten nicht pilzfrei;

$2\%$ iges Antipolypin,  $1\%$ iges Antinonin,  $1\%$ iges Antigermine nach 2 Monaten und nach 6 Monaten pilzfrei;

$2\frac{1}{2}\%$ iges Formaldehyd nach 2 und nach 6 Monaten nicht pilzfrei;

$12\%$ iges Fluorkupfer und  $2\frac{1}{2}\%$ iges Kiejsfluorkupfer nach 2 Monaten nicht pilzfrei, nach 6 Monaten pilzfrei;

$2\frac{1}{2}\%$ iges Fluornatrium,  $2\frac{1}{2}\%$ ige und  $\frac{1}{2}\%$ ige Flußsäure,  $1\%$ ige Kiejsflußsäure nach 2 und nach 6 Monaten pilzfrei;

$\frac{1}{2}\%$ ige Kiejsflußsäure,  $2\frac{1}{2}\%$ iges O-phenolsulfofaures Kupfer,  $2\frac{1}{2}\%$ iges Chlorzink,  $2\frac{1}{2}\%$ iger Kupfervitriol nach 2 Monaten und nach 6 Monaten nicht pilzfrei;

$1\%$ iges Sublimat nach 2 und nach 6 Monaten pilzfrei.

Die Ergebnisse einer großen Reihe von Versuchen mit holzerstörenden Pilzen lassen sich nach Malenkovic's folgendermaßen zusammenfassen:

1. Um gute Wirkungen zu erzielen, soll man mindestens 24 Stunden lang tränken oder dreimal streichen.

2. Stoffe, die gegen Schimmelpilze nichts oder wenig nutzen, helfen auch nicht gegen holzerstörende Pilze (Chlorzink, Kupfervitriol, niedrig siedende Phenole, flüchtige Stoffe, Mikrokol, Pinol usw.).

3. Brauchbare wasserlösliche Holzkonfervierungsmittel sind:

- Antinonin, Antigermine, Antipolypin;
- hochsiedende Phenole,  $\beta$ -Naphthol;
- freie Flußsäure mit oder ohne Zusatz von Fluoriden;
- Sublimat ( $1\%$ ig).

Alle anderen bekannten, in Wasser löslichen Konfervierungsmittel versagen.

In der Praxis muß bei der Anwendung der Mittel mit einem Sicherheitsfaktor gerechnet werden, und es ergibt sich für die einzelnen Lösungen die nachfolgende Tabelle:

Bei 24 Stunden andauernden Tränkungen:

2%iges Antinonnin und 2%iges Antigermine;

5%iges Antipolypin;

5%ige hochsiedende Phenole, 5%iges  $\beta$ -Naphthol;

2,5—5%ige Flußsäure;

5%ige Salze der Flußsäure mit mindestens 1% freier Flußsäure;

1—2%iges Sublimat.

Bei Anstrichen wird man die vorstehend angegebenen Konzentrationen erhöhen müssen, bei der Imprägnierung unter Druck oder bei lang andauernden Tränkungen wesentlich erniedrigen können.

Paraffinieren, Teeren des Holzes sind nicht unter die Mittel zu zählen, welche den Schwamm von dem Holz abhalten oder denselben zu zerstören vermögen.

Neben freier Flußsäure kommt das Fluornatrium, dann passende Mischungen von Fluormetallen in Betracht. Diese letzteren sind allen bisherigen Holzkonservierungsmitteln sowohl an Wirksamkeit, wie auch hinsichtlich der Wohlfeilheit weit überlegen. Weitere Versuche müssen noch endgültig bestätigen, daß Fluorgemische ebensowenig als Sublimat die Anwendung des pneumatischen Verfahrens erfordern und somit ihre Anwendung eine weit einfachere wird, als bei Chlorzink, Kupfersulfat und Teerölen.

Falk, der sich sehr eingehend mit dem Studium des Hausschwammes beschäftigt hat, soll es gelungen sein, ein höchst einfaches Mittel herauszufinden, welches die Vernichtung des Hausschwammes an eingebauten Holzteilen gestattet. Bekanntlich ist die Grundbedingung der Existenz eines jeden Lebewesens, daß an der Stelle seines Gedeihens die physikalischen Voraussetzungen seiner Lebensfunktionen erfüllt sind. Luft, Licht, Wasser, Temperatur sind gewöhnlich die Hauptfaktoren, welche in bestimmter Qualität oder Quantität vorhanden sein müssen und wenn diese Qualität

oder Quantität gewisse durch Forschung zu ermittelnde Grenzen überschreitet, beziehentlich unter denselben bleibt, wird die Existenz des betreffenden Lebewesens in Frage gestellt, bei genügender Überschreitung der Grenzen sogar mit Sicherheit unterbunden. So fand Falt, daß auch der Hauschwamm nur innerhalb ziemlich enger Temperaturgrenzen lebensfähig ist; diese Grenzen ermittelte er zu ungefähr  $-5$  und  $+30^{\circ}\text{C}$ . Außerhalb dieser Grenzen kann sich der Hauschwamm nicht fortpflanzen und geht innerhalb kurzer Zeit vollständig ein. Da es ein leichtes ist, Räume mit gewöhnlichen Mitteln auf  $30^{\circ}\text{C}$  zu heizen, so ist das Verfahren der Hauschwammvertilgung nach Falt's Forschungen äußerst einfach. Bei einem praktischen Heizversuche in einem mit Holzwamm behafteten Raum hat man auch nicht nur das sofortige Ausbleiben muffigen Schwammgeruches konstatiert, sondern auch das Schwinden der charakteristischen fleckenartigen Schwammherde deutlich nachweisen können. Falt wird demnächst mit der Kälte Wirkung der Temperaturen unter  $-5^{\circ}\text{C}$  Versuche ausführen, welche aller Wahrscheinlichkeit nach die Resultate seiner Laboratoriumsforschungen über die Lebensbedingungen des Hauschwammes bestätigen werden.

Klein in Baden-Baden weist mit Rücksicht auf dieses Verfahren darauf hin, daß kurz andauernde Versuchszeiten nicht den Beweis schaffen, daß der Hauschwamm auch tatsächlich zerstört sei und vertritt die Ansicht, daß eine Temperatur von  $40^{\circ}\text{C}$  wohl hinreiche zum Vertreiben des Geruches und zum Austrocknen des Myzeliums, keineswegs aber zur Abtötung der Schwammsporen, die nach seiner Ansicht nach 1 bis  $1\frac{1}{2}$  Jahre keimfähig bleiben. Somit behält das Holz, obwohl geruchlos, doch seine Krankheit, die unter günstigen Bedingungen wieder zum Ausbruch kommen kann. Auch hat das Holz seine Tragfähigkeit verloren, wodurch schwere Unglücksfälle entstehen können. Eine Abtötung der Sporen durch Kälte, wie sie bei einem Auswintern des Baues gegeben ist, hält Klein für ausgeschlossen, da selbst bei  $15^{\circ}$  Kälte die Schwammsporen

feinfähig bleiben. Oberbau-Inspektor Forchner hat einen, allerdings sichtbaren und zutage liegenden Fall von Hauschwamm allein durch die 40 bis 50° C betragende Wärmeentwicklung eines Petroleumofens, der vier bis fünf Tage lang über der infizierten Stelle beständig brannte, zum Absterben gebracht und ist der Überzeugung, daß ein Austrocknen durch Hitze der Schwammbildung Einhalt tun kann. Bis jetzt ist aber leider noch nicht festgestellt, wie lange die Wärmeeinwirkung ausgeübt werden müßte, um von bleibendem Erfolge zu sein, auch nicht, ob nach dieser Behandlung die Schwammsporen noch feinfähig sind oder nicht. Ebenso müßte erst wissenschaftlich festgestellt werden, ob und bei welchem Hitzegrade das Myzel seine Lebensfähigkeit einbüßt. Erst wenn es hierüber feststehende, wissenschaftlich erprobte Regeln gibt, ist die Anwendung von Hitze zur Schwamm-tötung in bestehenden Gebäuden denkbar, da sonst die jedesmalige Feststellung, wie weit die Austrocknung stattgefunden hat, mit allzu großen Kosten verbunden ist.

1. Antifungin, Mittel gegen Hauschwamm.  
Verschieden zusammengesetzte Flüssigkeiten, z. B.:

20 Gewichtsteile Borax,

80        »        Wasser, in verschiedenen Verhältnissen  
in Wasser gelöst.

2. Antipolypin, Mittel gegen Hauschwamm.  
Besteht aus  $\beta$ -Naphthol, Natriumhydroxyd und Fluor-natrium.

3. Kohlfreosole und Kohlphenole, also die wirksamen Bestandteile des Steinkohlenteers werden in Verbindung mit Mineralöl oder einer Seifenlösung ebenfalls zur Vertilgung des Hauschwammes verwendet. Ein solches Mittel läßt sich (nach »Seifensieder-Zeitung«, 1908) folgendermaßen herstellen:

30 Gewichtsteile Trinitrophenole werden in

70 Gewichtsteilen heißen Wassers gelöst und nach dem Erkalten unter beständigem Umrühren langsam mit

40 Gewichtsteilen Natronlauge von 15° Be vermischt.



4. Man erwärmt

100 Gewichtsteile Petroleum auf 30—40°C, dann werden

- |       |   |                                  |
|-------|---|----------------------------------|
| 0·020 | » | Ameisenjäure,                    |
| 0·500 | » | italienisches Steinöl,           |
| 0·050 | » | ätherische Eisenazetatinktur und |
| 1·5   | » | 100%ige Karbolsäure hinzugefügt. |

Die Mischung wird so lange gerührt, bis sie homogen verbunden ist.

5. Nach dem Dänischen Patent Nr. 6318, M. A. M-brechtjen, schützt eine Mischung von

4 Gewichtsteilen Chilisalpeter und

100 » einer gesättigten Kochsalzlösung, das

Holz besonders wirksam. Die Flüssigkeit wird in die Löcher, die zu den Brettern des Fußbodens führen, gegossen.

6. Chlorzink wird ebenfalls empfohlen, und zwar in einer 10%igen Lösung. Der noch bei der Herstellung des Mittels empfohlene Zusatz von 5‰igem Quecksilberchlorid kann nur dort zur Anwendung kommen, wo sich das vom Schwamm befallene Holz nicht in Wohnräumen oder dem Aufenthalt von Menschen dienenden Lokalitäten befindet.

7. Durch vorsichtiges Eintragen von Schwefelsäure in die gleiche Gewichtsmenge rohe Karbolsäure und hierauf folgendes Erwärmen, erhält man Sulfokarbolsäure, die dann in der fünf- bis zehnfachen Menge Wasser gelöst wird. Mit der Flüssigkeit bepinselt man die vom Holzschwamm befallenen Stellen.

8. 40 Gewichtsteile Borjäure,

950 » Kochsalz,

5 » Paraform,

5 » Eisenvitriol werden zusammenge-

mischt in 4000 Gewichtsteile kochendes Wasser eingetragen und die erhaltene Lösung mit dem Pinsel aufgestrichen.

9. 1000 Teile Kochsalz,

50 » Borjäure,

5 » Paraform,

5 » Eisenvitriol, werden in

4000 Teilen Wasser gelöst und die Lösung nach dem Erkalten filtriert.

10. 100 Teile Eisenvitriol,  
100 » Kupfervitriol werden in  
60 Teilen Wasser gelöst. Die Lösung wird filtriert  
und mit 5 Teile rohem Galmey auf einer Farbreibmühle  
verrieben.
11. 70 Teile schwefelsaure Magnesia,  
70 » Bleisalz,  
25 » Bor säure,  
25 » Kupfervitriol,  
25 » Eisenvitriol,  
15 » chromsaures Kali werden in  
2000 » heißem Wasser gelöst und die Lösung  
nach dem Erkalten filtriert.
12. 50 Teile Alaun und  
25 » Kochsalz werden in 100 Teilen Wasser  
gelöst.
13. 10 Teile roher Galmey,  
5 » Natronwasserglas von 40° Bé und  
5 » Wasser werden auf einer Farbreibmühle  
verrieben und die Masse dann mit 30 Teilen Wasserglas  
von 40° Bé verdünnt.
14. 15 Teile Eisenvitriol,  
75 » Kupfervitriol und  
75 » Kochsalz werden in  
150 Teilen Wasser gelöst und die Lösung filtriert.

### Mittel gegen Baumschwämme (Polyporusarten).

Zur Zerstörung von Baumschwämmen, wie solche vielfach an Laub- und auch an Nadelholzgewächsen vorkommen, dann gegen die Rotfäule und Ringscheibe der Kiefer hat sich Antinonin (Orthodinitroresorcin) in selbst noch verdünnten Lösungen als 1:1500 als ausgezeichnetes Mittel bewährt.

## Mittel gegen tierische Schädlinge.

### Mittel gegen Ameisen.

Man schüttet auf die Ameisenhaufen eine angemessene Menge Schwefelkohlenstoff und bedeckt den Haufen dann sofort mit einem dicken Brei aus Lehm und Wasser, um zu verhindern, daß die Dämpfe in die Luft entweichen. Je nach der Größe des Nestes sind 50 bis 500 g Schwefelkohlenstoff oder auch mehr erforderlich. Die Dämpfe dringen in die einzelnen Gänge der Ameisen und ersticken diese dort. Man muß zu der Vertilgung eine bestimmte Zeit wählen, also am besten die frühe Morgenstunde nach einem warmen Tage und einer klaren Nacht. Aus den vorhandenen Eiern kann auch nach dem Töten der Ameisen eine junge Brut auskriechen; deshalb muß man dafür sorgen, daß die Schwefelkohlenstoffdämpfe längere Zeit in der Erde bleiben oder man muß die Vertilgung sofort nach dem Erscheinen der jungen Ameisen wiederholen. In Häusern lassen sich die Ameisen vertilgen, wenn man in die Nester etwas Schwefelkohlenstoff schüttet oder spritzt und dieselben dann mit Lehm verschließt.

Um Ameisen von Obstgärten, denen sie durch Anfressen der jungen Triebe, Blütenknospen und der Früchte schädlich werden, abzuhalten, empfiehlt Obstzüchter Daiben, die Bäume mit Rauche zu bestreichen und diese schien auch zu wirken, jedoch nur kurze Zeit, denn wenn dieselbe abgetrocknet war, verschwand auch der Geruch und die Ameisen waren zu Hunderten wieder zur Stelle. Auch andere Mittel blieben erfolglos, nur eines hat sich als probat gezeigt: die Bestreichung des Stammes mit Kreide. Der Baum, ob jung oder alt, wird am Stamm an möglichst glatten Stellen mit Kreide überfahren, desgleichen der Baumpfahl unterhalb des Bandes und sofort verschwindet das schädliche Ungeziefer, ohne sich wieder einzufinden. Die Ameisen machen, wie die Erfahrung lehrt, alle möglichen Versuche, um über die mit der Kreide bestrichenen Stellen zu kom-

men, doch die einen fallen wie betäubt gleich herab, die anderen, an den Füßen mit Kreidestaub beschwert, können nicht mehr kriechen, fallen ebenfalls ab und nach einigen Tagen ist das ganze am Fuße des Baumes in lockerer Erde versammelte gewesene Heer von Ameisen verschwunden.

Die Säuberung der Gartenbeete von Ameisen gelingt am vollkommensten in folgender Weise: Etwa über die Mitte des Baues stülpt man einen leeren größeren Blumentopf, der einiges loses Laub enthält und dessen Abzugloch verstopft wurde. Nun begießt man dessen Umgebung wiederholt und durchdringend mit einer Brause. Um dieser unliebsamen Überschwemmung zu entgehen, sucht der größte Teil der Ameisen Zuflucht unter dem trockenen Topf und wird dort durch Überbrühen mit heißem Wasser leicht getötet.

Man mischt in einer Schale Honig mit Pottasche und stellt solche dort auf, wo die Ameisen sich aufhalten. Schon nach kurzer Zeit werden Ameisen nicht mehr zu sehen sein. An Stelle von Pottasche kann man auch Seife oder Hirshhornsalz verwenden.

Nach Dr. Gordan hat mehrfaches Besprengen der durch Nissen in ein Gartenhaus eingedrungenen Ameisen mit größeren Mengen Kreolin und Spiritus keinen merklichen Erfolg gezeigt, während einmaliges Besprengen mit verdünnter Formalinlösung (1:10) ganz vorzüglich wirkte. Binnen kurzem gingen die Ameisen zugrunde, sie wurden dann zusammengekehrt und verbrannt; nach 14 Tagen zeigten sich die Tiere wieder vereinzelt, wahrscheinlich durch eine nichtbespritzte Lücke eingedrungen. Nach nochmaligem Besprengen mit verdünnter Formalinlösung blieb das Gartenhaus von Ameisen frei. Es ist anzunehmen, daß es auch in Gärten usw. gelingt, die Ameisen mit verdünnter Formalinlösung zu vernichten. Dort müssen dann die Haufen aufgegraben und die Formalinlösung in dieselben hineingegossen werden. Auch verdünntes Petroleum soll sich mit Erfolg verwenden lassen.

# Imprägnierflüssigkeit, um Holz vor Ameisen zu schützen.

Es werden zusammen verkocht:

5	Gewichtsteile	Kupferazetat,
30	»	Asa foetida,
3	»	Arjenit,
10	»	Aloe,
10	»	Ruß,
10	»	Kalk,
10	»	Milch,
1000	»	Wasser mit

1000 Gewichtsteilen gemahlenen Treibern von Senfkorn und die Masse auf das zu schützende Holz aufgestrichen.

## Mittel gegen Bienen und Wespen, gegen deren Angriffe auf Obst.

Man ist vielfach geneigt, die Bienen als Obstschädlinge anzusehen, da dieselben tatsächlich das Obst wegen seines Zuckergehaltes aufsuchen und solches aufzehren, doch hat man Zweifel gehabt, ob gesundes Obst von denselben angefressen wird. Wie die »Amerikanische Bienen-Zeitung« berichtet, wurden im Laufe der letzten Zeit Versuche gemacht, um zu ermitteln, ob Bienen dem Obst wirklich Schaden zufügen können, und diese mit der größten Genauigkeit ausgeführten Untersuchungen ergaben, daß Bienen gesunde Früchte niemals angreifen, sondern daß sie nur an schon beschädigte Früchte gehen. Zu dem Zwecke wurden gleichstarke Bienenvölker gewählt, deren Aufsatz in drei gleiche Teile geteilt wurde. In die erste Abteilung wurden gesunde, unbeschädigte Früchte gelegt, in die zweite beschädigte und in die dritte gesunde Früchte, die man in Honig getaucht hatte und die mit demselben vollständig bedeckt waren. Die Bienen machten sich sofort über die beschädigten und die von Honig triefenden Stücke her. Nach sechs Tagen wurden die Stöcke untersucht. Die beschädigten Früchte

waren bis auf die Schalen, die in Gänze in ihrer Form erhalten blieben, aufgezehrt, die mit Honig bedeckten waren sauber abgeleckt, aber vollständig gesund, nicht angegriffen, wie auch die gesunden ganzen Früchte in der ersten Abtheilung. Solche gesunde Früchte wurden auch um den Bienenstand herum aufgehängt, aber von den Bienen gar nicht berücksichtigt, da sie eben nicht imstande waren, sie anzubeißen. Der Wert dieser Ergebnisse wird noch durch die Tatsache erhöht, daß gerade während der Beobachtungszeit die natürlichen Honigquellen gänzlich versiegt waren. Einige Bienenvölker wurden sogar ihrer Vorräte beraubt, um die Versuche noch schlagender zu gestalten, aber die Bienen verhungerten, während die köstlichsten Früchte in ihrem Honigraum lagen. Die dünne Schale des Obstes bildete ein für Bienen unüberwindliches Hindernis. An den Weinhalden und auf den Obstäumen sind es die Vögel, welche die schönsten Früchte anbeißen und dann die Überreste den Bienen und Insekten überlassen.

Weissen und Hornisse werden besonders den feinen süßen Früchten, welche sie anreifen und den Bienenstöcken, die sie ihres Honigs berauben, nachtheilig, kommen auch zuweilen in Lagerräume und greifen Zucker und andere Süßigkeiten an. Dagegen töten sie aber auch Fliegen und andere Insekten. Die Weissen hängen ihre Nester am liebsten an die Balken oder Dächer von Gebäuden, sowohl im Innern als auch außen, doch oft auch an Baumstämmen im Freien auf oder machen sie unter der Erde. Die Hornisse dagegen wählen lieber die Höhlungen in alten Bäumen, aber auch Strohdächer. Besonders rätlich ist es, im Frühjahr diejenigen zu töten, welche den Winter in Löchern zugebracht haben, neue Nester bauen und Eier legen. Sie halten sich dann viel auf Holzgeländern auf, wo sie die feinen Fasern und Spänchen zum Bau ihrer Nester holen. Auch später ist es noch nützlich, sie einzeln zu töten, da die Jungen in den Nestern verhungern müssen, wenn die Alten getötet sind. Aber auch in den Nestern selbst kann man sie zur Vertilgung auffuchen, sofern man sich nur

durch Bienenkappen und Handschuhe oder auf sonst andere Weise gegen ihre Stiche zu schützen weiß. Am besten ist es, hierzu die Zeit der Dämmerung oder einen regnerischen Tag zu wählen, wo die wenigsten in den Nestern fehlen. Der Nester, die an erhabenen Gegenständen befestigt sind, entledigt man sich am besten, indem man einige Male hineinschießt oder sie ablöst und in einem Sacke auffängt, dessen oberer Saum um einen hölzernen Reif genäht ist und den man, nachdem er unter diesem Reifen zugebunden worden ist, in kochendes Wasser taucht. Zur Vertilgung der Nester, welche in die Erde gemacht sind, öffnet man das Loch etwas, schüttet Asche oder ungelöschten Kalk hinein und stampft die Erde fest oder schüttet einige Spaten voll Erde darüber. Noch besser ist es, eine starke Rakete so weit als möglich in das Loch zu stecken und dann anzuzünden. Befindet sich ein Nest in einem hohlen Stamm, so verklebt man die Öffnung fest mit Lehm, wobei man benachbarte Öffnungen nicht vergessen darf, da solche oft miteinander in Verbindung stehen; oder man zieht einen Bündel Berg durch zerlassenes Pech, umwickelt außen mit Berg, verstopft damit die Flugöffnung und zündet dann das Berg an. Das lockere Berg flammt dann ab, das mit Pech getränkte bleibt aber vor dem Loch kleben; Tiere, die davon fliegen wollen, werden mit brennenden Strohwißchen versengt. Man muß aber Wasser in Bereitschaft haben, um bei allenfalligem Feuerfängen des Baumes löschen zu können. Zum Fangen der Wespen und Hornisse ist nachgenanntes Mittel zu empfehlen: man füllt eine reine gläserne Flasche bis auf drei Fünftel des Inhaltes mit gewöhnlichem, mit Wasser verdünntem Kornbranntwein, dem etwas Honig oder Zucker zugesetzt ist und sorgt dafür, daß der Hals der Flasche nicht klebrig wird. Die Flasche wird so nahe als möglich bei dem zu schützenden Gegenstand an einem Baumaß festgebunden, so daß sie eine möglichst schiefe Lage erhält, weil in die aufrecht stehende das Insekt schwer hineinkriechen und aus der zu schief liegenden wieder entkommen kann. Die Wespen und Hornisse ziehen den Ge-

nuß dieser Mischung dem aller Früchte vor und man hat darauf zu achten, die Flasche von neuem zu füllen, nachdem sie vorher gereinigt worden ist, wenn sie keine Tiere mehr aufnehmen kann. Die Insekten lassen sich auch fangen, wenn man Leimruten, mit Honig bestrichen, vor die Öffnungen der Nester stellt.

Nach einer anderen Angabe eignen sich zum Fangen der Wespen hohe Einnach-, Hyazinthen- oder sonstige Gläser, weithalsige Flaschen (auch schadhafte, doch darf nichts auslaufen können), die man mit irgend einem geringen Obstsaft bis zu zwei Drittel anfüllt und durch einige Tropfen Rum oder Branntwein stark duftend macht. Den Saft kann man billig aus allerhand Abfällen bereiten; fleckiges Obst, Schalen und Kerne kocht man mit Apfelsinenschalen, ordinären Sirupen oder Farinzucker in Wasser, seiht die Flüssigkeit durch, vermischt sie, so lange sie noch heiß ist, mit einem guten Teil Borax und dem Alkohol. Abgekühlt wird sie in die Gläser verfüllt und diese verbindet man mit festem, weißem Papier, in das man dann kreuzweise Einschnitte macht. Die entstandenen Ecken werden etwas nach innen umgebogen. Damit ist eine Öffnung entstanden, die das Insekt wohl hinein-, aber nicht wieder herausläßt. Um den Hals des Gefäßes wird ein festes Band geschlungen, das zugleich ein leichtes Aufhängen an Baumästen, Spalieren, Fensterkreuzen usw. ermöglicht. In solchen Fällen fangen sich nicht nur Wespen, sondern auch eine Menge Nachtichmetterlinge, was den Obstanlagen noch anderweitig zugute kommt.

### Vertilgung von Wespennestern.

Die Wespenester, welche sich in der Erde befinden, kann man leicht durch Schwefelkohlenstoff unschädlich machen und die Vertilgung wird am besten abends vorgenommen. Man gießt in ein Wespennest beziehentlich das in der Erde erkennbare Loch etwa 20 bis 40 g Schwefelkohlenstoff und tritt das Loch zu oder wirft ein paar Spatenstiche Erde



darauf. Der sofort verdampfende Schwefelkohlenstoff dringt überall ein und tötet jegliches Lebewesen. Die einzelnen einherfliegenden Wespen lassen sich ziemlich leicht fangen, wenn man Flaschen, beispielsweise Weinflaschen zu  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{2}$ , mit Zuckerlösung füllt und dieselben in der Nähe der Obstpflanzungen aufhängt.

### Mittel gegen Blattläuse.

Die Blattläuse finden sich auf fast ausnahmslos allen Pflanzen, ihre Vermehrung ist eine ganz außerordentliche; sie saugen an den angezapften Pflanzenteilen, die Exkremente im flüssigen Zustande fallen auf die unteren Blätter, trocknen daselbst zu einem klebrigen Überzug und beeinträchtigen die Ernährung und Ausdünstung der Pflanzen. Viele Insekten, Fliegen, Aderflügler, Nachtschmetterlinge finden sich neben Ameisen zum Schmaus des süßen Saftes der Exkremente ein, aber die Läuse selbst und ihre Brut lassen sie unberührt. Hierbei bieten die von Blattläusen befallenen Blätter eine günstige Brutstätte für durch die Luft zugeführte Pilzsporen und einen Herd für allerlei von Rost- und Schimmelbildung herrührende Krankheiten.

Da wo die Blattläuse an kleinen Topfpflanzen, einzelnen kleinen Bäumchen im Garten auftreten, können sie mit der Hand zerdrückt werden, aber wenn es sich darum handelt, größere von ihnen befallene Pflanzenanlagen zu reinigen, kann dieses Mittel natürlich nicht in Anwendung kommen. Nur wenige Insekten, wie ganz kleine Schlupfwespen, deren Larven in der Blattlaus als Parasiten wohnen, dann einige Kerfe (Marienkäferchen, Blattlauskäfer) sind als nützlich gegen dieselben erkannt worden.

Für die Vertilgung der Blattläuse haben sich vor allem Seifenlösungen, dann Petroleumemulsionen bewährt, von denen eine ganze Anzahl an anderer Stelle angeführt sind; das Seifenwasser trocknet an den damit gründlich benetzten Läusen, verstopft die Luftlöcher und die Tiere gehen zugrunde. Die Beiprügung geschieht am besten abends, wenn

die Sonne untergegangen ist, mittels besonderer Zerstäuber, welche die Seifenlösung staubförmig über alle Teile der Pflanze verbreiten und natürlich auch die Blattläuse treffen, wenn man den feinen Sprühregen auf die befallenen Teile lenkt, was nicht schwer ist.

Auch das Einstäuben mit pulverigen Substanzen (Schwefelblumen, Kalkstaub, Gips, gesiebte Holzasche [alkalisch]), läßt gute Erfolge erwarten, doch muß es des Morgens, wenn der Tau noch auf den Blättern usw. liegt, oder nach einem Regen oder endlich nach vorangegangener Bespritzung mit Wasser vorgenommen werden. Als die Pulver aufzubringenden Mittel bedient man sich der Pulverzerstäuber (Blasebälge), vermittels derer man nach Erfordernis größere oder geringere Mengen des Vernichtungsmittels aufbringen kann. Wichtig bei der Benützung der Flüssigkeiten sowohl als auch der Pulver ist, daß die Verfahren mit denselben mehrmals wiederholt werden, und zwar so oft und so lange, bis alle Läuse vernichtet sind, denn auch nur eine geringe Zahl am Leben bleibender Individuen bietet den Anlaß zu der Bildung neuer Blattlauskolonien. Bei von Blattläusen befallenen Topfpflanzen legt man den belaubten Teil in ein mit Wasser oder Seifenwasser gefülltes Gefäß; die Pflanze muß dabei eine solche Lage haben, daß alle Teile derselben eingetaucht bleiben, sonst ziehen sich die Läuse an trockene Stellen.

Zu den besten Vertilgungsmitteln soll die nach den Angaben *B a u m a n n s* (Anstaltsgärtner in Geisenheim am Rhein) bereitete Quassiabrühe gehören.  $1\frac{1}{4}$  kg Quassiaholz werden eine Nacht in

10 l Wasser eingeweicht und am anderen Morgen tüchtig gekocht. Nun gießt man

100 l Wasser in ein Petroleumfaß, legt ein Stück Packtuch darüber und schüttet die Quassiabholzabkochung darauf. Ist die Brühe vollständig in das Faß gelaufen, so beseitigt man das auf dem Packtuch, das als Filter gedient hat, liegende Holz, das nicht weiter brauchbar ist. Alsdann rührt man

2½ kg Seife unter die Mischung, die nun zum Besprühen der Pflanzen fertig ist und jederzeit Verwendung finden kann. Sie ist ein Radikalmittel gegen das lästige Ungeziefer, ohne den damit befallenen Blättern irgendwelchen Schaden zuzufügen, sogar beim Pflaumenbaum kann man sie ohne Bedenken gebrauchen. Die Quassiabrühe sollte auch in keiner Baumschule fehlen; man nimmt den von den Läusen befallenen Trieb, taucht ihn in die Brühe und schon nach einer Stunde sind die Tierchen schwarz gefärbt und lassen sich beseitigen. Die fertiggestellte Quassiabrühe kann vom Frühjahr bis in den Herbst in dem lose bedeckten Faß stehen bleiben, ohne an ihrer Wirkungskraft einzubüßen. Man beginnt mit dem Besprühen, sobald sich die Blattlaus zeigt und wiederholt man die Arbeit mehrmals, so wird das Ungeziefer wirklich ganz verschwinden.

Obstbautechniker Nach empfiehlt ebenfalls die Bespritzung mit Quassiabrühe. Hierzu werden 1½ kg Quassiaholzspäne in

5 l Wasser 24 Stunden zum Erweichen aufgestellt und dann eine Stunde lang gründlich gekocht. Um die groben Anteile zurückzuhalten, wird die Abkochung durch ein Gewebe geseiht. Hierauf werden

2½ kg Seife in

5 l Wasser gelöst, beide Brühen zusammengegossen und mit Wasser auf insgesamt 100 l verdünnt. Die so erhaltene Quassiabrühe kann mittels tragbarer selbsttätiger Spritzen, deren Verteiler einen kräftigen Strahl geben muß, zur Vernichtung der Blattläuse benutzt werden. Die Verwendung empfiehlt sich besonders in den späten Nachmittagsstunden, damit die Brühe genügend einwirkt und nicht etwa schnell verdunstet. Wo es möglich ist, können auch die Zweige in die Brühe getaucht werden. Weiter empfiehlt sich dort, wo Wasserleitung, Schlauch mit Verteiler oder sonst kräftige Spritzen zur Verfügung stehen, das regelmäßige Spritzen mit kaltem Wasser am Morgen und am Abend. Das kalte Bad behagt den Läusen nicht. Beim Winterschnitt sind die mit den Winteriern der Blattlaus versehenen Triebe

(schwarze, pulverfornähnliche Eier in der Nähe der Knospen) abzuschneiden und zu verbrennen.

Reßlerische Flüssigkeit zum Besprühen der Pflanzen, besonders gegen Blattläuse:

8	Gewichtsteile Kaliseife,
12	» Tabakabkochung,
10	» roher Amylalkohol werden in
40	Gewichtsteilen denaturiertem Spiritus gelöst und mit
200	» Regen- oder Flußwasser versetzt.

### Mittel gegen Blutegel in Fischteichen.

Wenn diese Tiere in Teichen überhand nehmen, so werden sie den Fischen gefährlich und ist dies besonders in Karauschenteichen der Fall. Man vertilgt sie am besten durch Schleie, die man in den Teich bringen läßt oder fängt sie, indem man Blut auf ein leinenes Tuch gießt und dieses in das Wasser hängt; die Blutegel hängen sich in Menge an dasselbe und können so aus dem Teiche gezogen werden. Auch können sie durch Kochsalz, das man in den Teich bringt, getötet werden.

### Mittel gegen Blutläuse.

Man kann bei Gefahren des Auftretens der Blutlaus in der Weise vorbeugen, daß man den Stamm und stärkere Äste von losen Rindeanteilen, dann von anhaftenden Moosen und Flechten durch Abkratzen derselben reinigt, auch stark borstige Rinden durch Beschneiden mit großen Messern oder scharfen Kratzern so gut als tunlich ebnet, damit den Feinden so wenig als möglich Verstecke zu der Vermehrung geboten sind. Ferner kann man Wundstellen und Vertiefungen auch mit Baumwachs oder mit Lehm austreichen. Dort, wo die Schildlauskolonien sich angesetzt haben, werden dieselben am Stamm und den erreichbaren Ästen mit Hölzern zerdrückt, der Baumstamm, Äste und Zweige oft auch, wenn dies möglich ist, mit Spiritus bepinselt oder besser noch be-

spritzt und dann angezündet. Auch kann man auf einen Stock oder auf eine Stange mit Spiritus getränkte lose Baumwolle bringen, diese anzünden und mit dieser Art Fackel das Ungeziefer verbrennen. Immerhin muß dabei vorsichtig verfahren werden. Zweckmäßig kann man mit dem mechanischen Zerdrücken auch eines der vielen Mittel verbinden, welche in Form von Flüssigkeiten als Insektenvertilgungsmittel Anwendung finden. Taschenberg bezeichnet auch das Kalken der Wurzeln als erfolgreiches Mittel gegen die Blutlaus an den Wurzeln, wobei es auf das Wachstum fördernden Einfluß haben soll. Im Bereiche der Krone des Baumes, also so weit als sich der Schatten um die Mittagsstunde ausbreitet, wird die Erde ringsum so weit weggenommen, daß die Wurzeln oben frei liegen, dann 1 bis 2 Gießkannen voll Kaltwasser oder Nischenlauge aufgegoßen und nun etwa 3 cm hoch gebrannter gemahlener oder mit Wasser zu Pulver gelöschter Kalk aufgeschüttet und die Grube bis zum normalen Niveau wieder mit der Erde gefüllt.

Bei der Bekämpfung dieses schädlichen Tieres kommt es nach einer zuverlässigen Quelle, weniger auf die Auswahl der die Schmarotzer tötenden Mittel, beziehungsweise Flüssigkeit an, als darauf, daß dieselbe

a) gemeinsam seitens aller benachbarten Apfelbaumzüchter;

b) möglichst schon im Spätherbst und Winter sowie

c) zusammen mit gründlichster, sorgfältigster Bearbeitung aller Rindenteile mit Baumscharrer, scharfer Bürste oder ebensolehem Pinzel und Begleichneiden sowie Verbrennen aller stark mit Blutläusen besetzten Baumteile vorgenommen wird, ferner

d) unter Überdeckung der Baumcheibe bis dicht rings um den Baumstamm mit alten, aber nicht zerrissenen Leinwandlaken, damit auf diesen etwa zu Boden fallende Blutläuse aufgefangen und vernichtet werden können.

Zur Vernichtung der an den Apfelbaumwurzeln schmarotzenden Blutläuse empfahl Richter das Untergraben

von Tabakstaub (3 *kg* für einen großen Baum) als äußerst wirksam. Zu beachten ist überhaupt der Wert des Nikotins als blutlaustötendes Mittel.

Da sich die Blutlaus hauptsächlich an solchen Stellen ansiedelt, wo sich an Ästen, Stämmen, Zweigen oder Wurzeln kleine Wunden befinden, ja sich sogar im Sommer vielfach junge Läuse an den Blattwinkeln der jungen Triebe niederlassen und mit ihrem spitzen Schnabel den Saft aufsaugen, so wird dadurch in dem Längenwachstum des Holzgewebes eine Hemmung hervorgerufen. Es entstehen nach und nach knollige, krankhafte Anschwellungen an den befallenen Zweigen, die dürrer Spitzen mehrer sich, durch die Millionen saugender Blutläuse wird der Baum entkräftet, er bringt keine Früchte mehr und kann infolge allgemeiner Entkräftung im Verlaufe mehrerer Jahre durch stark auftretenden Frost und durch die sich massenhaft in den Wunden ansiedelnden Vorkenkäfer völlig zugrunde gehen.

Die Blutlaus greift nicht alle Apfelsorten an, sie zieht Sorten, die feineres Holz besitzen, vor. Es werden sehr stark befallen: Reswicker Küchenapfel, Cellini-, Langstons Sondergleichen, Wintergoldparmäne, Luifen, Ribston-Pepping, Große Käßeler-, Gäßdonker-, Karmeliter-, Luneviller, Ananas-, Goldgelbe, Luxemburger und englische Spital-Reinette, Zwiebelborstorf, Morgenduftapfel, Hawthornden, Roter Herbst-Calvill, Roter Winter-Taubenapfel, Roter und weißer Trierischer Weinapfel, Großer rheinischer Weinapfel, Weißer Winter-Calvill, Goldreinette von Blenheim, Pariser Rambour, Spätblühender und weißer Winter-Tafelapfel, Champagner-Reinette und königlicher Kurzstiel.

Wenig, beinahe gar nicht befallen und dann mehr als junge Pflanzen in den Baumschulen, selten als ältere Bäume werden: Charlamowski, Gravensteiner, Kleiner Langstiel, Hohenheimer Riesling, Sternreinette, Downtons Pepping, Fearus Pepping, Boikenapfel, Geflammtter Kardinal und Wormannischer Ziderapfel.

Natürliche Feinde der Blutläuse gibt es leider nur sehr wenige, denn die Vögel fressen Blutläuse nicht. Nur

die jungen Larven der Florfliegen, die sogenannten Blattläuskäfer, die Ohrwürmer, die Kreuzspinnen und die Netzspinnen vertilgen Blutläuse.

Gute Resultate sollen erhalten werden bei Anwendung von Harzölseife bei belaubtem Zustande der Bäume und von Karbolineum nach dem Laubfalle. Die Harzölseife wird mit Wasser im Verhältnisse von 1:20 verdünnt und mittels Pinsels aufgetragen, während mit Karbolineum die befallenen Stellen vorsichtig betupft werden.

Die Bekämpfung der Blutlaus durch Bespritzen der Bäume in belaubtem Zustande hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn der Kampf rechtzeitig aufgenommen wird und wenn sich alle Obstzüchter gleichmäßig an der Arbeit beteiligen.

Bei den Weissenheimer Obstanlagen hat man bemerkt, daß ein kalter Wasserstrahl, mit Druck auf die Blutlauskolonien gebracht und dieses des öfteren wiederholt, nach den gemachten Beobachtungen vorzügliche Dienste leistet. Diese Behandlung ruft an den Bäumen sicherlich keinen Schaden hervor, im Gegenteil, es ist eine Wohltat für dieselben.

Held-Hohenheim empfiehlt die nachgenannten Mittel zur Vernichtung der Blutläuse überall dort, wo andere mechanische Mittel nicht ausreichen oder nicht angewendet werden können:

- a) Bespritzen mit 1° iger Thollösung, 1 knapper Eßlöffel voll auf 1 l Wasser;
- b) Bespritzen mit 3° iger Sapofarbollösung;
- c) Bespritzen mit Petroleumemulsion;
- d) Bespritzen mit konzentriertem Blutlausgift, bestehend aus:

150 g Schmierseife,

200 cm<sup>3</sup> Fuselöl,

9 g Karbolsäure, in Wasser zu 1 l aufgelöst und mit der zehnfachen Menge nicht zu kalkhaltigem Wasser verdünnt.

e) Man löst

500 g Seife (schwarze Seife) in

5 l heißem Wasser, gibt

500 g Insektenspulver (Pyrethrum) hinzu und mischt alles gut durcheinander. Sodann bringt man noch

95 l Wasser dazu, rührt tüchtig um und besprüht mit der Flüssigkeit die von der Blutlaus befallenen Bäume. Nach einem ein- bis zweimaligem Spritzen sind die Bäume von der Blutlaus befreit. Die Flüssigkeit stellt sich auf zwei Pfennige pro Liter und ist somit sehr billig. Nebenbei hat sie den Vorzug, daß jedermann sie ohne Umstände leicht herstellen kann.

f) Bei unbelaubtem Zustande der Apfelbäume wird nach angestellten Versuchen des Ökonomierates Göthe Schwefelkohlenstoff empfohlen. Mit einem an ein Stäbchen gebundenen Schwamm, der in die Flüssigkeit getaucht wird, überstreicht man die befallenen Stellen. Die Läuse gehen unmittelbar darauf zugrunde. Die Rinde soll unter der flüchtigen Berührung nicht leiden. Es ist aber besondere Vorsicht nötig, denn Schwefelkohlenstoff ist giftig und sehr feuergefährlich.

### Kalkanstrich gegen die Blutlaus.

Als sehr wirksames Mittel gegen die Blutlaus hat sich der Anstrich mit gelöschtem Kalk insofern erwiesen, als derselbe das Tier von den Bäumen abhält, also dasselbe unterdrückt. Man bereitet sich Kalkmilch durch Verdünnen frisch gelöschten Kalks mit so viel Wasser, daß die Flüssigkeit rahm-artig dick ist und bestreicht mittels eines Pflanzenfaserpinsels den Stamm, die Äste und stärkeren Zweige; es ist hierbei erforderlich, Rauheiten der Rinde mit dem Pinsel gut auszustupfen, damit unbestrichene Stellen nicht vorhanden sind. Da der Anstrich unter dem Einflusse der Niederschläge natürlich teilweise verschwindet, muß derselbe von Zeit zu Zeit erneuert werden.



Über die Verwendung von Kalk zur Bekämpfung der Blutlaus wird von anderer Seite ausgeführt: Von den verschiedenen Mitteln zu diesem Zwecke wird wohl am erfolgreichsten und besten der Kalk angewendet und es hat sich herausgestellt, daß in kalkreichem Boden stehende Obstbäume weit weniger von diesem Schädling befallen werden. Außer einer Kalldüngung, die demnach empfehlenswert ist, ist anzuraten, die Bäume ebenfalls mit Kalk zu bestreichen, da diese dann vor der Blutlaus und anderem Ungeziefer geschützt sind. Der dem Boden zugeführte Kalk trägt übrigens auch wesentlich zur Zersetzung des Bodens bei, denn es ist bekanntlich nicht hinreichend, daß derselbe genügend Nährstoffe in sich birgt oder zugeführt erhält, sondern es müssen diese Stoffe auch aufgeschlossen und der Pflanze zugänglich gemacht werden.

### Reßler'sche Blutlaustinktur.

- 50 Gewichtsteile Schmierseife, grüne, werden in
- 650 Gewichtsteilen Wasser gelöst, dann
- 100 Gewichtsteile Fuselöl und
- 200 „ Spiritus hinzugesetzt.

Diese Mischung eignet sich in dieser Konzentration nur zum Auspinseln der Blutlauskolonien.

### Petroleumemulsion gegen Blutläuse.

- 1 l Petroleum wird mit einer Lösung von
- 3 kg Schmierseife in
- 100 l Wasser in der Weise vermischt, daß man zunächst das Petroleum mit sehr geringen Mengen der Seifenlösung nach und nach verrührt und dies so lange fortsetzt, bis etwa ein Viertel der Seifenlösung mit dem Petroleum vereinigt ist. Dann fügt man die übrige Seifenlösung unter tüchtigem Durcharbeiten hinzu.

## Tabakerxtrakt-Seifenlösung gegen Blutläuse.

- 1 Gewichtsteil Tabakerxtrakt wird mit
- 10 Gewichtsteilen Wasser verdünnt, mit dieser Flüssigkeit
- 2 Gewichtsteile Schmierseife innig verrührt und hierauf
- nach und nach unter gutem Durchmischen noch
- 90 Gewichtsteile Wasser hinzugefügt.

## Mittel gegen Erdflöhe.

Der Erdfloh überwintert unter Laub, Erde usw. und fällt in den ersten Frühlingstagen die jungen Pflanzen, besonders die Kohlarten, im Mistbeete und im freien Land an, richtet oft die schrecklichsten Verheerungen an, vermehrt sich bei warmer Witterung ungemein schnell und liebt überhaupt Trockenis und Wärme. Von den zahlreichen, gegen diesen argen Feind des Gartens anempfohlenen Mitteln sichert keines einen vollständigen Erfolg. Das Begießen der Pflanzen mit Abkochung von Tabak, Wermut usw., das Bestreuen derselben mit Asche, Ruß, Schwefel usw. nützt nichts, sondern schadet oft eher den Pflanzen als den Erdflöhen; das Aufstellen von Leimruten, um die Käfer zu fangen, ist kindische Spielerei. Am besten ist es noch, zwischen die zu schützenden Gewächse Rabieschen und Gartenkresse zu säen, damit sich die Käfer auf diesen Pflanzen allein, die sie vorziehen, versammeln und die anderen indeß den Angriffen der Erdflöhe entwachien, denn für bereits erstarrte Pflanzen sind sie nur noch wenig gefährlich. Auch überbraust man die jungen Samenpflanzungen mit kaltem Wasser, um dadurch die Erdflöhe zu verjagen und gleichzeitig das Wachstum der Pflänzchen bei trockener Witterung zu beschleunigen. Die Erdflöhe sollen sich auch abhalten lassen, wenn man die Beete in der Mitte eines Grasplatzes anlegt, indem sie durch Gras nicht springen können. Das Einquellen der Samen wird — von verschiedenen Seiten empfohlen — wahrscheinlich nicht durch die dem Wasser beigemischten Stoffe (Salz, Ruß usw.) helfen, sondern durch das dadurch

beschleunigte Wachsen, denn wie schon erwähnt, sind die Erdföhe nur den zarten Pflanzen gefährlich. Auch sollen die Samenbeete dadurch vor den Erdföhe geschützt werden, daß man vor dem Aufgehen der Sämereien, den beim Raffinieren der Öle verbleibenden Rückstand, mit Wasser vermischt, über dieselben sprengt.

H. Thiele verwendete Kalkstaub, Ruß, Tabakstaub, Naphthalinkalk, Schwefelwasserstoff, Schwefelkohlenstoff, Zwiebelabkochung, Glasplatten mit Baumwachs und Vogel-leim bestrichen, von denen Tabakstaub am besten wirkte, während alle anderen Mittel wirkungslos waren und Zwiebel-brühe sogar den Pflanzen schadete. Auch Tabaklaugen in verschiedenen Konzentrationsgraden wurden, auch in Ver-bindung mit klebenden Substanzen, Zucker und Gummi, ver-sucht, doch gaben die Anwendungen nicht nur kein günstiges Resultat, sondern erwiesen sich noch als Unschadmittel.

Ein drei Jahre währendes Aussetzen der Kohlpflan-zungen sowie das Vertilgen der mit Erdföhe besetzten Un-fräuter dürfte wohl am besten sein.

Erdföhe werden am sichersten von den Samenbeeten abgehalten, wenn man Lauch, Zwiebeln oder Knoblauch dazwischen sät oder die Saaten zwischen Reihen dieser Beete baut.

#### Pulver gegen Erdföhe nach Whitehead.

Man mischt, am besten durch eine Siebmaschine

30	Gewichtsteile Schwefelblumen,
50	» Ruß, gewöhnlicher Kaminruß,
350	» Kalkpulver,
350	» Gaskalk.

Das Pulver wird auf die natürlich durch den Tau oder künstlich durch Wasserzerstäubung angefeuchteten Pflanzen aufgeblasen.

#### Mittel gegen den Heu- und Sauerwurm.

Die Traubenmotte, der Schmetterling des Heu- und Sauerwurmes, verhält sich des Tags über ruhig, bei ein-

tretender Dunkelheit aber wird sie lebhaft; sie legt die Eier an die Blütenknospen, besonders häufig an diese seitlich in der Nähe des Stieles. Das aus dem Ei ausschließende winzige Räupchen bohrt sich in die Knospe und frisst sie aus; seine Anwesenheit verrät sich durch die anhaftenden Exkremente, ein kleines Häufchen von bräunlichem oder gelbem Pulver. Nach 8 bis 10 Tagen spinnt das Räupchen mehrere Knöschen zusammen und verbirgt sich in diesem Gewebe. Die verfaulenden Teile von diesen Exkrementen und die von Schimmelpilzen umrandeten Pflanzenteile bilden eine Feuchtigkeit enthaltende Masse, in der sich die Räupchen anheimelnd sehr wohl befinden. Sie weiden mit besonderer Vorliebe die fünf gelben Nektarien an der Basis des Fruchtknotens ab, die Zucker enthalten und den angenehmen milden Duft ausströmen, welcher den blühenden Reben eigen ist. Um zu ermitteln ob die Raupen außer den Weinreben auch andere Pflanzen verzehren, fütterte Dr. Demitz eine Anzahl Raupen des Heu- oder Sauerwurmes gruppenweise mit Beeren und Früchten verschiedener Stauden, Sträucher und Bäume, die in der Nähe von Weintrauben wachsen und verglich die Exkremente der Gruppen miteinander. Er fand die meisten Exkremente beim Verfüttern der Früchte von Weißdorn, Heckenrose, Pflaumen, Brombeeren und Jungfernreben. Letztere und Brombeeren scheinen von den Räupchen besonders gern gefressen zu werden.

Die beste und auch älteste Methode der Vernichtung ist, daß man die Gespinste noch vor der Blüte genau nachsieht und wo sie zusammengeponnen scheinen, mit einer derben Nadel die Räupchen zur Vernichtung herauszieht, indem man sie ansticht. Dies soll man aber gleich bei der ersten Brut der Heuwürmer tun, dann kann der zweite, der Sauerwurm, gar nicht auskommen. Andere Vorichtsmaßregeln, wie Abfangen der Schmetterlinge (auch Traubenwickler genannt) mittels Lampen oder Klebfächer usw. haben nicht diesen Wert. Gelingt es, die Püppchen aufzustöbern und zu vernichten, so ist dies von besonderem Vorteil.

Der Heu- und Sauerwurm sind Nebenschädlinge, die besonders im Moselgebiet schon häufig die Ernten ganzer Gemarkungen und gerade der besten vernichtet haben. Dr. Lüstner schildert den Kampf der Amerikaner gegen das Auftreten der Obstmade durch Bespritzen der Bäume mit Parisergrün, einer Arsen enthaltenden Körperfarbe, das wohl die Schädlinge tötete, aber auch die Pflanzen angriff. Durch Verwendung von Kalk zu der Mischung habe man dann die schädlichen Wirkungen auf die Bäume neutralisiert. Auf diesen Versuchen habe man weitergebaut und auch die Sauerwürmer an den Rebstöcken zuerst in Amerika, dann in Algier und Südfrankreich zu vernichten gesucht. Man wende heute arsenjaures Blei an und gebe dieses zu der Kupfervitriolkalkmischung. Dr. Dewitz in Geisenheim habe in den letzteren Jahren größere Versuche mit arsenjaurem Blei im Rheingau gemacht und günstige Erfolge erzielt. Durch Bespritzung mit einer Mischung, die arsenjaures Blei enthält, werde dem Schädlinge die Nahrung vergiftet, so daß er sterben müsse. Diese Bekämpfung könne aber nur bei der ersten Generation des Schädlinges — des Heuwurmes — also zur Zeit der Traubenblüte angewendet und müßten besonders die Gespinne bespritzt werden. Bei der zweiten Generation — dem Sauerwurm — kann diese Bespritzung, eben weil dieses Mittel ein starkes Gift ist, nicht angewendet werden. Dewitz warnt noch vor der allgemeinen Anwendung des Mittels, da noch manche Beobachtung zu machen wäre und teilt mit, daß zuerst noch größere Versuche im Rheingau und an der Mosel unter Leitung von Sachverständigen aus Geisenheim vorgenommen würden.

#### Mittel gegen Grillen (Hausgrillen, Heimchen).

Dieses Tierchen ist ein lästiges Ungeziefer in Häusern, welches durch sein Zirpen, durch das Aushöhlen der Wände, in denen es lebt und durch das Benähen von Speisen sehr unangenehm wird. Die Vertilgung ist schwierig. Man sucht die Öffnungen in den Wänden zu erforschen, aus denen sie

des Nachts hervorkommen und legt vor dieselben gemahlenen und mit Arsenik vermischten Zucker. In Backstuben, in denen die Grillen besonders häufig sind, legt man ein Bündel Erbsenstroh in eine Ecke, schüttelt dasselbe öfters aus und tritt die aus denselben herausfallenden Grillen tot.

In Ungarn ist eine Grillenart heimisch, die bisher als durchaus unschädliches, sogar nütliches Tierchen bekannt war, weil sie sich für gewöhnlich von kleinen Insekten nährt. In zwei wasserarmen Sommern hat sich aber diese Grillenart (*Grillus desertus*) derart vermehrt, daß sie in Millionen auftrat und durch Nahrungsmangel gezwungen wurde, ihre Lebensweise zu ändern. In den Weingärten war alles schwarz von Grillen und die Tiere machten sich über die jungen Triebe der Weinstöcke her, verzehrten Blatt, Stengel und Blüte und vernichteten alle Erntehoffnung. Man versuchte sie durch Insektenseife, Quassia, Tabaksaufguß zu vernichten. Alles vergeblich. Insektenpulver war zwar wirksam, aber in der benötigten Menge zu teuer. Bei Versuchen mit Seifenlösung stellte sich ein großer Erfolg ein, man ging von anfänglich 10%igen Lösungen bis auf 1%ige Lösung herab und diese genügte noch vollständig. Mit der Uhr in der Hand wurde das Absterben der Grillen beobachtet und in weniger als fünf Minuten waren sie vernichtet. Die Seifenlösung wurde mittels einer Nebelauspriße auf den Boden zwischen den Reihen gesprüht, wo die Grillen in Massen umhersprangen. Ein einziger Mann konnte Millionen dieser Schädlinge auf diese Weise in einem Tage vernichten und etwa zwei Tsch Grund von ihnen säubern.

### Mittel gegen Heuschrecken.

Die Heuschrecken, die in südlichen Ländern oft ungeheuren Schaden anrichten, werden in der gemäßigten Zone selten gefährlich, doch haben sie schon zu verschiedenen Zeiten Mitteleuropa heimgesucht. Kälte und Nässe sind die wirksamsten Mittel gegen diese Tiere, da sie unter deren Einwirkung sehr bald zugrunde gehen. An Orten, wo sie sich in Massen

niederlassen, muß man sie durch Aufgebot vieler Menschen totschiessen oder aber durch Walzen totfahren lassen. Durch Abfeuern von Mörsern oder Geschützen, Rauch, Spritzen mit Wasser kann man sie töten, zerstreuen oder von einer Gegend abhalten. Die Eier, welche sie in die Erde oder in das Gras in Gestalt von Klumpen legen, werden von Raben, Mäusen, Schweinen verzehrt, sind sie aber in Menge vorhanden, so muß man sie durch Umpflügen der Äcker (im Herbst und Frühjahr) zu töten suchen oder einsammeln lassen. Zwischen Gärten, Hecken, Gesträuch findet man die meisten. Junge Heuschrecken, die noch nicht fliegen können, treibt man im Frühjahr, mit belaubtem Zweigen in der Hand, in eigens zu diesem Zwecke gegrabene Gruben, tritt sie hier tot und schüttet sie mit Erde zu. Bei diesem Treiben muß man mit den Zweigen ganz leicht auf die Erde schlagen, nicht zu nahe hinter ihnen hergehen, sie nicht gegen eine Bodenerhebung oder gegen den Wind treiben, da sie sonst zu müde werden und nicht weiter wollen. Sind sie an dem Graben angelangt, so muß man ihnen Zeit lassen, sie springen oder fliegen dann alle hinein. Vom Getreide muß man sie besonders abzuhalten suchen, da sie schwer aus demselben wieder herauszubringen sind. Haben sie schon einen Teil des Getreidefeldes eingenommen, so sondert man diesen von den anderen durch einen Graben ab, mäht das Getreide und treibt sie dann aus den Stoppeln in den Graben.

### Mittel gegen Hülserfrüchte-Schädlinge.

Ein einfaches Mittel gegen den Erbsenkäfer soll das Herauslocken desselben aus seinem Versteck, den Erbsen, sein. Er befindet sich bereits im Dezember ausgebildet, doch in einem Erstarrungszustande in der Erbse und ist angeblich nur notwendig ihn durch Wärme zu erwecken und aus den Erbsen herauszulocken. Man erreicht dies nach den gemachten Mitteilungen folgendermaßen: Die Erbsenkörner werden im Jänner und Februar 8 bis 14 Tage lang in einen auf 20 bis

25° R erwärmten Raum gebracht und der Käfer dadurch aus seinem Winterschlaf geweckt und zum Verlassen seines Aufenthaltsortes gezwungen werden. Da nun um diese Zeit den Käfern die Bedingungen zu ihrer Fortpflanzung fehlen, so sollen sie unrettbar verloren, die Erbsen aber als Saatgut verwendbar sein.

### Mittel zum Abhalten von Erbsenfeldern

2 Gewichtsteile gemahlener ungelöschter Kalk,

2 „ „ Asche,

1 Gewichtsteil Kochsalz werden innig vermischt und über die Erbsensaaten gestreut. Auch Bestreuen der Pflanzen zur Zeit des Aufbruches der Blüten, das Begießen mit einer schwachen Lösung von Eisenvitriol sollen gute Wirkung äußern; sicher ist, daß diese beiden letzteren Mittel sehr vorteilhaft auf den Ertrag der Erbsen, wie aller Hülsenfrüchte überhaupt, einwirken.

### Mittel gegen Kellerrasseln und Tausendfüßer.

Als bestes Vertilgungsmittel hat sich das Aufstellen von Birkenbesen, welche man aufrecht stehend im Keller verteilt, bewährt. Dieselben werden mit Vorliebe von diesem Ungeziefer aufgesucht und als Zufluchtsort benützt. Schüttelt man von Zeit zu Zeit die Besen aus und tritt die herausgefallenen Tiere tot oder taucht die Besen schnell in heißes Wasser, so kann man auf leichte Weise Kellerrasseln und Tausendfüßler vernichten.

Dieselben Erfolge erzielt man durch Auslegen von weiteren ihnen genehmen Verstecken, wie hohle Stengel, umgekehrte Blumentöpfe, einige Häufchen ausgejäteten Unkrautes, Kartoffelschnitte. Wenn man diese Stellen täglich nachsieht und die kleinere oder größere dort vorgefundene Anzahl von Tieren tötet, so befreit man sich allmählich von diesem Ungeziefer. Sehr zu empfehlen ist übrigens das Anstreichen des betreffenden Raumes mit frischer Kalkmilch und wenn



der Anstrich wiederholt und sorgfältig ausgeführt wird, so läßt sich das Ungeziefer sicher beseitigen. Auch das Ausstreuen einer Mischung von gemahlenem Borax und weißem Streuzucker, des Abends aufgestreut, soll ziemlichen Erfolg verbürgen.

### Mittel gegen Kohlweißlingraupen.

Die zweite Generation des Kohlweißlings gibt immer Anlaß zum Auftreten der Raupenplage und die R. f. Pflanzenschutzstation in Wien verbreitet sich über die Bekämpfung folgendermaßen: Die Schmetterlinge setzen ihre Eier in Häufchen bis mehr als 100 an der Blattunterseite der Kohl- und Krautarten zc. ab. Nach 10 bis 14 Tagen schlüpfen die Raupen aus. Die Bekämpfung kann in zweifacher Richtung erfolgen. Vorerst wäre an die Vernichtung der Eier zu schreiten. Die Blattunterseiten sind möglichst sorgfältig abzusuchen und die darauf befindlichen Eier zu vernichten. So lange die bereits ausgeschlüpften Raupen noch beisammen bleiben, können sie ebenfalls abgejucht und vernichtet werden. Ist dieser Zeitpunkt veräuunt, so kann nur noch durch Bespritzen die Raupenplage bekämpft werden. Das harmloseste Mittel, dessen Anwendung allerdings zuweilen nicht den gewünschten sicheren Erfolg haben dürfte, ist die Bespritzung mit heißem Wasser von zirka 55°C. Diese Temperatur ist möglichst genau einzuhalten, denn ist die Temperatur unter 55°C, werden die Raupen nicht vernichtet, ist sie über 60°C, so leiden die Pflanzen. Als weitere Bekämpfungsmittel wären die nachstehenden Brühen anzuführen: Die Dufour'sche Lösung, die bereitet wird indem man

3 kg Schmierseife in

10 l Wasser auflöst, in ein großes Faß gibt und unter Umrühren mit

1 kg dalmatinischem Insektenpulver Pyrethrumpulver vermischt; zum Schlusse wird noch mit

90 l Wasser verdünnt.

Tabakertrakt in 1%iger Lösung in Verbindung mit  
 2½%iger Seife oder  
 1% Kochsalz.

Ganz besonders muß jedoch hervorgehoben werden, daß die Behandlung mit diesen Mitteln nur bei ganz jungen und wenig entwickelten Pflanzen empfohlen werden kann. Es ist nämlich nicht ausgeschlossen, daß auf Kraut oder Kohl, wenn derselbe bereits in der Knospenbildung begriffen ist, Spritzer der verwendeten Lösungen auch noch nach mehreren Wochen vorhanden bleiben, die das Gemüse selbstverständlich unverkäuflich, beziehungsweise ungenießbar machen.

### Mittel gegen Maikäfer und Engerlinge.

Bisher haben die aus Frankreich stammenden Versuche, die Engerlinge durch Benzin und Schwefelkohlenstoff zu töten, welcher mit einer Art großer Injektionspritze, die in den Boden gestochen wird, in den Erdboden eingebracht werden, nach Dr. Müßlin noch keinen nennenswerten Erfolg gehabt. Auch die gleichfalls aus Frankreich stammenden Versuche, durch Engerlinge, welche mit insekten-tötenden Pilzen (*Bothrytis tenella*) künstlich infiziert und in die Erde gebracht werden, um in der freien Natur Ansteckung und Vernichtung der Engerlinge herbeizuführen sind bisher ohne praktisch brauchbaren Erfolg geblieben.

Die Maikäfer schaden insbesondere dem zu Ende April und im Mai ausbrechenden jungen Laub der Bäume und Sträucher und das beste Mittel, um den von denselben verursachten Schaden zu verhüten, ist das Einsammeln. Dieses geschieht am besten auf folgende Weise: Zwei oder drei Stunden nach Sonnenaufgang oder um 3 bis 4 Uhr nachmittags, zu welchen Zeiten die Käfer locker an den Bäumen hängen, fängt man an, die Bäume einen nach dem anderen tüchtig zu schütteln; die heruntergefallenen Käfer läßt man auf und sammelt sie in einem Sack aus grober Leinwand. Auf Grasboden breitet man Tücher auf

den Boden aus, weil die abgeschüttelten Käfer sich sonst leicht in dem Gras verkriechen können. An starken Bäumen, deren Stamm sich nicht schütteln läßt, müssen von Leitern aus womöglich alle Äste zugleich geschüttelt werden. Wo sich Abschütteln nicht anwenden läßt, wendet man das Räuchern mit Wermut, Wacholderholz, Bilsenkraut oder Schwefel unter den Bäumen an, wodurch die Maikäfer von diesen abfallen und vom Boden aufgelesen werden müssen. Zur Sicherung einzelner Bäume, auf die man besonderen Wert legt, hat man empfohlen, dieselben während der Maikäferzeit mit Kalkstaub (an der Luft zerfallenem, gebranntem Kalk) zu bestreuen. Trotzdem der gebrannte Kalk ätzend ist, soll er doch, trocken auf die Bäume gestreut, keinen Nachteil bringen und von dem ersten Regen wieder abgewaschen werden. Selbst der Straßenstaub wird von dem Maikäfer gefürchtet, weshalb Bäume, die an der Straße stehen, weniger von Maikäfern heimgesucht werden. Auch der üble Geruch einer am Baume angehängten brennenden Lunte soll die Maikäfer verschrecken. Allerdings ist, wie mit dem Vertreiben der Schädlinge überhaupt, nicht viel erzwinkt, sie suchen eben dann die Umgebung heim.

Die Larven der Maikäfer, die Engerlinge, sind den Pflanzungen viel schädlicher als die Käfer selbst, doch wird naturgemäß durch rechtzeitiges und gründliches Einfangen und Vertilgen der Käfer, die massenhafte Entwicklung der Engerlinge teilweise hintangehalten. Die Engerlinge leben drei bis vier Jahre unter der Erde, woraus sich auch erklärt, daß es besonders reiche Maikäferflugjahre gibt. Die Engerlinge sind gelblichweiß mit safrangelbem Kopf und bläulichem Hinterleib und sie bringen den Getreidefeldern furchtbaren Schaden, weil sie die Wurzeln der Pflanzen abreißen und abnagen. Auf Kartoffelfeldern findet man oft jede Kartoffel von den Engerlingen zerfressen. Von den mancherlei gegen dieselben empfohlenen Mitteln ist nur ein einziges zuverlässig: das Auflesen derselben beim Pflügen oder Graben, welches durch Kinder geschehen kann und sich schon dadurch bezahlt macht, daß die Engerlinge ein vor-

treffliches Fütterungsmittel für das Federvieh und die Schweine abgeben. Würde dieses Mittel nur zehn Jahre lang mit Gewissenhaftigkeit angewendet, so würden damit die Maikäfer sicherer vertilgt werden, als gegenwärtig, wo man die Käfer selbst einsammelt, damit aber gewöhnlich wartet, bis sie ihre Eier abgelegt haben und das Geld für dieses Einsammeln eigentlich zum Fenster hinauswirft.

### Mittel gegen die Maulwurfsgrille.

Die Maulwurfsgrille, auch Werre, Reitwurm genannt, ist ein grillenartiges, unter der Erde wohnendes, darum mit Grabfüßen versehenes Insekt, das in manchen Gegenden eine wahre Plage ist und oft großen Schaden anrichtet, denn es durchwühlt nicht nur die Beete, indem es Gänge wie der Maulwurf gräbt, sondern frisst auch alle Pflanzenwurzeln, die ihm in den Weg kommen, ab. Ein Glück ist es noch, daß die Mutter immer eine Menge ihrer eigenen Jungen auffrisst, so daß von hundert kaum acht bis zehn am Leben bleiben. Ein bewährtes Vertilgungsmittel ist folgendes: Man nimmt 2 Teile Steinkohlenteer und 1 Teil Terpentinöl, füllt eine Flasche damit beinahe voll und versieht sie mit einem Pfropfen, in dessen durchlochte Mitte eine Federpose hindurchgesteckt wird. Im April, wenn der Frost aus der Erde und diese hinreichend feucht, die Witterung aber mild ist, sowie im Sommer nach Regenwetter, wenn die Gänge der Werren hauptsächlich zu bemerken sind, geht man diesen mit dem Finger nach, bis man auf die senkrechte Röhre kommt. In diese macht man mit dem Finger behutsam eine trichterförmige Erweiterung, gießt mit einer Gießkanne etwas Wasser hinein, dann etwa 10 bis 15 g von obiger gut umgeschüttelter Mischung, darauf wieder einen Eßlöffel voll Wasser. Das Insekt arbeitet sich dann heraus und verendet. Sind mehrere Gänge bemerkbar, so klopft man die Erdoberfläche zuerst eben, worauf die Maulwurfsgrille denjenigen Gang bald wieder herstellt, welcher zu ihrem Aufenthaltsort führt.

Die Hauptsache ist übrigens das Ausnehmen der Nester, die oft 300 bis 400, im Juni und Juli gelegte Eier enthalten; man findet sie zwei bis drei Finger tief unter der Erdoberfläche, da, wo viele Pflanzen im Umkreise abgenagt sind. Man bricht die Klumpen auseinander und zerstreut die Eier an der Luft, wo sie verderben. In einer Röhre unter dem Nest hält sich das Muttertier auf, das man ausgräbt oder auf vorgenannte Weise vertilgt. Ein anderes Mittel ist folgendes: Man macht im Spätherbst viereckige Gruben, etwa zwei Finger tief und zwei bis drei Finger weit und füllt sie mit gutem strohigen Pferdemiß an; die Maulwurfsgrillen gehen zur Überwinterung in den Mist und wenn man während des Frostes die Gruben leert, kann man die Insekten sammeln und töten. Unsichere Mittel sind: Halb mit Wasser gefüllte Töpfe unter die Gänge der Maulwurfsgrille einzugraben, sowie mit Erde bedeckte Haufen von Queckenwurzeln auf die von den Insekten heimgesuchten Beete zu legen, weil die Eier gern auch in diese abgelegt werden. Der ärgste Feind der Maulwurfsgrille ist der Maulwurf, der sie überall aufsucht und verzehrt; auch die Marder, Biesel, Krähen und Wiedehopfe stellen ihnen sehr nach.

Als Mittel zur Vertilgung der Maulwurfsgrillen werden sonst noch genannt:

1. Fanggräben, wie solche gegen den großen braunen Rüsselkäfer angelegt werden, nur müssen die Fanglöcher jeden Tag abgesucht werden, und zwar in den Morgenstunden.

2. Eingraben von Fangtöpfen zwischen den Saatbeeten in 3 bis 5 m Abstand. Der Rand der Töpfe muß etwas tiefer liegen als die Erdoberfläche.

3. Töten der Werrn durch Eingießen von Schwefelkohlenstoff in die Gänge, und zwar an der Stelle, bei welcher der Gang in die Tiefe abzweigt.

4. Ausheben der Erdnester Ende Juni oder Anfang Juli.

## 5. Auslegen von Gift:

Betrocknete Lebkuchen 0.75 kg mit  
 0.25 kg Roggenmehl und  
 0.75 kg Honig vermischt; dieses  
 Gemenge wird unter  
 Zusatz von  
 2.00 kg Arsenik zu einem Teig

angemacht, durchgeknetet und in erbsengroßen Stücken in die Gänge gelegt. Dieses letztere Vertilgungsmittel wurde von Direktor Weibel durch sechs Jahre mit Erfolg angewendet. Der Vorgang der Anwendung des Präparates ist folgender: Von den äußerlich sichtbaren Gängen werden an einzelnen Stellen Erdröckchen abgehoben, und zwar so vorsichtig, daß der Gang an dieser Stelle nicht in seinem weiteren Laufe gestört wird; hierauf läßt man eine oder zwei der Arsenikpillen in die Gangröhre fallen und deckt die Erdrumme wieder darauf, so daß die Öffnung geschlossen ist. Dieser Vorgang wird nach Bedarf und vorhandener Anzahl der Gänge während des Sommers öfters wiederholt. Die Maulwurfsgrillen nehmen dieses Mittel sehr gerne an und verenden in der Mehrzahl der Fälle, wie sich der Verfasser überzeugen konnte, außerhalb der Erdröhren auf den Pfaden der Saat- und Pflanzenbeete.

## Mittel gegen Raupen im allgemeinen.

Die Raupen sind die nachteiligsten Tiere für Gärten und Felder und die meisten besonderen Mittel, welche zur Vertilgung derselben vorgeschlagen werden, sind erfolglos. Am sichersten bekämpft man die Raupen, wenn man zeitig im Frühling die Raupennester an Bäumen und Sträuchern sorgsam abschneidet und verbrennt, im Sommer aber die auch an Kohlpflanzen an der Blattunterseite klebenden Eier abnimmt und zerdrückt, die schon ausgefrochenen Raupen abliest und tötet. Diese Arbeiten sind langweilig, aber durch Kinder leicht auszuführen und bieten Sicherheit für das Bekämpfen der Schädlinge. Die wichtigsten Maßnahmen

gegen das Überhandnehmen der Raupen sind: Jährliches Reinigen der Obstbäume von abgestorbenen Ästen und Zweigen, an denen sich die überwinternden Raupen gerne aufhalten; Reinigen derselben im Herbst von alten Blättern mit der Raupenschere und mittels Strohwischen, Abkratzen der Oberfläche der Rinde und hauptsächlich der Ritze und Risse durch starke Strohbesen und Verbrennen des Abgekratzten; Umgraben der Erde  $\frac{1}{2}$  bis 1 m rings um die Bäume im Frühjahr, August und Oktober, um die in der Erde steckenden Raupen und Puppen der Käse, dem Frost und den Vögeln preiszugeben; Schütteln der Bäume im Mai, Juni und Juli, um die Raupen herabfallen zu machen und dann zu töten; Bestreichen der Raupennester mit starkem Seifenschaum, den man mittels eines an einer Stange befestigten Pinsels an die höher gelegenen Zweige bringt und welcher den Raupen den Tod bringt; Umbinden der Stämme mit einem mit Vogelleim oder Teer bestrichenen Streifen Papier oder Leinwand, damit Raupen oder Schmetterlinge daran kleben bleiben; Aufstellen eines intensiven Lichtes, mit einem mit Teer bestrichenen Netz umgeben, an welchem sich Nachtschmetterlinge in Menge fangen. Das beste Mittel aber bleibt das Abjuchen, sorgfältig und genau ausgeführt, mit der Hand oder Abnehmen der Raupennester mit der Baumschere oder dem Raupeneisen; dieses letztere besteht aus einem geraden oder einem mit doppeltgebogenem Knie versehenen Eisen, das mit einem Ohr versehen ist, das an eine lange Stange gesteckt wird; oben hat das Eisen einen spitz zulaufenden Einschnitt und damit die Raupennester nicht in das Gras fallen, kann man unter dem Eisen einen kleinen Drahtreif anbringen, um den ein Säckchen gespannt ist. Die Nester des Baumweißlings nimmt man am besten im Spätherbst oder im Februar und Anfang März ab. Sind Stachelbeerbüsche von Raupen befallen, so legt man abends einige Tuchlappen zwischen die Zweige derselben und kann dann Frühmorgens die unter ihnen versammelten Raupen leicht töten. Auch kann man die Stachelbeersträucher mit einer Mischung von

Ruß und Wasser bestäuben, worauf am anderen Morgen die Raupen tot auf der Erde gefunden werden. Überhaupt muß das Absuchen der Raupen am Morgen geschehen, weil sich diese abends in Gesellschaften auf den Ästen und Zweigen der Bäume und Sträucher versammeln, um sich gegenseitig zu wärmen. Am allerbesten und ratsamsten wird es aber sein, die Singvögel, insbesondere die Meisen zu schonen, welche den Insekten nachstellen.

### Mittel gegen Raupen an Obstbäumen.

1. Gegen den kleinen Frostspanner oder den kleinen Frostnachtsschmetterling.

Zur Zeit da die meisten Schädlinge der Pflanzenwelt ihre Winterruhe begonnen haben, erwacht einer wieder zu neuem Leben, um die Obstbäume mit seinen Eiern zu belegen, der kleine Frostnachtsschmetterling oder Frostspanner. Aus den in der Erde liegenden Puppen dieses Insektes entwickeln sich in den nächsten Tagen die Schmetterlinge, von denen bekanntlich die Weibchen nur Flügelstummel besitzen, mit denen sie nicht zu fliegen vermögen. Sie müssen deshalb, um ihre Brut an den Zweigen der Obstbäume anzubringen, an den Stämmen in die Höhe kriechen, wobei man sie leicht mittels eines Klebringes fangen kann. Die Zeit für das Anlegen der Klebringe ist gekommen und es ist jedem Ditzüchter anzuraten, diese wichtige Arbeit alsbald vorzunehmen, da sich die Frostspannerweibchen unter Umständen bereits Ende September an den Bäumen einfinden. Zweckmäßig ist es, die Bekämpfung des Frostspanners mit derjenigen anderer Schädlinge, z. B. des Zweigabstechers, des Blattrippenstechers, des Fruchtstechers u. a. m., zu vereinigen. Man kann hierzu sehr gut die Obstmadenfallen verwenden, die sich ja bereits seit Juni an den Bäumen befinden. Dieselben müssen nunmehr abgenommen werden, wobei alles Ungeziefer, das sich unter ihnen verborgen hat, zu vernichten ist. Hierauf werden die Fallen sofort wieder angelegt. Man benötigt hierzu bekanntlich ein Bündel Holz-



wolle, breitet diese in Brusthöhe um den Stamm herum aus, bindet dann einen zirka 18 cm breiten Streifen Papier fest und wetterbeständig darüber, das auch den Klebstoff nicht aufsaugen kann darauf, und bestreicht dieses schließlich mit dem Leim. Nicht zu vergessen ist, daß die Klebringe von Zeit zu Zeit nachgesehen werden müssen. Wird hierbei festgestellt, daß der Klebstoff eingetrocknet ist, so ist der Anstrich sofort zu erneuern und diese Arbeit muß während der ganzen Flugzeit der Frostspanner, bis in den Jänner hinein, durchgeführt werden.

## 2. Gegen Raupennester (Baumweißling- und Goldaster-Raupen).

Die Raupennester, welche nach dem Abfallen des Laubes an den Obstbäumen sichtbar werden, sind die des Baumweißlings und des Goldasters, die kleinen gehören dem ersteren, die größeren dem letzteren an. Die Raupen beider Schädlinge entwickeln sich ziemlich gleichmäßig und schaden in gleicher Weise, im Frühjahr durch Ausfressen der Knospen und später der Blätter. Das wichtigste Vertilgungsmittel ist das Abbrennen der dürrer Blätter und der kleinen Gespinste im Winter mit der Raupenfackel. Die Raupenfackel wird mit Brennspritus gefüllt, angezündet und an einer langen Stange zu den Raupennestern gehalten, wodurch die Schädlinge verbrannt werden; bei vorsichtigem Arbeiten wird der Zweig nicht beschädigt. Dies ist ein Vorteil gegenüber der Raupenschere, welche den Verlust des Zweiges nach sich zieht.

## 3. Gegen Fusikladium und Obstmade.

Nach Abfall der Blüten von den Obstbäumen soll der Obstzüchter daran denken, wie er das junge Laub und die werdenden Früchte seiner Obstbäume vor dem Befall pflanzlicher und tierischer Schädlinge (Fusikladium und Obstmade) bewahren soll, damit er den Bäumen ein freudiges Wachstum, sich selber aber eine gute Einnahme nach Möglichkeit sichere. Das beste und bewährteste Mittel ist eine

1%ige Kupferkalk- oder Kupferjodalösung, vermischt mit einem geringen Prozentsatz des arsenhaltigen Schweinfurtergrüns, nach etwa 14 Tagen nach der Blüte auf Blatt und Früchten bis nach geöffnetem Blütenfelsen in feinsten Verteilung aufgespritzt.

### Mittel gegen den Rübenrüßelkäfer.

Nach Morawek hat sich Chlorbarium als ein sehr geeignetes Mittel gegen diesen Rübenshädling erwiesen, wie überhaupt gegen alle an Rübenblättern nagende Insekten; es soll die Käfer sicher töten und den Rübenpflanzen nicht schaden.

Junge Pflanzen erfordern eine schwächere Lösung

2 Teile Chlorbarium auf 100 Teile Wasser,  
ältere dagegen eine konzentriertere Lösung

4 Teile Chlorbarium auf 100 Teile Wasser; man löst das Chlorbarium in etwa 20 Teilen heißem Wasser auf und verdünnt dann bis auf 100 Teile.

### Mittel gegen Schildläuse.

Die Entstehung der Schildläuse erfolgt wie die anderer auf niedriger Stufe stehender Tiere und Pflanzen nicht aus Eiern, sondern aus vorgebildeten organischen Stoffen. Wenn Gewächse während ihrer Ruheperiode mehr Wärme und Feuchtigkeit erhalten, als ihrer Natur entspricht und dadurch eine Überfülle von Saft in ihnen veranlaßt wird, welche nicht verwendet werden kann; wenn während der Wachstumsperiode durch plötzliche Erkältungen eine Störung des Saftumlaufes eintritt; wenn durch unterlassene Beschattung bei zu großer Hitze eine Erkrankung der jungen Triebe und Blätter veranlaßt wird und sie dadurch ebenfalls zur Verarbeitung des ihnen zufließenden Saftes unfähig werden; wenn wegen mangelhafter Lüftung und von Dünsten erfüllter Luft bei Gewächsen, welche eine reine und trockene Luft verlangen, die Ausdünstung unterbrochen wird, in

allen diesen Fällen entstehen aus den gestockten Säften mikroskopische Organismen, die sich je nach der Natur der Pflanzen und nach den Verhältnissen zu Mehltau, Schimmel, Blattläusen, Schildläusen, Milbenipinnen gestalten. Die Verhütung der Schildläuse wird daher in Gewächshäusern, welche gegen das Eindringen des Ungeziefers von außen gesichert sind, einfach dadurch bewirkt, daß man die Pflanzen unter ihnen angemessenen naturgemäßen Verhältnissen erzieht. Da es jedoch nicht immer in unserer Macht steht, alle feindseligen Einwirkungen von ihnen abzuhalten und eine mehr oder minder bedeutende Erkrankung zu verhüten, in deren Folge Ungeziefer entsteht, so muß man fortwährende Aufmerksamkeit anwenden, um sofort das Entstehen zu bemerken und entgegen zu arbeiten, indem man jede Schildlaus sofort zerdrückt. Auf diese Weise wird das Ungeziefer nie überhand nehmen. Ist aber diese Aufmerksamkeit eine ungenügende, ist ein Gewächs von Schildläusen überzogen, dann bleibt ebenfalls nichts weiter übrig, als einen besonderen, umsichtigen und aufmerksamen Mann anzustellen, der sämtliche Schildläuse mit einem Holzspänchen von den Blättern abhebt, auf einem Papier sammelt und dann verbrennt. Nach dem Ableben der Schildläuse werden die Blätter mittels eines weichen Schwammes mit Wasser abgewaschen. Will man diesem Wasser behufs größerer Wirksamkeit etwas Salz oder Quecksilbersublimat zusetzen, so darf dies nur dann geschehen, wenn man die Gewächse unmittelbar durch starkes Überbrausen mit reinem Wasser wieder abwaschen kann. Geschieht dies nicht, so verstopfen die zurückbleibenden Salze die Poren der Blätter und bewirken dadurch ein neues Siechtum der Gewächse. Hinterher sind die Gewächse täglich zu untersuchen, um jede sich zeigende Schildlaus sofort zu töten.

Möglichst schon vom Spätherbst an hat sorgfältigstes und gründlichstes Abfrägen der Schildläuse mit stumpfen, quergehaltenen Messern, Sauberbürsten und Abwaschen der Rinde einzutreten: das Waschen geschieht am besten mit einer Lösung von grüner Seife in Wasser mittels scharfer

Stahldrahtbürsten, dann Überpinseln mit einer die Insekten tötenden Flüssigkeit und schließlich Anbringen eines Kalkmilchanstriches. Alle von der Schildlaus befallenen Obsthölzteile sind wegzuschneiden und zu verbrennen. Häufiges Ausprühen der von der Schildlaus befallenen Gehölze im Spätfrühling und im Sommer tragen viel zur Vernichtung der Jungen der Schildläuse bei.

Die San José-Schildlaus, die die gefürchtete Verbreitung in Deutschland nicht gefunden hat, wird mittels Petroleumemulsionen und Blausäure vernichtet. Früchte, die von der Laus befallen sind, werden in heiße Kalilauge getaucht oder Schwefeldämpfen oder den Dämpfen 65–90° C heißen Wassers ausgesetzt; bei der Kali- und Schwefelbehandlung müssen die Früchte dann mit Wasser sorgfältig gewaschen werden.

### Mittel gegen Schnecken.

Von den vielen Arten von Schnecken ist die sogenannte Ackerschnecke am gefährlichsten und am meisten Schaden bringend. Sie kommt besonders in und nach naßkalten Frühjahrten vor, oft in einer solchen Menge, daß sie des Nachts auf Äckern und in Gärten starke Zerstörung anrichtet. Die verschiedenen Mittel, welche man zu der Vertilgung oder Vertreibung vorgeschlagen hat (Austreuen von Kalk, Eisenvitriol, Salz) bleiben teils erfolglos, teils sind sie zu teuer und werden sogar den Gewächsen noch schädlicher als den Schnecken. Auch das Austreuen von Gerstenspren, Flachs- schäbe, Fichtennadeln und ähnlichen stacheligen Dingen ist ganz erfolglos. Einzig sicher ist das Einfangen, welches nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang mit der Laterne vorgenommen wird. Man kann ferner feuchte Stroh- bündel, besonders aus Maishöfchen, zerhackte Kürbisse, süße Äpfel, Möhren, Salatblätter auf die Beete legen, sucht die Schnecken vor Sonnenaufgang, ehe sie sich wieder in die Erde verkrochen haben, von diesem Köder ab und tötet sie dann durch Aufgießen von heißem Wasser oder Auf-

streuen von ungelöschtem Kalk. Enten, Truthühner, Ekltern, Krähen und viele andere Vögel, auch Frösche, Kröten, Eidechsen, Laufkäfer und Waldameisen vertilgen die Schnecken; namentlich ist die Bevölkerung der Gärten mit Kröten, diesen von der Rohheit und Grausamkeit aus Unwissen verfolgten Tieren, von großem Nutzen.

C. W. Worsdell hat zahlreiche Versuche ausgeführt und Studien gemacht, um die Schnecken, die so schädlichen und dabei so schwer abzuwehrenden Feinde unserer Gärten, zu vernichten.

Das Tannin scheint zu jenen Stoffen zu gehören, die den Schnecken sehr unangenehm sind. Wie ein Versuch beweist, bleibt die Möhre (gelbe Rübe), die wegen ihres süßen Geschmacks bei gänzlicher Abwesenheit von Tannin von den Schnecken mit Vorliebe aufgesucht wird, sofort von den schleimigen Liebhabern verschont, wenn sie mit einer 1%igen Tanninlösung benetzt wird, ja man kann die Acker-*schnecke* (*Limax agrestis*), die man in verdächtiger Nähe einer Möhrenpflanzung bemerkt, sofort vertreiben, wenn man sie vermittels eines Zerstäubers mit einer Tanninlösung selbst in tausendfacher Verdünnung besprengt. Man hat mit Sicherheit erkannt, daß die Blätter von Pflanzen, wie z. B. die von *Vallis neria* (Sumpfschraube), die Tannin enthalten, niemals von *Glanorbis*- und *Limnaeus*-Arten angegriffen werden; sowie man aber die Blätter ihres natürlichen Tanningehaltes beraubt, werden sie schnell abgenagt.

Es scheint, daß auch saure Säfte die gleiche abstoßende Wirkung auf die gefräßigen Tiere ausüben. Jedenfalls werden Begonien und Sauerampfer (*Rumex acetosella*), die ziemlich reich an oxalsaurem Kalium sind, niemals von den Schnecken heimgesucht. Man kann sich leicht durch einen direkten Versuch von der Abicheu überzeugen, die die Schnecken vor diesem Salz haben. Legt man einer Acker- oder Garten-*schnecke* (*Limax agrestis* oder *Arion hortensis*) Stücke von Möhren vor, die mit einer Lösung des Salzes benetzt sind, so werden die Tiere selbst nach mehrtägigem Fasten

die sonst so beliebten Leckerbissen verschmähen. Selbst bei 1000facher Verdünnung erweist sich eine wässrige Lösung des Salzes noch wirksam.

Die Schnecken meiden auch Pflanzen, deren Saare jaure Stoffe ausscheiden, wie es bei der Nachtkerze (*Oenothera*) der Fall ist. Gleichermasse schützen ätherische Öle die Pflanzen; so hüten sich die Weinbergschnecken sorgfältig, die Raute oder Pfefferminze anzugreifen. Was endlich Blätter anbelangt, die Bitterstoffe enthalten, wie der gelbe Enzian (*Gentiana lutea*) oder die Futterkleezottenblume (*Menyanthes trifoliata*), so bleiben sie nur im Frühling, wenn sie noch jung sind, verschont; im Herbst dagegen scheint die Wirksamkeit der Bitterstoffe gänzlich zu verschwinden.

Alle diese Ergebnisse sind sehr interessant, da sie zeigen, daß die Pflanzen über ein ganzes System von Schutzmitteln für ihren Organismus verfügen und uns gleichzeitig auch Fingerzeige dafür geben, wie sich mit Erfolg die Feinde der Gartengewächse bekämpfen lassen.

## Mittel gegen Schädlinge der Spargelpflanzen (Spargelkäfer, Spargelfliegen, Spargelrost).

### 1. Gegen Spargelkäfer.

Man unterscheidet (nach »Konserven-Zeitung«) mehrere Arten von Spargelkäfern; am häufigsten tritt der erzblaue Spargelkäfer oder das Spargelhähnchen (*Crioceris asparagi*), der rote zwölfpunktige (*C. duodecimpunctata*) und der vierzehnpunktige Spargelkäfer (*C. quatuordecimpunctata*) auf, seltener der rötliche fünfpunktige Spargelkäfer (*C. quinquepunctata*) und der dunklere Feldspargelkäfer (*C. campestris*). Wenn im Frühjahr der Spargel aufsteht, kommen die kleinen Käfer zum Vorschein und zerfressen nicht nur die Blätter, sondern sogar die Stengel und Äste. Die Weibchen kleben ihre schwarzen, länglichen Eier einzeln oder in Reihen an die Blätter und Äste der Spargelpflanzen. Nach kurzer Zeit schlüpfen die außerordentlich gefräßigen

gelblichgrünen Larven aus und beteiligen sich an dem von den Käfern begonnenen Zerstörungswerk. Die Spargelpflanzen werden total kahl gefressen, daher in ihrem Wachstum gehemmt und sterben häufig ganz ab. Im September und auch schon im August verpuppen sich die ausgewachsenen Larven in der Erde, um sich schon nach zwei bis drei Wochen in Käfer zu verwandeln. Es können zwei, in trockenen Jahren sogar drei Generationen vorkommen. Die zweite Generation des zwölfpunktigen Spargelkäfers lebt nur in den Beeren und ist daher nicht so schädlich wie die erste Generation, die auch die Blätter abfrisst. In jeder Beere lebt nur eine Larve, welche dieselbe durch gänzliches Ausfressen verdirbt. Die befallenen Beeren röten sich früher als die gesunden und sind dadurch leicht erkennbar. Die ausgewachsenen Larven bohren sich aus der Beere heraus und lassen sich auf die Erde fallen, wo sie sich verpuppen.

Zur Bekämpfung empfiehlt sich wiederholtes Besprühen mit Petroleumseifenbrühe oder kräftiges Durchziehen der Spargelpflanzen durch die geschlossene Hand. Ein anderes Mittel besteht darin, die Käfer, die sich leicht fallen lassen, in Tüchern aufzufangen und zu vernichten.

In einigen Spargelplantagen, wo die Käfer besonders stark auftraten, hat man ein eigenartiges Mittel zur Bekämpfung der Schädlinge angewendet, nämlich das Abjuchen derselben durch Hühner, welche, wie bekannt, mit wahrer Eier alle erdenklichen Insekten fressen. In den betreffenden Plantagen gingen die Hühner bei ihrer Vertilgungsarbeit so gewissenhaft zu Werke, daß sich nach einiger Zeit kaum noch Käfer fanden. Bei feldmäßigem Spargelbau werden die Hühner mit der sogenannten Hühnerpost auf das Feld hinausgefahren. Die Hühnerpost ist ein fahrbarer Hühnerstall, welcher mit allen erforderlichen Einrichtungen, wie Sitztangen, Nestern, Leitern für den Aufstieg versehen ist. Sie fährt auf zwei hohen Rädern, deren Spurweite so gewählt ist, daß dieselben in den Zwischenräumen der Spargelbeete laufen und das Beet zwischen sich lassen. Bei großen Plantagen ist es erforderlich, daß der Standort des Hühner-

stalles in einer geordneten Reihenfolge gewechselt wird, damit die ganze Fläche gleichmäßig vorgenommen wird. So eigenartig dieses Verfahren im ersten Augenblick erscheinen wird, so muß doch seine Zweckmäßigkeit und Anwendbarkeit nach einigem Überlegen jedem einleuchten.

## 2. Gegen Spargelfliegen.

Das sich durch seine braun und weiß gefleckten Flügel kennzeichnende Weibchen legt seine Eier ungefähr von Anfang bis Ende Mai ab. Nicht nur unter die Schuppen der aus der Erde hervorgekommenen Spargelpflanzen, welche dann bei ihrem Weiterwachsen meist einen gekrümmten, verkrüppelten Stengel geben, sondern auch, entgegen den Mitteilungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes nach Bardenwerber-Buschdorf, der ausgedehnte Spargelkulturen besitzt, vermittels seines langen Legestachels in einiger Nähe über dem Boden in das Mark der noch weichen Spargelstengel. Da diese Eierablage in den Monat Mai fällt, die Ertrag gebenden Spargelpflanzen in Deutschland aber gewöhnlich bis zum 24. Juni gestochen werden, so sind es nur die Neupflanzungen und zwei- bis dreijährigen Anlagen, die durch die Spargelfliege nicht nur arg geschädigt, sondern sogar vernichtet werden können. Die aus den Eiern kriechenden Larven nähren sich von dem Innern des Stengels, indem sie in denselben Gänge bohren; solche Stengel lassen gewöhnlich schon im Sommer durch ihre etwas bräunliche Färbung auf das Vorhandensein von Larven in ihnen schließen. Denn nicht immer sind die befallenen Stengel krumm, sondern, zumal wenn dieselben etwas später angestochen wurden, sieht man ihnen sehr wenig an. Im Herbst begeben sich die Larven in den Stengeln abwärts, um sich in denselben 10 bis 15 cm unter der Erdoberfläche zu verpuppen. Beim Abschneiden des Spargelkrautes im Herbst kann man diejenigen Stengel, welche den Puppen als Winterquartiere dienen, sehr leicht dadurch erkennen, daß sich an der Fläche die nach unten führenden Gänge zeigen.



Also nicht in dem abge schnittenen Kraut, sondern in den Stengelstücken, welche beim Abschneiden unter der Erde verbleiben, überwintern die Puppen. Die Maden der Spargelfliege ziehen sich deshalb in den Stengeln so weit nach unten, selbst bis in die Wurzeln, damit die Puppen (Tonnenpüppchen), in welche die Larven sich bis Ende Juli verwandeln, beim Abfaulen des unterirdischen Stengels in die Erde gelangen, wo sie bis zum nächsten Frühjahr verbleiben. Dann kommen die ersten Fliegen zum Vorschein und stellen sich in den Spargelbeeten ein, wo sie sich paaren. Am Morgen, solange es noch kühl ist, sitzen sie dann auf der Erde oder an den Köpfen der Spargel. Die Maden kriechen nach zwei bis drei Wochen aus und beginnen ihr Zerstörungswerk. Bisweilen findet man acht oder mehr Maden in einem Stengel und in sehr warmen Jahren entwickelt sich aus ihnen noch ein zweites Geschlecht.

Zur Vernichtung der Schädlinge steckt man etwa 50 cm lange Stäbe, abgeschält, so daß sie weiß erscheinen, in Entfernung von einigen Metern auf die Beete und bestreicht sie 10 bis 20 cm breit mit Raupenleim, der Ausstrich ist allenfalls einige Male zu erneuern. Auch kann man zeitig am Morgen, solange die Fliegen noch schläfrig und von der Kälte der Nacht erstarrt sind, sie an den Spargelköpfen fangen und töten. Ferner schneidet man alle mit Maden besetzten, also die gelb gewordenen Stengel, dicht über der Erde ab und verbrennt dieselben. Will man dieses letztere später tun, so sitzen die Maden schon tiefer und muß man den Stengel daher unter der Erde abschneiden, jedoch vorsichtig, ohne die Wurzelklauen zu verletzen. Wenn man im Herbst alle Stengel abschneidet, so verbrennt man dieselben vorsichtshalber, denn man vernichtet gleichzeitig den so häufig vorkommenden Spargelrost. Besser sollen sich die 1 m langen Stäbe, ebenfalls mit Leim bestreichen, bewahrt haben, da die über den Spargelbeeten schwebenden Fliegen doch wohl öfter einen Ruhepunkt suchen. Durch das Wegfangen der Fliegen könnte man sich schon von vornherein vor Schaden bewahren, da jedoch ein wirklich probates

Mittel hierfür noch nicht bekannt ist, ist das Abschneiden der Stengel im Herbst, mindestens 10 cm unter der Erdoberfläche, und Verbrennen am meisten zu empfehlen.

Gegen Spargelrost und gegen die Spargelfliege läßt sich leicht ankämpfen durch Abstechen des Spargellaubes im Herbst eines jeden Jahres, und zwar spätestens bis 15. November möglichst tief unter der Erde, nicht unter 10 cm, und Verbrennen desselben an Ort und Stelle, wodurch die Wintersporen des Rostpilzes vernichtet werden. Ferner können diese Schädlinge auch dadurch vertilgt werden, daß man die ausgetriebenen grünen Stauden frühzeitig mit einer 1:5 bis 2%igen Kupferkalkbrühe, wie man sie gegen *Peronospora* bei Weinreben anwendet, besprüht.

### Mittel gegen die Wachsmotte in Bienenstöcken.

Die Wachsmotte ist eines der bienenfeindlichen Insekten, die durch ihre Larven (Raupen oder Raupen) bedeutenden Schaden anrichten kann. Vom zeitigen Frühjahr bis spät in den Herbst hinein sieht man des abends in den Dämmerstunden die Wachsmotte um die Fluglöcher schwirren. Sie legen ihre kleinen runden, blaßgelben Eier in die Wachszellen, das Gemülle und in die Schlupfwinkel in und an dem Stocke ab. Die aus den Eiern entstehenden Maden fressen sich sehr bald in die Wachswand der Zelle ein und schützen sich in ihrem silzigen Geispinst gegen die Angriffe der Bienen. Bei schwachen Völkern, die sich dieser lästigen Gäste nicht erwehren können, ist das Zerstörungswerk in kurzer Zeit vollendet und der Wabenbau vernichtet. Sobald die Bienen merken, daß sie des Ungeziefers nicht mehr Herr werden können und man ihnen nicht zu Hilfe kommt, verlassen sie ihre Wohnung und ziehen als sogenannte Motten-schwärme aus, um sich bei andern Völkern einzubetteln. Vor diesen Gefahren kann man die Bienenstöcke schützen, wenn man in der Nähe des Bienenstandes nach Eintritt der Dunkelheit eine Schüssel mit Öl aufstellt, in welchem ein

brennender Docht schwimmt. Die Motten fliegen in das Licht und verbrennen sich oder fallen in das Öl.

### Mittel gegen den Weidenbohrer.

Der Weidenbohrer ist ein gefährlicher Feind der Obstbäume. Der dickleibige graue Schmetterling legt seine Eier an die Stämme, worauf die daraus hervorgehenden jungen Räupchen sich in das Innere des Stammes einbohren und mit zunehmendem Alter immer größere Gänge ausfreissen. Es sind dadurch oft schon große Obstbäume zugrunde gerichtet worden. Natürlich wird man die Schmetterlinge, wenn man sie kennt und antrifft, töten und ebenso auch die Raupen, die man etwa in der Nähe der Bäume herumlaufen sieht. Um die Raupen im Innern der Bäume, wo sie sich durch die ausgestoßenen Exkremente verraten, zu töten, stoßert man ihnen mit Messern und biegsamen Drähten nach. Gelingt es nicht in solcher Weise, kann man auch kleine Wattabäuschchen, die man vorher in Schwefelkohlenstoff tränkt, in die Gänge hineinschieben und sodann die Öffnungen sofort mit nassem Lehm verstreichen. Die Tiere werden durch die Schwefelkohlenstoffdämpfe getötet. Sind alte Stämme sehr stark zerbohrt, so opfert man sie besser, um andere Bäume vor Schaden zu bewahren; natürlich sind dann die von dem Insekt befallenen Teile des Baumes sofort zu spalten und die Tiere zu vernichten, sonst kriechen sie aus den Löchern und suchen andere Bäume zu erreichen. In der Nähe befindliche alte Weiden sollen untersucht und falls sie von dem Weidenbohrer befallen sind, entfernt werden. Gerade von den Weiden aus gelangt dieser Feind häufig an die Obstbäume.

### Mittel gegen Würmer in der Erde (Regenwürmer, Drahtwürmer).

Die Regenwürmer leben meist von tierischem Dünger und fetter Erde, freissen aber auch Pflanzenwurzeln und

selbst junge Pflanzen, die sie in ihre senkrechten Löcher hinabziehen. In Blumentöpfen sind sie sehr schädlich, da sie die Erde durchlöchern, ausmagern und durch ihren Schleim verkleistern, wodurch die Feuchtigkeit abgehalten und die Wurzeln aus ihrer Lage gebracht werden. Um sie zu entfernen, klopft man an den Topf oder Wurzelballen, worauf sie an der Erdoberfläche erscheinen, weil sie Erschütterungen nicht vertragen können. Auch verlassen sie den Erdballen, wenn man die Oberfläche der Erde im Topfe allenthalben mit weichem Papier bedeckt und Schwefelpulver oder Kalkstaub darüber bringt; sie können dann an der Oberfläche nicht zum Atmen gelangen und kriechen entweder unten hinaus oder sterben. Stellt man die Blumentöpfe auf eine 10 bis 12 cm hohe Schicht von Kalk, Koks, Steinkohlen- oder Braunkohlenabfall, so geht kein Regenwurm in dieselben. Auf den Beeten werden sie am besten durch Dienruß oder frische Gerberlohe (beide breitet man auf der Oberfläche aus), durch abgeklärtes Kalkwasser, durch Abkochungen von Hanf, von grünen Rußblättern und Rußschalen und durch fleißiges Auflesen des Nachts oder nach einem warmen Regen, zu welchen Zeiten sie in Unzahl auf der Oberfläche des Bodens erscheinen, besonders aber beim Umgraben des Bodens, vertilgt.

Wenn man geichabte Möhren des Abends in die Wege der Beete legt, so kann man am anderen Morgen eine Menge Regenwürmer von ihnen ablesen, denn Möhren sind ihre Lieblingspeise und sie fressen sich davon so voll, daß sie nicht in ihre Löcher zurückkriechen können. Das Erschüttern des Erdbodens durch Stampfen oder Schlagen oder auch das Einschlagen von Pfählen, die man hin- und herbewegt, ist ebenfalls ein gutes Mittel, die Regenwürmer aus der Erde hervorzulocken, aber aus leicht begreiflichen Gründen nicht überall anwendbar. Ihre größten Feinde sind Igel, Maulwürfe, Enten und Hühner, von denen sie gierig verzehrt werden.

Wenn man gewahr wird, daß diese ungeladenen ekelhaften Gäste sich eingestellt haben und die jungen Wurzeln

zernagen, so darf man nur die Pflanzen mit einem Abjud begießen, der aus frischen Walnußblättern, über die siedendes Wasser gegossen wurde, gebildet ist. Gießt man diesen Abjud nach hinreichendem Erkalten auf die die Würmer enthaltende Erde, so gehen dieselben alle an die Oberfläche und können leicht aufgelesen und getötet werden. Das Verfahren ist so lange zu wiederholen, bis alle Würmer beseitigt sind.

### Gegen den Drahtwurm.

In Gärten und Weinanlagen bedient man sich mit Vorteil der Kartoffel zur Vertilgung dieses Schädlings; kleine Knollen schneidet man in die Hälfte, größere in mehrere Teile und beim Einschulen der veredelten Reben oder beim Auspflanzen im Weingarten am Standort, namentlich bei stratifizierten Veredlungen, legt man ein Stück Kartoffel mit frischer Schnittfläche auf den Boden. In diesen Kartoffeln nagt der Drahtwurm mit Vorliebe und bohrt sich anstatt in den jungen Rebentrieb in diesen Leckerbissen hinein. Diese Ablenkung des Schädlings in den Kartoffelabschnitt gelingt ganz zuverlässig und in einem solchen Fangstück sind oft zwei bis drei der Larven eingebohrt, die beim Lockern und Lüften des Bodens herausgenommen und vernichtet werden müssen.

### Mittel gegen die Zwiebelfliege.

Die Zwiebelfliege erinnert im Habitus und in der Färbung einigermaßen an die gemeine lästige Mückenfliege, ist aber nur etwa halb so groß. Die Zwiebelfliege erscheint schon Ende April, spätestens im ersten Drittel des Mai aus der in der Erde überwinternden Puppe. In der Regel werden die Eier in großer Anzahl um den Teil der jungen Pflanze abgelegt, der sich dicht über der Erde befindet (Wurzelhals). Die ausgeschlüpften zarten Maden steigen zwischen den Blättern hinab bis zur Basis derselben, dem

markigen sogenannten Zwiebelkuchen, wohin sie nach allen Richtungen Gänge arbeiten. Die Zwiebelstheibe und die ganzen anderen Teile der Zwiebelstheile gehen in Fäulnis über. Die bewohnte Partie verwandelt sich in eine braune übelriechende jauchenartige Masse, worin jedoch die Larven ein gedeihliches Dasein führen. Bis gegen Ende Juni sind sie 5 bis 6 mm lang und zur Verwandlung reif. Die befallene Zwiebel verrät das Befallensein durch den Schädling auf den ersten Blick durch das allgemeine Welken und Gelbwerden der Blätter. Unweit der vollständig zersetzten Zwiebel verwandelt sich die Larve in der Erde in eine walzenförmige, rotbraune, geringelte, sogenannte Tonnenpuppe. Nach einiger Ruhe von etwa zehn Tagen geht daraus die Fliege hervor. Diese Fliege überwintert im Puppenzustande, um erst im nächsten Frühjahr das Insekt zu liefern. Als Bekämpfungsmittel dieses Schädlings ist dickes Bestreuen der Zwiebelquartiere mit Asche und Ruß zu empfehlen, wobei man hier und da einzelne Pflanzen als Fangstellen unbestreut läßt, wodurch diese erfahrungsgemäß für die Ablage der Eier groß gezogen werden. Jede befallene Zwiebel ist ausziehen und in ein Jauchefäß zu werfen. Ferner empfiehlt es sich, den Anbau der Zwiebeln, wenn der Schädling zu sehr überhand nimmt, für einige Jahre in dem heimgesuchten Gelände aussetzen.

### Singvögel als Mittel gegen Insekten an Obstbäumen.

Jenen Schädlingen des Obstes, welche sich an den Gipfeln und Spitzen der Bäume, an den kleinen Ästen und Zweigen, an Knospen und Blüten aufhalten, ist mit den gewöhnlichen Mitteln nicht beizukommen und hier leisten insektenfressende Vögel, wie die kleine flinke Meise, die unermüdlich von Ast zu Ast fliegt, von Zweig zu Zweig hüpf, geradezu unschätzbare Dienste. Die Meise nimmt fast nur animalische Nahrung zu sich und ist deshalb darauf angewiesen, namentlich in der Winterszeit, die Bäume, Äste

und Zweige nach Insekten, Puppen, Larven usw. genau abzusuchen. Es ist daher naheliegend, auf Mittel und Wege zu sinnen, wie man die Vermehrung der Meisen am besten und raschesten ermöglichen kann und geschieht dies durch Aushängen von Nistkästchen. Die beste Jahreszeit zum Aushängen der Nistkästchen ist der Winter, weil sie zu dieser Zeit von den Meisen als Schlafstellen benützt werden und weil sich hierbei die sonst so scheuen Meisen an die betreffenden Wohnungen leicht gewöhnen. Außerdem sind auch die im Winter ausgehängten Nistkästchen bis zum Frühjahr etwas grau geworden und werden dann von den Meisen lieber als Brutstätten angenommen. Es erfüllen jedoch auch die in den anderen Jahreszeiten aufgehängten Kästchen vollkommen den Zweck. Man hängt die Kästchen in 2½ bis 4 m Höhe an Bäumen an nicht zu lichten Stellen, an ruhigen Gebäuden, das Flugloch nach Sonnenaufgang gerichtet, auf. Die Größe des letzteren ist so zu wählen, daß Sperlinge nicht durch dasselbe schlüpfen können.

## Vorrichtungen für die Anwendung der chemischen Vertilgungsmittel.

Die als chemische Vertilgungsmittel bekannten und verwendeten Substanzen sind entweder Flüssigkeiten, Lösungen von Salzen in Wasser oder wässrigen Emulsionen von öligen oder teerartigen Präparaten oder aber feine Pulver, welche auf die zu schützenden Pflanzen aufgebracht werden müssen. Das ursprünglich bei den Flüssigkeiten geübte Versprühen mit einfachen Spritzen oder mittels Brausen hat sich nicht bewährt, nachdem die Pflanzen einerseits nicht genügend von dem Mittel zugeführt erhielten, anderseits ein zu großer Verbrauch an demselben stattfand. Man hat daher besondere Vorrichtungen konstruiert, bei denen die Flüssig-

feiten durch ziemlich starken Luftdruck in einen staubartigen Regen verwandelt werden.

Auch die pulverigen Schutz- und Vertilgungsmittel können mit voller Ausnützung ihrer Wirksamkeit nur dann verwendet werden, wenn ebenfalls nur ein Bestäuben in einer äußerst dünnen Schicht stattfindet und der feine pulverige Überzug sich auf alle Teile der Pflanze gleichmäßig verbreitet. Hierfür dienen Pulver- und Schwefelzerstäubungsapparate, von denen einige der hauptsächlichsten in der Folge hier angeführt werden.

### **Flüssigkeitszerstäuber (Spritzen für Pflanzen, Bäume, Nebel usw.).**


Für eine tadellose Wirksamkeit der auf Pflanzen jeder Art aufzubringenden Flüssigkeiten, welche bestimmt sind, Insekten zu vertilgen, ist es erforderlich, daß dieselben in möglichst feiner Verteilung, also eigentlich in Staubform, auf die ersteren kommen, somit auch in den feinsten Vertiefungen und auf die zartesten Blätter wirken, ohne daß die letzteren dabei leiden. Dazu tritt aber noch das Moment der Sparbarkeit und es sind daher alle mechanischen Vorrichtungen vorzuziehen, bei denen das Aufbringen nicht in Form größerer, sondern möglichst feiner, staubartiger Form stattfindet. Die für die Zerstäubung verwendeten Spritzen, wie sie allgemein genannt werden, sind der leichteren Bewegung halber fast ausschließlich tragbar, aber doch in sehr verschiedenen Größen, beziehungsweise mit sehr verschiedenem Inhalt, so daß sie für alle Zwecke genügen können, sie werden aber auch auf Rädern fahrbar geliefert. In allen Fällen wird bei den Spritzen mittels Pumpen ein ziemlich hoher Druck erzeugt, der als notwendig für eine gute Wirksamkeit erachtet wurde.

Die Zahl der auf dem Markt befindlichen Konstruktionen ist eine ziemlich große und sie sind mit besonderen Benennungen belegt, wie Persekt, Ceres, Fix, Pomolog, Palatia und andere; hier soll aber nur eine dieser Vor-



richtungen herausgegriffen werden, die sich durch besondere Wirksamkeit und dabei gefälliges Aussehen auszeichnet. Es ist dies die Maschine »Automax« (Fig. 1), die sowohl als


Fig. 1.



Pflanzenspritze »Automax«.

Weinberg- und Pflanzenspritze, wie auch als Baum und Hopfenspritze dient. Die Schläuche sind je nach dem in Anwendung kommenden Vertilgungsmittel auswechselbar, so daß sie für verschiedene Flüssigkeiten benützt werden können. Der Gang der Spritze ist leicht bei raschester Arbeit durch

Fig. 2.



Schwefelkohlenstoff-Injektor von  
Rudolf Kraja in Wien.

Kolben mit geſchlich geſchükter Luſtzuführung, Nachpumpen während der Arbeit iſt inſolge der Kontrollfüllvorrichtung überflüſſig, da hoher Druck bis zum letzten Tropfen vorhanden iſt. Die Apparate ſind auf einen Druck von acht Atmosphären geprüft und man erzielt unerreichte Feinheit der Zerſtäubung bei denkbar geringſtem Flüſſigkeitsverbrauch. Während der Arbeit ſind beide Hände frei, inſolge deſſen eine gründliche gleichmäßige Beſtäubung möglich und der Erfolg der Spritzarbeit um ſo ſicherer iſt. Jeder Apparat beſitzt eine beſondere Kontrollfüllvorrichtung, welche die bequemſte und ſicherſte Füllung ſowie die vollſtändige Entleerung der Maſchine und die tadelloſe Zerſtäubung bis zum letzten Reſt garantiert. Will man aus der unter Druck befindlichen Spritze die Luſt entweichen laſſen, ſo geſchieht dies ohne jede Gefahr mittels der Kontrollfüllſchraube. Glas erfüllt dieſen Zweck nicht, nötigt vielmehr, ſich beim Einfüllen fortwährend zu bücken, um den Stand der Flüſſigkeit zu ſehen, der ſich aber bei der Kontrollfüll-


schraube von selbst erkennen läßt und bricht schließlich durch Anstoßen sofort entzwei. Eine weitere Vervollkommnung des »Automax« besteht darin, daß der Füllseiler, an die Kolbenstange gesteckt, fest in der Spitze sitzt und sicheren Halt hat. Bei Spritzen anderer Systeme war der Einfüllseiler lose in der Spritze gefesselt, wodurch ein rasches Einfüllen unmöglich war und eine Menge Spritzflüssigkeit verloren ging. Auch hier ist die »Automax« vorbildlich. Der Kolben der Luftpumpe erzeugt in wesentlich kürzerer Zeit einen Druck von fünf Atmosphären als jeder andere Kolben. Während beim Aufwärtsbewegen des Automaxkolbens zwischen diesem und der Kolbenstange die Luft hindurch geht und der Kolben auf diese Weise ventilartig wirkt, muß der Kolben anderer Systeme die Luft zwischen Pumpenrohr und Ledermanchette hindurchpressen, wodurch sowohl ein größerer Kraftaufwand nötig wird, als auch die Kolbenmanchette leidet, ihre Haltbarkeit verliert und die Erzeugung des notwendigen Druckes eine längere Zeit in Anspruch nimmt, als dies hier der Fall ist. Leichtes, schnelles Arbeiten und Haltbarkeit der einzelnen Teile sind aber bei einer Spritze die Hauptsache. Das Manometer ist liegend angeordnet, um beim Auspumpen den Stand des Druckes stets leicht ablesen zu können; es ist kein lästiges Bücken zu diesem Zwecke notwendig. Die Konstruktion des Ventils ist muster-gültig; es können grobe Bestandteile, wie Sandkörnchen usw., sich nicht unter dasselbe einnisten und die Funktion der Spritze beeinträchtigen. Das Ventrohr ist mit einem auswechselbaren Filtersieb aus gelochtem Messingrohr versehen, welches alle Körner und Unreinigkeiten zurückbehält bevor sie in den Verstäuber gelangen. Das Ventrohr selbst besteht aus zwei Teilen und kann zwecks Reinigung des Filtersiebes leicht auseinandergenommen beziehungsweise wieder zusammen-geschraubt werden.

### Schwefelkohlenstoff-Injektor.

Fig. 2 zeigt einen Schwefelkohlenstoff-Injektor neuester Konstruktion; der Behälter für den Schwefelkohlenstoff wird,

abweichend von den seitherigen Ausführungen, nicht mehr am Apparat selbst angebracht, sondern der Behälter wird am Rücken getragen, wodurch das Arbeiten ganz wesentlich erleichtert wird. Der Injektor wird in drei Größen angefertigt, und zwar einer mit 40 cm langer Lanze, die in den Boden gestoßen wird zur Bekämpfung der Reblaus, eine zweite Ausführung mit etwa 20 cm langer Lanze zur Vernichtung von Larven und Engerlingen und eine dritte Art mit 40 cm langer Lanze zur Behandlung von Weinberg-

Fig. 3.



Schwefelzerstäuber „Rapid“ von Rudolf Kraja in Wien.

neuanlagen und der Stufen von alten Rebfeldern. Die ersten beiden Apparate spritzen 1 bis 10 g, der letztere 5 bis 50 g Schwefelkohlenstoff auf jeden Pumpenstoß aus. Der Apparat wird bei Inbetriebsetzung einfach in die gewünschte Tiefe mit Hilfe des Fußes gestoßen; die Tiefe kann an dem Fußtritt, der verstellbar ist, reguliert werden.

### **Pulver- und Schwefelzerstäubungsapparate.**

Auch die Schwefelzerstäubungsvorrichtungen sind in der Ausführung verschieden, und der einfachste derselben besteht aus einem starken Blasebalg aus Holz, an dessen

linker Seite ein Blechbehälter angebracht ist, der die Schwefel- und gleichzeitig die Zerreib- und Reguliervorrichtung aufnimmt. In dem Apparat zerreibt eine Bürste, die mit den Bewegungen des Blasebalges in Verbindung steht, den Schwefel und arbeitet solchen durch ein angebrachtes Sieb.

Fig. 4.




Einfach wirkender Schwefelverhäufer „Vulkan“ von Karl May in Ludwigshafen.

Von hier gelangt derselbe in den Luftkanal, um von dem durch den Blasebalg erzeugten Wind erfasst und als feine Staubwolke durch das Mundstück des Blechrohres ausgetrieben zu werden.

Der Zerstäubungsapparat „Napid“ von Rudolf Kraja in Wien (Fig. 3) hat eine dem Luftventilator ähnliche Konstruktion und ist aus sehr starkem Blech solid hergestellt.

Man hängt denselben, mit dem Ausblaser nach vorn gerichtet, um, den Gürtel über der rechten Schulter unterhalb des linken Armes und mit der rechten Hand die Kurbel drehend, richtet man mit der linken Hand das Zerstäubungsrohr. Der ungemein feine Luftzug, welcher die gleichzeitige

Fig. 5.



Doppelt wirkender Schwefelzerstäuber von Karl Blas in Ludwigshafen.

und gleichmäßige feine Ausstäubung des Schwefelpulvers bewirkt, wird durch im Innern befindliche Windflügel erzeugt; dieselben werden durch ein mit Kurbel versehenes Zahnrad betrieben, der Schwefel wird mittels einer Schnecke, welche mit der Welle des Zahnrades in Verbindung steht,

in gleichmäßiger Weise den Windflügeln zugeführt; außerdem befindet sich im Innern des Apparates ein Rührwerk, welches allenfalls vorhandene Klumpen zerteilt.

Ein besonders gut konstruierter Apparat ist der Schwefelzerstäuber »Vulkan« von Karl Platz in Ludwigshafen. Derselbe, in Fig. 4 abgebildet, wird auf dem Rücken getragen wie die Weinbergspitzen und mittels eines Hebels in Bewegung gesetzt. Der Behälter faßt etwa 8 kg Schwefel, welche Menge ein dauerndes Arbeiten gestattet und das lästige und zeitraubende Auffüllen vermeidet. Die Bewegung des Apparates ist eine durchaus geräuschlose, alle Organe sind höchst einfach auseinander zu nehmen und zu zerlegen, jeder Arbeiter kann dies bewerkstelligen. Der Apparat ist durch Lösen von drei Schrauben zerlegbar, besitzt ein herausnehmbares, auswechselbares Sieb, dessen Konstruktion beim doppelwirkenden Apparat sichtbar ist (Fig. 5). Einen wesentlichen Vorteil bietet der neue verbesserte Apparat der bisherigen Konstruktion gegenüber dadurch, daß das Nachstellen der Reibungsvorrichtung ohne dieselbe aus dem Behälter herausnehmen zu müssen, von jedem Arbeiter bewerkstelligt werden kann. Die bei dem Apparat verwendeten Stahlbrahtbürsten besitzen übrigens eine nahezu unbegrenzte Dauerhaftigkeit. Das Nachstellen der Vorrichtung geschieht selbsttätig, da die angebrachten Federn das fortwährende Auslaufen der Bürste auf der Verreibungsfläche im Gefolge haben. Auch die verwendeten Gummiventile können nicht stecken bleiben und gewährleisten hermetisches Abgeschlossen. Der Schwefelzerstäuber ist der erste Rückenschwefler, der Verbrauch des Schwefels ist regulierbar und die Regulierung selbst kann durch einen einzigen Handgriff geschehen; man kann mit demselben nicht nur Schwefel-, sondern auch Kupferkalkpulver, Specksteinnmehl und jedes andere Pulver verstäuben.

## Mechanische Insekten- (und Schädlinge-) Vertilgungsvorrichtungen.

Wenn auch die mechanischen Vorrichtungen für das Vertilgen von Schädlingen im allgemeinen gegenüber den chemischen Mitteln weit zurückstehen, so sind einige derselben doch von ziemlicher Bedeutung gerade bei den Masseninfestationen von forstschädlichen Raupen, von Obst- und anderen Maden, weil sie eine ziemliche Gewähr dafür bieten, daß dieses Ungeziefer nicht in die Kronen der Bäume, beziehungsweise an höher gelegene Stellen der Stämme kommt. Zu diesen mechanischen Mitteln für alle Insekten gehören:

Leimringe, Leimstangen und Leimzäune;  
 Leimringe gegen Raupen an Obstbäumen,  
 Obstbaum-Madenfallen,  
 Anlegen von Heuweilen,  
 Fanggrinden, Fangknüppel und Fangreisigbündel,  
 Insekten-Fanggläser,  
 Mechanische Mittel zum Abhalten von Ameisen,  
 ferner zählen als Geräte,  
 Raupenfackeln und Raupenscheren.


### Leimringe, Leimstangen und Leimzäune gegen Forstschädlinge.

Dem Leimring (Fig. 6) geht immer das Glätten der Rinde voraus, das als Ring von etwa 15 bis 20 cm Breite mit dem Schnitzmesser ausgeführt wird; er wird als »Röte« bezeichnet und bezweckt eine glatte Fläche zu erzielen, einerseits um das Aufstreichen des Leimes zu erleichtern, andererseits auch, um die erfolgte Leimung leicht zu erkennen. Man muß die Leimung rechtzeitig im Frühjahr vornehmen und trägt den Leim am besten mit einem Holzspatel in einem 4 cm breiten Ring und 3 mm dick auf; derart dicke Leim-



ringe werden von den Raupen selten erstiegen; diese sammeln sich vielmehr unterhalb derselben in Massen an, bleiben lange träge sitzen, erkranken, verhungern zum Teil und fallen dann ab. Einzelne derselben kommen wohl auch auf den Leimring, sie bleiben aber kleben oder beschmutzen sich und gehen dann zugrunde.

Fig. 6.



Leimring mit Nonnenfaltern besetzt.

Leimstangen und Leimzäune werden aus den Dauben der zer Schlagenen Leimfässer aufgerichtet; erstere müssen dem Boden überall fest anliegen, die letzteren etwas eingegraben werden.

Leimringe werden am besten in Brusthöhe angebracht; an Stelle besonderer Raupenleime dient vielfach Teer.

Das Anbringen von Leimringen in größerer als Brusthöhe, hat sich in der Praxis nicht bewährt.

### Leimringe gegen Raupen an Obstbäumen.

Die Obstbäume vertragen nicht, wie die Forstbäume, das unmittelbare Auftragen des Leimes auf die Rinde; man ist daher zu dem Auskunftsmittel gelangt, den Raupenleim auf einen entsprechend breiten Streifen Papiers zu strei-

Fig. 7.



Papierstreifen-Leimring um  
einen Obstbaumstamm.

Fig. 8.



Madenfalle.

chen und erzielt auf diese Weise einen wirksamen »Fanggürtel« für Falter und Raupen. Es ist dabei Bedingung, daß der Papierstreifen sehr fest um den Stamm gebunden wird, um den Schädlingen den Aufenthalt unter demselben und das Aufsteigen am Stamm zu verwehren. Als geeignetstes Bindemittel für die Befestigung des Streifens hat sich weicher Draht erwiesen, der auf das Papier gelegt und

mit einer Zange oder einem Federkloben so fest angezogen wird, daß Zwischenräume nicht vorhanden sind. Sehr vorzuziehende Rinden glättet man vorher mit dem Schabmeißel oder verschmiert die Vertiefungen in der Rinde mit Lehm, der getrocknet eine ebene Fläche für das Anlegen des Papiers und entsprechend festes Anziehen des Drahtes bildet.

Auch die Madenfallen können gegen den Winter in Fanggürtel oder Leimringe umgewandelt werden, indem man dieselben in einer Breite von 5 bis 6 cm mit Raupenleim bestreicht.


### **Obstbaum-Madenfalle.**

Die sogenannte Obstbaum-Madenfalle soll die aus den abgefallenen Früchten auskriechenden Raupen, die sich nicht in die Erde verkriechen, sondern an Stämmen, Pfählen, Spalieren wieder in das Blattwerk zu gelangen suchen, verhindern, zu ihren Schlupfwinkeln zu gelangen. Die Madenfalle Fig. 8 bietet den Raupen den von ihnen gesuchten Unterschlupf im unteren Teile des Stammes und wird in nachgenannter Weise angelegt. Man windet um den Stamm Tücher, am besten zerfällene Tuchlappen, die man mit Bindfaden lose befestigt und die Stärke des Lappenbelages kann 1 bis 2 cm betragen. Über die Tuchlappen legt man nun ein etwas breiteres Band eines festen Ölpapieres, das abschneidend mit den Tuchlappen an der oberen Kante mittels Drahtes festgebunden wird. Man muß hierbei den Draht so fest anziehen, daß sowohl die Tuchlappen als auch das Ölpapier so fest als möglich am Stamm anliegen und den Raupen das Durchkriechen verwehrt ist. Von Zeit zu Zeit nimmt man die Madenfalle vorsichtig ab, bringt die Tuchlappen in heißes Wasser, wobei alles Lebende seinen Tod findet. Nach dem Reinigen und Trocknen können die Tuchlappen wieder zu gleichem Zweck gebraucht werden.

### Anlegen von Heuseilen gegen Baumschädlinge.

Da die Baumschädlinge gerne Schlupfwinkel, wie sie an Bäumen zahlreich vorhanden sind, aufsuchen, kann man ihnen solche auch künstlich bieten. Eine derartige Falle ist das Heuseil, Fig. 9, das aus langem Heu gewunden, mit Schnüren umwickelt und mittels Schnüren am Baumstamm befestigt wird. Die Schädlinge nisten sich in dem Heu ein und die im Jänner befestigten Heuseile werden im April abgenommen und verbrannt.

Fig. 9.



Heuseil gegen Baumschädlinge.

### Fangrinden, Fangknüppel und Fangreißigbündel.

Als Fangrinden wirken am besten, wenn vorhanden (bei der Sommerwirtschaft), etwa 30 cm lange, 20 cm breite Stücke von saftiger Fichten- oder Kiefernrinde, die mit der Bastseite auf den Boden gelegt und mit Steinen beschwert und wöchentlich oder öfter durch neue ersetzt werden (pro Hektar ungefähr 100 Stück). Unter die Rinden können zweckmäßig noch kleine Stücke Kiefernzweige des gleichen

Jahres hingelegt werden.

Die Fangknüppel (Äste) werden besonders für die Kiefernbestände (Winterwirtschaft) verwendet. Sie können zweckmäßig längs eines etwa 3 cm breiten Streifens entrinnet und an dieser Stelle in eine rinnenförmige Vertiefung des Bodens gelegt werden.

Die Fangreißigbündel sind armlange und schenkel-dicke Bündel aus frischem Kiefern- oder Fichtenreißig, sie müssen beim Abjuchen über Tüchern abgeklopft werden und sind weniger zuverlässig und weniger ergiebig. Alle diese Fangmittel müssen täglich nach den Schädlingen abgesehen

werden; wie lange diese in Anwendung gebracht werden müssen, ergibt der Befund an Ort und Stelle.

### Eingraben von Brutknüppeln.

Etwa 1 m lange, 8 cm dicke Knüppel von Fichte oder Kiefer werden zur Bodenfläche geneigt so eingegraben, daß das eine Ende noch etwa 10 cm aus der Erde hervorsteht. Sie bezwecken, die Käfer zum Brüten anzulocken. Sie müssen zeitweise nachgesehen und dann verbrannt werden, bringen aber verhältnismäßig wenig Erfolg.

### Fangbäume zur Vertilgung von Forstschädlingen.

Fangbäume sind das einzige Mittel gegen Borkenkäfer; dieselben müssen nach Erfordernis angelegt werden, zuweilen während der ganzen Saison. Die Fangbäume sind an freie Stellen des Waldes und an Waldränder zu legen, und wenn sie dem Boden anliegen, bleiben sie lange wirksam; nach Müßlins und anderer Erfahrungen ist in bezug auf die Wirksamkeit kein Unterschied, ob der Baum entastet wird oder nicht, doch zieht der ganze Baum auch die Feinde der Krone an. Als Fangbäume können auch die Hölzer der jährlichen Schläge benützt werden. Nach 1½ Monaten sind die Fangbäume zu entrinden; die Rinde und die Äste der Krone sind zu verbrennen.

Das Auslegen von Rasen- und Heidekrautplaggen mit der bewachsenen Seite nach unten, etwa 20 cm<sup>2</sup>, hat sich bei Käfern, insbesondere bei Mistkäfern gut bewährt.

### Fanggräben zur Vertilgung von Forstschädlingen.

Fanggräben werden um die Kultur herum oder nur längs der Grenze einer anstoßenden Schlagfläche angelegt; sie werden 30 cm tief, 15 cm breit angelegt, mit viereckigen 15 cm breiten Fanglöchern in der Grabensohle. Ganz in derselben Weise werden auch die Isoliergräben ausgehoben.

Die Fanggräben dienen zur Umfassung der Schlagflächen, ebensowohl, um die hier entstandenen Jungkäfer, als auch um die daselbst angeflogenen und brütenden, dann wegwandernden Mutterkäfer zu fangen; ferner zur Umfassung von Kulturflächen, um die von benachbarten Schlagflächen zuwandernden Käfer abzuhalten und zu vernichten. Auch Durchschneidungsgräben können auf Kultur- und Schlagflächen wirksam sein.

Die in die Gräben gefallen Schädlinge müssen gefangen und getötet werden. Die Gräben sind im Frühjahr am wirksamsten.

### Insektenglas von Broffard.

Dieses Glas (Fig. 10) besteht aus zwei Teilen; der untere Teil wird bis zu einem Viertel seines Fassungsvermögens mit der Köderflüssigkeit gefüllt, am besten mit Bier, dem man etwas Honig, Zucker oder Sirup zusetzen kann. Diese Flüssigkeit lockt Bienen nicht an. Sind in der Umgebung Bienenstände nicht vorhanden, so kann man statt des Bieres Honigwasser verwenden; auch verdünnte Milch ist als Köderflüssigkeit sehr geeignet. Die günstigste Zeit zur Verwendung des Insektenfängers ist von Ende März oder Anfang April an, wenn die großen Fröste vorüber sind und die Blütezeit beginnt. Man hängt die Vorrichtung in einer Entfernung von 1 bis 10 m voneinander an Pyramiden oder Hochstämmen etwa 2 m hoch, um ohne Leiter leicht dazu gelangen zu können, bei Kordons in der Höhe derselben. Sobald die Gläser mit gefangenen Insekten angefüllt sind, entleert man solche in einen Kübel und vernichtet die Insektenleiber und die Brut am besten durch Verbrennen. Hiernach werden die Gläser wieder gefüllt und an ihre Plätze gebracht, wo sie während des Sommers verbleiben, etwa bis Oktober, zur Zeit der Herbstfröste. Es empfiehlt sich, bei jedesmaligem Entleeren einen kleinen Satz der getöteten Insekten im Glase zu belassen, da der Verwesungsgeruch andere dem Obste sehr gefährliche Insekten anlockt.

### Fanggläser an Obstbäumen.


Zum Fangen von Faltern, welche durch Eierablage die Obstbäume stark schädigen (Raupenfraß) kann man sich vorteilhaft der Fanggläser bedienen. Die Fanggläser (Einsiedegläser mit 2 bis 3 l Inhalt) (Fig. 11) werden unter

Fig. 10.



Insektenglas.

Fig. 11.



Fangglas an einem Baum.

dem vorspringenden Rand mit Draht umschlungen und der Draht an Ästen und Zweigen entsprechend befestigt. Die Gläser werden mit Wasser, in dem man etwas Apfelstraut (Apfelgelee) verrührt hat, etwa bis zu  $\frac{1}{4}$  des Inhaltes gefüllt. Als Lockmittel kann auch abgestandenes Bier mit etwas Zucker dienen. Das Fangen gelingt bei gutem Wetter und wenn das Lockmittel in Gärung gekommen ist. Bei Obstspalieren werden die Fanggläser an die Spalierdrähte oder Spalierlatten gehängt. Auch in Gemüsebeeten kann man Fanggläser anwenden, indem man dieselben an den

freien Enden schief in die Erde getriebener Holzpflocke befestigt.

### Mechanische Mittel zur Abhaltung von Ameisen von Spalierobstpflanzungen.


Die mechanischen Mittel zur Abhaltung von Ameisen (auch anderem Ungeziefer) bezwecken entweder diese Tierchen

Fig. 12.



Fangschirm aus Papier und Watte.

Fig. 13.



Stanniolring.


zu fangen, beziehungsweise festzuhalten oder aber ihnen das Emporklettern an den Stämmen unmöglich zu machen. Als Fangmittel dienen die bekannten Leimringe, dann schirmartige Stücke von geöltem Papier, die auf beiden Seiten mit Leim bestrichen und am obersten Schirmteil mittels Drahtes gut befestigt sind, so daß die Ameisen nicht Stellen finden, durch welche sie hindurchschlüpfen können



(Fig. 12). Als weiteres Fangmittel kann auch ein Ring von loser Baumwolle (Watte) dienen, der an den Stamm geklebt wird und in den die Ameisen kriechen, sich aber in den Baumwollfasern fangen und dann nicht mehr entchlüpfen können.

Um das Emporklettern zu verhindern, kann man auch um den Stamm einen Ring aus Stanniol (Zinnfolie), Fig. 13, legen. Das den Stamm umfassende Stanniolblatt wird auf

Fig. 14.



Raupenfackel.

denselben angelegt, glatt gestrichen und zunächst seine Ranten (oben und unten) mit weichem Draht so fest umschnürt, daß den Ameisen das Hindurchkriechen zwischen Stamm und Stanniol unmöglich gemacht ist. Auf dem glatten Stanniol aber können sich die Ameisen nicht halten.

### Raupenfackeln.

Man bezeichnet mit dem Namen Raupenfackeln Vorrichtungen, welche bestimmt sind, Raupennester, Weispinse

usw. dadurch zu vernichten, daß man dieselben mit einer Heizflamme in Berührung bringt, wodurch die Tiere teils beschädigt, teils getötet werden. In vielen Fällen wird die Raupe nur beschädigt (besonders große Raupen), da schon eine nur mäßige Wärme hinreicht, die Raupen zum Krümmen des Körpers und damit auch zum Abfallen zu bringen. Man muß dann sehr sorgfältige Nachschau auf dem Boden halten, am besten das Gras absicheln oder Tücher ausbreiten, von denen die Raupen abgelesen und dann getötet werden. Die Jackeln bestehen aus einer, am besten mit Spiritus zu füllenden Blechlampe (Fig. 14), aus der der Docht wie bei jeder Lampe beliebig herausgezogen werden kann, die in einer feststehenden Gabel an einer leichten, mehr oder weniger langen Stange beweglich hängt, so daß man ihr jede beliebige Richtung geben kann, sie aber dabei doch immer senkrecht hängt. Bei der Benützung der Raupenjackeln muß man die nötige Vorsicht walten lassen, damit das Holzwerk nicht Feuer fängt, also nicht zu lange an einer Stelle verweilen.

### Raupenscheren.

Die Raupenscheren, deren es eine ganze Anzahl von Konstruktionen gibt, sind bestimmt, mit Raupennestern besetzte Ästchen, Zweige und selbst einzelne Blätter an jenen Stellen der Bäume abzuschneiden, wohin man mit der Handschere und selbst auf einer Leiter stehend, nicht mehr hingelangen kann. Es bestehen daher die Raupenscheren im allgemeinen aus der eigentlichen Schere, die an einer kürzeren oder längeren Stange befestigt ist, dem mittels Drahtbügels angehängten und freischwebenden Netz und der Zugleine, welche von Hand angezogen, die Schere betätigt und das Abschneiden der Äste bewirkt. Die Stange soll leicht und am besten aus Bambus hergestellt sein. Bei dem Umfange, daß die abgechnittenen Teile des Baumes nicht immer mit voller Sicherheit in das Netz gelangen, sondern auf den Boden fallen, dort nicht gefunden werden und

neues Unheil stiften und daß die Scheren wegen der komplizierten Konstruktion häufig den Dienst versagen, zieht man vielfach das Abschneiden der Raupennester mit der Handschere vor.

Auch vor der sogenannten amerikanischen Stangenraupenschere wird gewarnt, welche zur Vertilgung von Raupengespinsten


Fig. 15.



Adjustierte Raupenschere.

vielfach angepriesen wird, aber sich als unbrauchbar erwiesen hat. Die mit Hebelvorrichtung versehene Schere weist zur Befestigung der ersteren eine solche Menge von Schrauben auf, welche sich im Gebrauch lösen, daß sie nicht als Werkzeug für den Zweck verwendet werden kann. Die Schrauben fallen zu Boden, in den Unterwuchs, sind vielfach nicht mehr auffindbar, aber auch nur schwer oder gar nicht ersetzbar, so daß ein solches Gerät sehr bald unter das alte Eisen wandert.

Fig. 16.



Raupenschere.

### **Rattenfalle nach Brehm.**

An besuchten Gangstraßen der Ratten, etwa zwischen Ställen, in der Nähe der Abtritte usw., legt man eine 1,5 m tiefe Grube an und kleidet sie innen mit glatten Steinplatten aus. Eine viereckige Steinplatte bildet den Grund, vier andere, oben schmälere, stellen die Seiten her. Die Grube muß oben halb so weit sein als unten, so daß die Wände nach allen Seiten hin überhängen und ein Heraufklettern der hineingegangenen Ratten unmöglich machen. Nun gießt man auf den Boden geschmolzenes Fett oder andere stark riechende Stoffe, setzt ein körnernes Gefäß hinein, füllt es mit Honig, Met, Mais, Weizen, Hanfsamen und anderen Leckerbissen an. Dann kommt etwas Häcksel auf den Boden und endlich ein Gitter über den Eingang, damit nicht ein Haustier hineinfalle.

### **Leicht herstellbare Rattenfalle.**

Aus starken Brettern verfertigt man einen Kasten, dessen Größenverhältnisse ganz dem Raume, wo er aufgestellt werden soll, angepaßt werden können. Derselbe kann beispielsweise 93 bis 175 cm lang, 42,75 cm breit und 24 bis 32 cm hoch sein. Den Deckel schraubt man mit drei bis vier starken Schrauben an, so daß er leicht abgeschraubt werden kann. An den beiden kürzeren Seiten schneidet man je eine weite Eingangsöffnung aus, die durch einen Schieber geschlossen werden kann, so daß die Ratten leicht durch den Kasten durchlaufen. Im Inneren des Kastens bringt man abwechselnd an der einen und der anderen Seite Querbretter an, welche kürzer sind als die Breite des Kastens, so daß also der Weg durch den Kasten ein gewundener ist und im Inneren eine Anzahl halboffener Kammern entsteht. Dann verzieht man den Kasten mit etwas Stroh und anderem weichem Material, stellt ihn mit geöffneten Schiebern in eine ruhige, dunkle Ecke des Schweinestalles oder an einen anderen Ort, an dem

Ratten hausen und deckt ihn mit Stroh zu. Bald wird dieser Kasten ein Lieblingsaufenthalt der Ratten sein, die darin ihre Nester machen. Nach einigen Wochen wird man schon aus dem Quicken erkennen, ob Ratten darin sind oder man schließt aufs Geradewohl die Schieber, trägt den Kasten hinaus und schraubt den Deckel ab. Bei einer solchen Revision findet man oft gegen 40 junge und alte Ratten in dem Kasten. Diese Revisionen tragen ganz besonders zur Verminderung und schließlich der gänzlichen Beseitigung der Ratten bei.

## **Mittel gegen Schädlinge und lästiges Ungeziefer im Hause, an Hausgeräten, Gebrauchsgegenständen und Nahrungsmitteln.**

Vielfach werden dem Menschen Insekten und andere Tiere der niederen Ordnungen durch vereinzelttes oder häufigeres Auftreten in den Wohn-, Arbeits- und Vorratsräumen unangenehm und sei hier nur der Ameisen, der Tausendfüßer, Spinnen und einer Unzahl kleiner Lebewesen gedacht, die, wenn sie auch nicht schaden, im Gegenteil sogar mitunter Nutzen bringen, unangenehm sind; sie werden gemieden, gefürchtet und selbstverständlich auch vertilgt, wo man ihrer habhaft werden kann.

Unter den wirklich Schaden bringenden Tieren sind hier zunächst die Fliegen zu nennen, deren Lebensweise — sie sitzen jetzt auf einem Excrementenhaufen und gehen dann auf Speisen irgendwelcher Art — geradezu ekelhaft ist und deren Plage man oft schwer Herr werden kann. Wesentlich unangenehmer aber werden jene großen mit großem Geräusch (Brummen) fliegenden, mit den Köpfen

an die Fensterscheiben stoßenden Tiere; sie suchen aber auch die Vorratskammern auf und sind daselbst sehr unliebsame Gäste.

Für jeglichen Fleischvorrat, sofern er nicht dicht abgeschlossen ist oder in Eiskellern aufbewahrt wird, werden Fliegen, besonders die blaue und die graue Fleischfliege sehr verderblich. Diese Fliegen werden auf weite Entfernungen durch den Fleischgeruch angelockt und legen ihre Eier in dem Fleische ab, die sich schnell zu Maden entwickeln und mit unglaublicher Schnelligkeit wachsen. Das Gewicht derselben wächst in einem Zeitraume von 24 Stunden um das 200fache, der flüssige Unrat läßt das Fleisch schnell zum Faulen kommen, die Maden sind nach etwa acht Tagen ausgewachsen, verlassen ihre Nährstätte und verpuppen sich in den Fugen der Fußböden, im Kehricht usw., um nach 14 Tagen wieder als Fliegen von neuem Unheil zu stiften.

In ähnlicher Weise wird auch die Käsefliege schädlich, die ihre Eier in Quark und zubereitete Käse ablegt, die sich zu Maden entwickeln; auch Milben (Käsemilben), Spinnentiere und Tausendfüßer zernagen insbesondere harte Käse so, daß nur ein wimmelndes graubraunes Pulver aus den Milben und den Excrementen zurückbleibt.

Die Hausgrille oder das Heimchen findet sich ausschließlich in Häusern und in warmen Räumlichkeiten, so in Bade- und Brauhäusern, in Krankenhäusern, in Gar- und Wirtshausküchen, lebt tagsüber in Mauerrissen verborgen und kommt in der Dunkelheit hervor, um Küchenabfälle, namentlich mehhlaltige Speisen zu suchen. Die Tiere verraten sich durch Zirpen, ein mittels der Flügeldecken hervorgerufenes Geräusch, das beispielsweise bei den Spaniern beliebt ist, die das Heimchen in Käfigen halten. Das Heimchen gehört zu den Kauferfen, wie die Küchenschaben und der Zuckergast oder das Silberfischchen, und alle drei sind höchst unliebsam empfundenenes Ungeziefer, gegen das man mitunter erfolglos ankämpft, denn viele der in Anwendung

stehenden Mittel sind unzureichend und werden auch ungenügend gehandhabt.

Schaben und Rissen, Küchenflöhe, Käferlarve genannt, finden sich überall da, wo sie neben Abfällen jeder Art warme Schlupfwinkel finden, besonders in Backstuben, Restaurationsküchen usw. und treten als wirklich ekelhafte Plage auf. Sie verbreiten sich über Stiegen und sonstige Zugänge, besonders durch die Ramine aus ihren Ursprungsstätten oftmals bis in die obersten Stockwerke und werden selbst in Wohnzimmern mitunter lästig.

Die Vertilgungsmittel lassen sich in zwei Gruppen teilen, die eine Gruppe umfaßt alle Vertilgungsmittel, die bezwecken, die Käfer durch Einstäuben in ihren Schlupfwinkeln, wie bei den Wanzen, zu töten, indem die Atem- und Fressorgane entzündet werden und dadurch den Tod herbeiführen. Auch hier wirken die flüssigen oft augenblicklich, immerhin, wie bei den Wanzen, unter der Voraussetzung, daß die Tiere dadurch getroffen werden, was sich in den wenigsten Fällen erreichen läßt. Ein wirksames Pulver, das Fulgurin, läßt sich leicht in die hintersten Schlupfwinkel hineinstäuben und tötet dann nach einigen Stunden mit unfehlbarer Sicherheit. Immerhin muß bei diesem, wie bei jedem anderen Insektenpulverpräparate, Feuchtigkeit nach Möglichkeit vermieden werden, da sonst die Wirkung schwächer oder ganz aufgehoben wird, denn diese Art Ungeziefer ist von einer erstaunlichen Zähigkeit.

Die andere Gruppe begreift die Mittel in sich, die bestimmt sind, von den Käfern gefressen zu werden und durch Vergiftung zu wirken. Diese sind überall am Plage, wo die Schlupfwinkel nicht zugänglich sind oder wo die Käfer als Eindringlinge aus Nebenwohnungen auftreten, indem sie sich nicht scheuen, ihre Raubzüge oft weit auszudehnen. Da sie keine Kostverächter sind, kann man durch Auslegen der bekannten Vorratpräparate, sowie von Arsenik- oder Bariumkarbonatkompositionen ihnen an den Leib rücken, mit letzteren natürlich unter Beobachtung aller Vorsichtsmaßregeln. Eine völlige Ausrottung wird unter allen

Umständen, geschehe sie auf dem einen oder anderem Weg, nur nach und nach bei längerer Anwendung des Mittels, allenfalls von mehreren, die sich gegenseitig ergänzen, gelingen können. Da, wo Rissen und Schaben in Zimmern oder überhaupt Wohnräumen auftreten, handelt es sich in der Regel um Zuwanderung aus entfernteren Schlupfwinkeln und man wird demgemäß durch direkte Vergiftung meistens mehr erreichen, als durch die Insektenpulverspritze, da, wie gesagt, in erster Linie die Schlupfwinkel der Käfer damit angestreut werden müssen. Es ist einleuchtend, daß in diesen engen Fugen und Löchern ein Insektenpulver ganz anders, d. h. ungleich kräftiger wirken kann, als wenn dasselbe in offenen Räumen, in Hausgängen und anderen Orten zur Verwendung kommt.

Die Schädlinge der Getreidekörner in Getreidemieten, -kammern und sonstigen Aufbewahrungsorten sind der Kornrüßler, der Kornkäfer (Kornkrebs, Wirbel oder schwarzer Kornwurm genannt).

Auch in Mehl- und Teigwaren usw. findet sich der Kornkäfer ein; er und seine Brut schädigen und zerstören die Ware und machen sie dabei ekelhaft.

Die in den Getreidemagazinen lebenden Insekten müssen durch öfteres Umschaukeln des Getreides in ihrer Tätigkeit gestört werden und dort, wo sie massenhaft auftreten, ist Schwefelkohlenstoff in Anwendung zu bringen.

Vom Kornkäfer befallene Vorräte werden etwa eine halbe Stunde lang einer Hitze von etwa 50° C ausgesetzt und die Behälter sind einer gründlichen Reinigung mit heißem Wasser zu unterziehen.

Auch der Zuckergast (das Silberfischchen) ist ein Ungeziefer, daß die alten Mehl-, Küchen- und andere Vorratsschränke liebt, auch an Zucker- und Samenvorräte geht. An ihnen durchfrißt es die Papierumhüllung und nagt die Samenkörner an und aus. Gegen sie hilft nur gründlichste Reinlichkeit überall; bei Sämereien kann man Insektenpulver oder Schwefelkohlenstoff zur Vertilgung anwenden.



An Brot, Zwieback usw. geht der Brotbohrer, aber er geht auch in Naturaliensammlungen, sogar in Leder, vermehrt sich namentlich in warmen Räumen sehr stark. Käfer und Brut sind zu sammeln und zu verbrennen, ansonst muß man größte Sauberkeit walten lassen.

Ein anderer Feind im Hause ist der Speckkäfer, der an trockenem Fleisch, Speck, Blasen der Obstgläser, auch an Tierfellen nagt und nur durch sorgfältiges Nachsehen, Reinhalten und Klopfen der Felle bekämpft werden kann.

Der Mehlkäfer und seine Larve, der Mehlmurm, sind gefürchtete Feinde des Mehles, sie finden sich aber auch in technischen Artikeln, z. B. in trockenem Kasein. Sie werden durch wiederholtes sorgfältiges Aussieben bekämpft und die abgeseihten Entwicklungsformen, Würmer und Häute sind zu verbrennen.

Unter den Getreideschädlingen ist noch die Kornmotte zu nennen (weißer Kornwurm). Man bekämpft sie ebenfalls am besten durch häufiges Umschaukeln der Getreidevorräte im Juni und August; auch begießt man die Haufen mit  $\frac{1}{2}$  bis 2 kg Schwefelkohlenstoff möglichst gleichmäßig, bedeckt sie dann mit Tüchern und läßt das Mittel 36 Stunden lang einwirken.

Zu den Hülsenfrüchtenschädlingen gehören der Erbsenkäfer, der Erbsenwickler (der sich oft nach dem Kochen der Hülsenfrüchte in der fertigen Speise zeigt), dann der Bohnenkäfer.

An gefälltem und auch schon verarbeitetem Holz richten eine große Anzahl von Insekten oft sehr bedeutende Schäden an, indem sie selbst Bewohner des Holzes werden, in demselben ihre Eier ablegen, die dann, zu Maden entwickelt, Gänge in die Holzfasern ausfressen, wodurch die Festigkeit und der Gebrauchswert leiden; selbst Möbelfstücke werden nicht verschont (Holzwürmer). Die Tätigkeit der Insekten, zu denen Weidenbohrer, Glasschwärmer, der Schiffswerstkäfer, Bockkäfer, Bohrkäfer, Holzwespe usw. gehören, läßt sich immer durch ausgeworfenenes Sägemehl, Bohrmehl erkennen.

Motten (Schaben, Kleidermotten, Pelzmotten, Haar-

haben) sind sehr gefürchtete Zerstörer aller Rauchwaren (Pelz), Wollwaren jeder Art und stellen zunächst sich als Schmetterlinge dar, die von gelblichgrauer Färbung und ziemlich klein, vom Mai angefangen, überall herumfliegen und sich auch abends bei Lampenschein gerne einsinden. Dieser kleine Schmetterling legt seine Eier in Substanzen tierischen Ursprunges (Pelze, Wollstoffe, Federn, Haarfilz, Roßhaare), nicht aber in Baumwolle oder Seidengewebe; dagegen sind wollige Tapeten, die sogenannten Velourtapeten, ebenfalls ein beliebter Ort für die Eierablage. Nun erfährt die Brut dann die bekannte Umwandlung zunächst zur Raupe und dann zum Schmetterling.

Nicht die der kleinen Puppe entschlüpfte geflügelte Pelzmotte ist es, die den Schaden an Pelzwerk, Wollstoffen, Kleidern aus Wolle, Polstermöbeln usw. verursacht, sondern die dem Ei entschlüpfte Raupe. Geleitet von dem Instinkt, den wir ja bei den Tieren vielfach bewundern, legt die Motte ihre Eier zumeist in jene Stoffe, in welchen die aus dem Ei entschlüpfte Raupe ihren ungestörten Aufenthalt und vor allem die erforderliche Nahrung findet, somit alle Bedingungen für ihre Weiterentwicklung. Hierher gehört alles Pelzwerk, das in dem Fett der Haarzwiebel genügend Nahrung bietet, die Wollfaser, die natürliches Fett enthält oder bei der Bearbeitung eingefettet wurde, das fertige Kleidungsstück, besonders dort, wo es Fettflecke aufweist, der Stoffüberzug der Polstermöbel, die im Sommer nicht benutzten wollenen Bettdecken usw., überhaupt alle tierischen Fasern beziehungsweise die daraus hergestellten Gewebe, während Pflanzenfasern verschont bleiben. Die Eier, die Ursache so vielen Unheils, sind mit freiem Auge kaum sichtbare Pünktchen. Wo immer hingelegt, werden sie von dem Lufthauch aufgewirbelt, herumgetrieben und überallhin verpflanzt; geeigneter Boden für ihre Entwicklung ist ja überall vorhanden. Einmal dahin gelangt, braucht das Ei nur ein wenig Wärme, um sich nach zwei Wochen zur Raupe zu entwickeln; als solche mit unstillbarem Hunger begabt, beginnt sie bei Pelzen ihr Zerstörungswerk durch Abnagen

der Haare an der Wurzel, deren Fettstoff ihr als Nahrung dient. Die Haare fallen ab und dort, wo eine Anzahl von Raupen vorhanden waren, sind kahle Flecke in dem Pelzwerk, die oft ganz bedeutende Größe aufweisen. Bei Geweben mit rauher Oberfläche werden ebenfalls die feinen Härchen abgefressen, aber die Raupe frisst auch ganze Löcher in den Stoff oder sie nagt nur die oberen Fasern ab, so daß man an den kleinen Vertiefungen, die hierbei entstehen, ganz gut beobachten kann, welchen Weg das Ungeziefer genommen hat. Gewöhnlich sind die von den Motten befallenen Objekte, wenn man den Schaden nicht bei seiner Entstehung entdeckt und eine gründliche Reinigung durch Ausklopfen und Ausbürsten vornimmt, für den ferneren Gebrauch verloren. Wenn die Verpuppungszeit herankommt, spinnt sich die Raupe ein, überwintert in unauffindbaren Verstecken, in Ritzen und Fugen, um bei den ersten Frühlingsstrahlen ihrer weißen Hülle als geflügelte Motte zu entschlüpfen, deren kurzes Dasein nur den Zweck hat, ihre Gattung fortzupflanzen und dann zu sterben.

### Mittel gegen Motten (Schaben).

Als ein Produkt organischen Lebens ist Pelzwerk an und für sich schon den zerstörenden Naturkräften in hohem Maße ausgesetzt; es ist empfindlich gegen atmosphärische Einflüsse, zu denen Luft und Wärme gehören und die den vorzeitigen Verfall mittelbar und unmittelbar herbeiführen. Sie kommen um so mehr zur Wirkung, als gegenüber der Durchschnittstemperatur der Ursprungsländer der meisten bei uns getragenen Pelzwaren das Klima unserer Gegenden als ein für Pelzwerk geradezu tropisches angesehen werden muß. Die Wärme ist der Feind des Pelzwerkes und gerade zur Zeit der warmen Jahreszeit erwächst demselben in der Motte, Pelzmotte, Schabe der größte Feind. Die Kälte der Luft verhindert die Entwicklung der Eier des kleinen Falters und der Umstand, daß das Pelzwerk im Winter dauernd getragen wird, ist neben der Temperatur Ursache, daß das

Insekt nicht zur Entwicklung kommt. Seine bewunderungswürdige Anpassung an die Lebensbedingungen zeigt sich darin, daß die Wärme des Sommers zur Ausbrütung der Eier notwendig ist und da dieselbe Wärme es ist, die die Menschen dazu veranlaßt ihr Pelzwerk beiseite zu legen, kann die Motte sich ruhig ihrer Fortpflanzung widmen. Der geeignetste Boden für die Entwicklung der Eier ist eben das Pelzwerk; die Raupe benagt nach dem Auskriechen aus dem Ei das Haar an der Wurzel, der dort aufgehäuften Fettstoff dient als Nahrung, das Haar aber fällt unhaltbar aus. Kälte und Abwesenheit der Lichtes sind die beiden wichtigsten Faktoren für die Erhaltung des Pelzwerkes. Die erstere verhindert die Entwicklung allenfalls vorhandener Eier, somit die Verbreitung der Motte und bringt den durch Verbrauch des Fettstoffes hervorgerufenen Verfall zum Stillstand. Die Dunkelheit hingegen bewirkt die Erhaltung der natürlichen Färbung, von welcher der Wert des Felles, beziehungsweise des daraus hergestellten Pelzwerkes abhängt. Die Entwertung von Pelzwerk durch warme Luft ist sehr bedeutend und von dem im Haar enthaltenen Fettstoff ist die Lebensdauer des Felles abhängig. Im Pelz des lebenden Tieres wird dieser Vorrat an Fettstoff stetig erneuert, im zugerichteten Fell des Kleidungsstückes hingegen unvermeidlich erschöpft. Die Lebenskraft des Pelzwerkes ist dann begrenzt und kann nicht erneuert werden, wenn Hitze und Feuchtigkeit sie aufgebraucht haben, ebensowenig wie bei der Pflanze, die von der Wurzel oder dem Stamme getrennt, bei allmählicher Verdunstung ihres Feuchtigkeitsgehaltes abstirbt (verwelkt). Licht ist fast ebenso nachteilig für Pelzwerk als Wärme. Unter dem Mikroskop betrachtet, zeigt das Haar kleine mit Farbstoff (Pigment) gefüllte Röhrchen; die Sonne bleicht diesen Farbstoff, von welchem bei vielen Pelzarten der Wert und die Schönheit abhängt. Es ist bekannt, daß Pelzwerk in Auslagefenstern der Sonne ausgesetzt, an Wert innerhalb ein bis zwei Monaten die Hälfte einbüßt. Naturelle, d. h. nicht künstlich gefärbte Pelzarten sind von Motten als Stätte ihres Unwesens bevorzugt, insbesondere

leidet Bijam, Biber, Marder, Fehse, Nerz, Otter, Skunks, Zobel usw.

Die Mittel, welche man zur Verhinderung des Mottenfraßes, beziehungsweise des Befallens von Pelzwerken usw. durch Motten anwendet, sind außerordentlich zahlreich und fußen teils auf Nieschmitteln, welche die Tiere abhalten sollen, teils auf Abschluß des Lichtes und der Luft (Einhüllen in Kisten, Kasten, Papier usw.), teils auf öfterem Ausklopfen derselben. Erste Rauchwarenfirmen sprechen sich gegen die verschiedenen Mittel aus und jagen: Kampfer, Naphthalin, Pfeffer, Terpentin, Karbol, Insektenpulver, riechende getrocknete Pflanzen, schweflige Säure, alte Tabakpfeifenrohre, Verbrennen von Federn, Leder, Wolle usw. sind nicht nur gänzlich wertlos für Pelzwerk, weil sie demselben schaden, weil durch die Einwirkung der chemisch wirkenden Substanzen das Fell seine Frische verliert, weiter der penetrante Geruch an dem Haar haften bleibt und nie wieder ganz zu entfernen ist. Tatsächlich werden derartige Mittel von Fachleuten gänzlich gemieden. Aber auch die Methode, das Pelzwerk zuerst gründlich zu klopfen und dann in Leinwand gehüllt über den Sommer in den Kasten zu hängen, ist zumindest nicht zuverlässig. Durch das Klopfen wird allerdings der bereits verursachte Mottenschaden konstatiert und der Zerstörungsprozeß aufgehalten; aber es braucht an dem Haar nur ein einziges Ei haften zu bleiben, welches sich innerhalb zwei Monaten zur zerstörenden Made entwickelt und der Wert des Durchklopfens wird illusorisch. Überdies ist das Klopfen des Pelzwerkes eine Prozedur, die, allzuoft angewendet, für daselbe von Nachteil ist. Diese Methode wird von Kürschnern nur aus dem Grunde geübt, weil sie diejenige ist, bei welcher der Wert des Pelzwerkes am wenigsten beeinträchtigt wird, ohne daß sie aber einen sicheren Schutz gegen die Motte bietet.

Über die verschiedenen gebräuchlichen Mittel, welche als Abwehr gegen Motten in Anwendung kommen, wird auf S. 223 eingehend berichtet.

Auf Basis der schon früher genannten beiden Hauptfaktoren für die Erhaltung von Pelzwerke Kälte und Dunkelheit,

haben die Amerikaner sogenannte »Cold Storages« geschaffen, welche auch schon in Europa, in Wien bei der Firma Tlusth, Knöpfelmacher & Co., dann in deren Filialen in London, Paris und Berlin bestehen. Cold storages sind Räume, in welchen bei absoluter Trockenheit und Dunkelheit mittels Kühlmaschinen Temperaturen bis zu  $2^{\circ}$  Kälte erzeugt werden. Diese Räume, die gegen die Außenluft hermetisch abgeschlossen sind, dienen zur Aufbewahrung von Pelzwerk, Kleidungsstücken usw. In solchen Räumen aufbewahrte Gegenstände (neben Pelzwaren auch Kleidungsstücke usw.) sind gegen Mottenfraß vollkommen geschützt, da sich die Motte nicht entwickeln kann. Gleichzeitig aber wird die Lebensdauer des Pelzwerkes ganz wesentlich verlängert und dieser Umstand gewinnt dadurch an Bedeutung, daß dasselbe nicht wie bisher von Jahr zu Jahr einen beträchtlichen Teil seines Wertes einbüßt.

Die Anlage der vorgenannten Firma besteht aus großen, gegen Feuchtigkeit, Wärme und Licht streng isolierten Räumen, in welche durch Röhren vermittlels einer Ammoniak-Kompressionsmaschine kalte Luft eingeführt wird. Ein 10 HP. Elektromotor besorgt den Antrieb dieser in England gebauten Maschine. Elektrisch betriebene Blaskanal-Ventilatoren und Exhaustoren besorgen in den Kühlräumen die Zu- und Abfuhr, sowie die gleichmäßige Verteilung der an den Röhren gekühlten Luft. Ein sinnreich konstruierter Apparat kontrolliert automatisch die konstante Erhaltung der Temperatur auf dem Gefrierpunkt und da die zur Aufbewahrung übernommenen Stücke frei auf den Ständern hängen, werden sie von der kalten Luft auf allen Seiten bestrichen. Fußboden und Wände sind mit Kacheln verkleidet, daher die dem Pelzwerk schädliche Staubeentwicklung vollkommen ausgeschlossen ist. In diesen Räumen bleibt das Pelzwerk, nachdem es vorerst gründlich gereinigt ist, vom Tage seiner Einlieferung bis zur Herausnahme hängen. Das Klopfen wird dadurch natürlich überflüssig, sowie überhaupt alle schädlichen Einflüsse ferngehalten werden.

Über die Vertilgung der Motte äußert sich Rodenfeld folgendermaßen: Es sind als Vertilgungsmittel in

erster Linie immer Kampfer und Naphthalin zu nennen. Dieselben werden entweder in Substanz in kleinen Papierbeuteln zwischen die Kleidungsstücke, Pelze usw. gelegt, oder aber in Alkohol, Aether, Benzin gelöst, zum Tränken von Fließpapier benützt, welches in einzelnen Lagen zwischen die zu schützenden Gegenstände gelegt wird. In den Motteneffizenzen, welche die verschiedensten Zusätze an ätherischen Ölen haben, wie Patjschuli, Moschustinktur u. a. dürften Kampfer oder Naphthalin doch die einzig wirksamen Bestandteile sein. Spanischer oder Guinea Pfeffer leistet mit Naphthalin gemischt gute Dienste, ebenso auch der spirituöse Auszug desselben, in dem Naphthalin und Kampfer gelöst sind. Als ein neues Mittel wird seit einiger Zeit *Oleum Ivarancusae s. Vetiver* benützt, welches jedenfalls den Vorteil hat, nicht so unangenehm zu riechen. Statt des Öles kann ebenso gut auch die Vetiverwurzel benützt werden, die man einfach zwischen die Kleider legt. In allen Fällen ist ein gutes Verpacken der Gegenstände in starken und festschließenden Kisten ein unbedingtes Erfordernis. Die seit einigen Jahren im Handel befindlichen Kisten aus dem Holze des Kampferbaumes können ebenfalls empfohlen werden. Ein erfahrener Pelzhändler jagt: Es gibt kein Schutzmittel gegen den Mottenfraß, das die Schönheit und Dauerhaftigkeit des Pelzwerkes nicht beeinträchtigt oder die Gesundheit, mindestens das Wohlbefinden des Trägers nicht benachteiligt, außer sorgfältige Behandlung, Reinlichkeit und sachgemäße Aufbewahrung.

Alles Sonnen, d. i. der Sonnenwärme aussetzen, ist dem Pelzwerk schädlich; man lüfte es im Schatten an trockenen, bewölkten Tagen, klopfe es sorgfältig aus und kämme es mit einem stumpfen Metall- oder Holzkamm, der aber ganz frei von Schmutz oder Fett sein muß, packe es dann in einen gut schließenden Behälter und verwahre diesen an möglichst kühlem, trockenem und dunklem Orte. Ferner ist es unbedingt notwendig, nicht nur Pelz- und Wollensachen, sondern auch Schränke, Kisten usw., alle vier bis sechs Wochen sorgfältig auszulüften.

1. Nach Dr. Gerstenberg hat sich als ausgezeichnetes Mittel gegen Motten konzentriertes Formalin bewährt. Man spritzt davon 30 bis 50 g mittels einer Spritze (Morphiumspritze) möglichst tief stechend in ein Sofa und ist das ganze Ungeziefer in dem gefährdeten Stück nach einiger Zeit verschwunden. Nach 24 Stunden kann das Polstermöbel wieder benützt werden. Da die Ausführung der Einspritzungen besonders für Hände und Nase wenig angenehm und auch nicht ungefährlich ist, z. B. für die Augen beim Plagen der Spritze, so bedient man sich der Gummihandschuhe und einer Schutzbrille und reinigt sich nach der Arbeit tüchtig mit Wasser. Auch kann man das Formalin mittels einer geeigneten Vorrichtung zerstäuben.

2. Man gießt Holzessig in eine flache Schale und stellt diese auf den Boden des Kleiderschranks. Die Motten werden vertrieben und der stark empyreumatische Geruch des Holzessigs verschwindet, wenn die Türe des Kleiderschranks etwa eine Stunde lang geöffnet bleibt. In gepolsterte Möbel steckt man Lappen, die mit Holzessig getränkt sind.

3. Getrockneter Thymian wird in Säckchen aus Tüll oder Mull eingenäht und diese an den vor Motten zu schützenden Kleidungsstücken, Vorhängen, in den Polstermöbeln mittels Nadeln angesteckt.

#### 4. Mottenpulver.

a) 27·5 g Kampfer, gemahlen, werden mit  
7·5 g Naphthalin gut gemischt.

b) 100 g persisches Insektenpulver,  
100 g Naphthalin,  
100 g Sägespäne von Weidenholz.

c) 100 g Terpeneol (künstlicher Riechstoff) werden auf eine solche Menge Sägespäne aus hartem Holz verteilt, daß diese letzteren nach dem Durchmischen kaum angefeuchtet erscheinen.

d) Das Mottenpulver »Antiputrin« besteht aus  
8 bis 10 g Gips und  
92 » 90 g Naphthalin, ist also als ein mit Gips eigentlich verfälschtes Naphthalin zu betrachten.



## 5. Mottentinkturen.

a) 25 g Naphthalin,

8 g Kampfer,

75 g Benzin,

35 g Terpentinöl; man bringt Naphthalin und Kampfer in dem Gemisch von Benzin und Terpentinöl zur Auflösung.

b) 10 g Naphthalin werden in

250 g Benzin gelöst und die Lösung mit Patschuliöl oder etwas Kampfer, der ebenfalls in Lösung geht, vermischt.

c) Chinesische Mottentinktur der russischen Pelzhändler.

In starken Spiritus wirft man eine handvoll Kampfer und die zerkleinerten Schalen von spanischem Pfeffer oder klein gestoßenen Koloquinten, läßt das Gemisch einige Tage an der Sonne oder in der Nähe des Ofens stehen, bis der Kampfer gelöst ist und sieht dann die Flüssigkeit durch. Man besprüht mit derselben das Pelzwerk recht gleichmäßig, wickelt es fest zusammen und schlägt es dann in gut appretiertes Baumwoll- oder Leinengewebe ein. Auf diese Weise kann man Pelzwerk Jahre hindurch aufbewahren, ohne daß sich Motten darin einfinden.

d) Für Pelzwaren.

40 g reine Karbolsäure,

20 g Kelfenöl,

20 g Zitronenöl,

10 g Anilinöl,

20 g Mirbaneßenz werden nach und nach in 3000 g Weingeist eingegossen und gut vermischt.

e) Für Tuchkleider.

30 g reine Karbolsäure,

60 g Kampfer,

60 g Rosmarinöl,

10 g Kelfenöl,

10 g Anilinöl,

500 g Weingeist.

- f) 20 g Naphthalin,  
 20 g Karbolsäure,  
 50 g Kampfer,  
 50 g Terpentinöl,  
 5 g Patschuliöl,  
 5 g Myrbanöl,  
 850 g Weingeist.

g) 20 Gewichtsteile Naphthalin,  
 20       "       Karbolsäure und  
 50       "       Kampfer werden in einer Flasche mit  
 50 Gewichtsteilen Terpentinöl und  
 850       "       90% igem Spiritus übergossen und  
 zur Lösung gebracht, dann  
 5 Gewichtsteile Patschuli und  
 5       "       Mirbaneßenz hinzugefügt. Diese  
 Lösung wird mittels einer Spritze im Zimmer, in den  
 Schränken usw. verstäubt.

h) 8 g Kampfer,  
 8 g Lorbeeröl,  
 8 g Terpentinöl,  
 8 g Bergamottöl,  
 8 g Melkenöl,  
 20 g geschnittener spanischer Pfeffer,  
 250 g Alkohol von 95% werden in einer ver-  
 schlossenen Glasflasche am besten an der Sonne zusammen  
 digeriert öfters umgeschüttelt, dann abgeseiht und filtriert. Die  
 erhaltene Flüssigkeit ist fast farblos, weder den Farben schäd-  
 lich, noch hinterläßt sie nach dem Verflüchtigen Flecke. Man  
 besprengt die vor den Motten zu schützenden Gewebe, Pelz-  
 werk usw. alle 8 bis 14 Tage ganz leicht mit der Flüssig-  
 keit und es wird sich dann nie ein Insekt darauf einsinden.

#### 6. Thymolin, Schutzmittel gegen Motten.

Das Präparat besteht aus kleinen, weißen Tabletten,  
 welche in Pappschachteln verpackt sind. Die Tabletten be-  
 stehen aus

95% Naphthalin,  
 3.5% Kampfer und  
 1.5% Thymol (Thymiankampfer) und verbreiten einen  
 starken Naphthalingeruch.

## 7. Mottenvertilgungsmittel »Antimottein«.

Das Pulver wird folgendermaßen hergestellt:

50 kg feinst gesiebte Sägespäne werden mit

0.5 kg fein pulverisiertem, mit Lavendelöl parfümier-  
 tem kohlen-sauren Ammonium gut vermischt, worauf

1 kg Eiseessig, der mit

1 l Wasser vermischt wurde, zugefetzt und das Ganze  
 so lange untereinandergearbeitet wird, bis das durch Zusatz  
 der Essigsäure hervorgerufene Brausen aufhört. Durch diese  
 Behandlung werden die Sägespäne zur Aufnahme der noch  
 zuzusetzenden Bestandteile geeignet gemacht. Die nachgenannten  
 Substanzen werden dann gesondert gemischt:

2 kg Eiseessig mit

2 kg Wasser verdünnt,

1.5 kg Alkohol, in welchem

0.5 kg Kampfer gelöst ist und

1 kg amerikanisches Terpentinöl. Diese zweite Mischung  
 wird sodann mit der ersten vereinigt und dem Ganzen noch

4 kg mit Lavendelöl parfümiertes, kohlen-saures Am-  
 monium hinzugefetzt. Die so erhaltene Masse wird in einen  
 gut verschlossenen Behälter gebracht.

Zum Gebrauche wird dieses Mittel in den Räumen  
 oder Behältern, in welchen sich die vor Motten zu schützen-  
 den Gegenstände befinden, aufgestreut und die Gegenstände  
 selbst darüber gehängt oder gelegt. Doch können die Gegen-  
 stände auch wie bisher mit dem Pulver bestreut werden  
 ohne daß sie dadurch Schaden leiden würden. Dadurch,  
 daß die wirksamen Bestandteile in fein verteiltem Zustande  
 in dem Träger (den Sägespänen) enthalten sind, kommen  
 sie langandauernd und sicher zur Wirkung und entwickelt  
 sich durch das mit Lavendelöl präparierte kohlen-saure Am-

monium ein angenehmer Geruch, der den Motten schädlich ist. An Stelle der Sägespäne kann auch ein anderer geeigneter Körper, der die wirksamen Bestandteile in sich aufzunehmen vermag, z. B. Infusorienerde, Schwammabfälle usw., zur Verwendung gelangen, welcher Zellulose (Sägespäne) ganz oder teilweise zu ersetzen vermag.

### Mottenpapier.

a) Man bestreicht Papier mit einem dünnen Stärkekleister, bestreut es mit einer Mischung von gleichen Teilen Kampfer und Naphthalin in Pulverform gleichmäßig und zieht dann das Papier durch Walzen, damit die pulverigen Substanzen fest haften.

b) Löschpapier wird in ein geschmolzenes Gemenge von Naphthalin und Kampfer getaucht, dann zwischen Walzen gebracht, welche den Überschuß an Imprägniermittel auspressen.

c) 10 Gewichtsteile Naphthalin werden mit  
1 Gewichtsteil Berezin zusammengeschmolzen.  
Streifen von Fließpapier damit getränkt und diese durch Walzen laufen gelassen.

Stoeger empfiehlt, um Motten aus Wohnräumen usw. zu vertreiben, die Aufstellung je eines Exemplares in jedem Zimmer der Mottenblume (*Plethanthrus fructicosus*), welches hinreichend Wirkung sichert.

### Mittel gegen Schaben, Rissen usw.

1. 12 Gewichtsteile Petroleum,  
1·5      »      Terpentinöl und  
1·5      »      Benzin werden gemischt, in der  
                 Flüssigkeit  
750 g Eukalyptusblätter 24 Stunden lang digeriert.  
Nach dem Durchsieben fügt man noch  
100 g Eukalyptusöl hinzu.

2. 7 kg Meerrettich werden mit Wasser zu einem steifen Brei gekocht und dieser sodann mit

60 g Weinstein und

30 g Soda tüchtig verknetet. Der erhaltene Kuchen wird in einem gut geheizten Backofen so lange gebacken, bis er durch und durch geröstet ist. Nach dem Erkalten wird die Masse zu feinem Pulver vermahlen und dann mit

26.5 kg Streuzucker,

21.0 kg gemahlenem Borax und

1 kg Schweinfurtergrün vermischt. Dieses Pulver wird sodann in die Ritzen und Fugen der Zimmer- und Küchenwände, Fußböden, Decken usw. eingespritzt und vertilgt in Kürze das Ungeziefer.

3. 50 Gewichtsteile gemahlener Borax,

25 „ Kornmehl,

25 „ Streuzucker und

5 „ gemahlener Grünspan werden

gemischt und das Pulver auf Tellern oder Papier an den Orten aufgestellt, wo sich das Ungeziefer aufhält.

4. Rissen können vertilgt werden, wenn man in den Räumen, in denen sie des Nachts aus ihren Schlupfwinkeln hervorkommen, sich aufhalten, die Wände mit Stangen, auf denen mit Spiritus getränkte Watte entzündet wurde, entlang fährt und die zu Boden gefallen, teilweise der Beine beraubten Käfer vollends tötet. Auf Brutstellen, in Ritzen und Fugen wird, nachdem alles leicht Brennbares entfernt ist, ebenfalls Spiritus ausgegossen und dieser angezündet.

5. Auch die sogenannte automatische Schabenfalle ist als brauchbar befunden worden; sie wird behufs Gebrauches bis zur Hälfte mit Bier gefüllt und als Lockspeise ein mit Bier getränktes Stück Brot aufgelegt; die Falle wird nun jeden Tag mit toten Schaben gefüllt sein und zeigt man die Prozedur so lange fort, bis sich die Tiere nicht mehr zeigen.

6. Man stellt in Gefäßen Borax und Erdäpfelmus miteinander gemischt auf; auch das Einblasen von Borax- und Aniskenpulver wird empfohlen.

## 7. Eine Mischung von

200 Gewichtsteilen Angelikawurzelpulver,

50        »        Melilotkrautpulver,

2        »        Naphthalin und

5        »        Eukalyptusöl, wird allabendlich

an jene Stellen gestreut, wo sich Schaben aufzuhalten pflegen.

8. Nach J. H. Fehr ist Boraxpulver mit Mehl gemischt, das beste Mittel zur Vertilgung; in Ermangelung anderer Nahrung nehmen die Ratten und Schaben das Pulver in dieser Gestalt zu sich. Man schreibt die Wirkung des Borax der demselben eigentümlichen Eigenschaften zu, sich in der Hitze aufzublähen, wodurch nach Genuß Sprengungen der inneren Teile entstehen. Ob dies indessen der Fall ist, ist mindestens zweifelhaft, weil dadurch eine Hitze erforderlich ist, welche die Tiere schon an und für sich töten würde. Es ist wahrscheinlicher, daß die Wirksamkeit des Borax in seiner Eigenschaft liegt, Pflanzenschleim so beträchtlich zu verdicken, daß daraus eine elastische, kaum mehr flebende Masse entsteht, die möglicherweise auf dem Wege der Verdauung nicht mehr zu beseitigen ist und den Tod des Tieres veranlaßt. Daß diese Eigentümlichkeit des Borax durch Zucker oder Honig aufgehoben wird, gibt einen Fingerzeig, das Pulver nicht, wie es häufig geschieht, mit Zucker zu vermischen.

a) 20 Gewichtsteile Borax,

10        »        Weizenmehl.

b) 10 Gewichtsteile Borax,

10        »        Insektenpulver,

5        »        Weizenmehl.

Diese Mischung hat sich besonders gut bewährt.

c) 20 Gewichtsteile Borax,

10        »        Insektenpulver,

10        »        Weizenmehl.

d) 10 Gewichtsteile Borax,

10        »        Insektenpulver,

5        »        Koloquintenamenpulver,

5        »        Weizenmehl.

9. Man schüttet oder spritzt in die Ritzen der Mauer, des Fußbodens usw. Schwefelkohlenstoff und verschließt erstere dann mit Lehm.

### Spinnenpulver.

Zur Vertilgung der Spinnen empfiehlt sich häufiges Abkehren der Wände und Verstäuben einer Mischung aus:

10 Teilen fein gemahlener Quillnarinde,

10 » Zykopodium und

80 » Insektenpulver.

### Ungeziefer in Gartenhäusern und -hütten.

Die Gartenhäuser, sowie die Gartenhütten bieten beim Herannahen der rauhen Jahreszeit vielen Schädlingen Unterkunft, indem sie sich in den Ritzen und Spalten, die das Holz immer aufweist, verkriechen. Zu diesen Schädlingen gehören die Baumwanzen, Tausendfüßer, Aseeln, Raupenpuppen, Schnecken; man muß daher diese Stellen gründlich nachsehen, ausputzen und die Schädlinge vernichten. Nicht schädlich, sondern nützlich sind: Marienkäferchen, Laufkäfer, Spinnen, Ohrkriecher und Florsfliegen, die man naturgemäß schonen soll.

### Bücherichädlinge.

Auch die Bücher haben unter den Insekten Feinde, und die Schäden, welche durch dieselben verursacht werden, sind namentlich dann empfindlich, wenn es sich um alte Bücher handelt, deren Wert bekanntlich oft ein sehr bedeutender ist. Es wird angegeben, daß die Zahl der Insektenichädlinge 67 beträgt, von denen mehr als die Hälfte den Mäfern zuzählen ist. Es ist nicht zu verwundern, daß diese Schädlinge in früheren Jahren häufig vorgekommen sind und schon im Jahre 1774 erließ die Göttinger Akademie der Wissenschaften ein Preisauschreiben, das die Erfundung

der bücherzerstörenden Insekten und Mittel zur Vernichtung dieser Schädlinge forderte. Man hatte nämlich wenige Jahre vorher in einer Anzahl alter großer Bibliotheken die betrübende Entdeckung machen müssen, daß wertvolle, in Holzdeckel und Schweinsleder gebundene Folianten merkwürdige Zerstörungen, sowohl im Äußeren, wie auch im Inneren aufwiesen. So waren beispielsweise in der Pariser Bibliothek 27 nebeneinanderstehende Folianten in schnurgerader Linie von einem unbekannten Minierer durchbohrt worden. Einen dieser Schädlinge glaubte bereits der Berliner Zoologe Frisch in der Larve eines Bohrkäfers ausfindig gemacht zu haben, die in der Rinde trockenen Brotes lebt. Diese Larve war vermutlich jenes gelbbraune Wesen, das wir heute unter dem Namen »Mehlwurm« kennen und zur Fütterung vieler Singvögel ganz allgemein verwendet wird. In der Tat gehören diese Bohrkäfer zu den Bücherfeinden, namentlich jene Familie, die man als Buchkäfer oder wohl auch als Totenuhr kennt. Wer hat nicht diesen »trefflichen Minierer« schon bei seiner Zerstörungsarbeit belauscht? Da pocht es nächtlicherweile oder wohl auch am Tage irgendwo in einer alten »wurmstichigen« Diele oder in einem Schranke und pocht wieder und nun antwortet es anderswo her. Es ist ein Frage- und Antwortspiel der einander suchenden Männchen und Weibchen und das Pochen wird derart bewerkstelligt, daß der Käfer mit dem Kopfe an das Holz stößt. Der Käfer selbst ist aber dem Holz und den Büchern nicht halb so gefährlich, als die Larve, deren Werk Wurmmehl ist. Noch schädlicher als die Larve des Buchkäfers (*Anobium*) wird den Büchern die des verwandten Bohrkäfers (*Plinus*) oder »Diebes«. Sie ist es, die im Herbarium oft fürchterliche Musterung hält, die alles so durchfrisßt, als ob ein Draht hindurchgezogen wäre. Dabei ist dieser Bohrkäfer oft nur halb so groß als ein Roggenkorn, während der Buchkäfer immerhin etwa 5 mm mißt. Allmählich hat man nun immer mehr Bücherfeinde unter den Insekten kennen gelernt. Da ist zunächst die ekelhafte etwa  $1\frac{1}{2}$  mm lange Bücherlaus (*Psocus*) zu nennen, deren Fühler fast



so groß sind, wie der ganze, sehr weiche Leib; auch hier ist namentlich die Larve der Hauptschädling alter Bücher. Dann ist die Schabe (*Blatta*) zu erwähnen, jenes raschelnde braune Insekt, das wir Russen oder Franzosen, die Franzosen aber Deutsche nennen. Dieser Bücherschädling hat es vornehmlich auf den Kleister und Leim, sowie das Leder des Bucheinbandes abgesehen. Hierher gehört des weiteren das Silberfischlein oder der Zuckergast (*Lepisma*), jenes bewegliche, langgestreckte (10 mm), mit silberglänzendem Schuppenkleid versehene Insekt, dessen Hinterleib in drei lange Borsten endet. Dieser nächtliche Gast sucht namentlich süße Speisen heim, geht aber auch mit Vorliebe an Kleister und Leim. Auch der Speckkäfer ist ein Bücherschädling. Schaben kommen nur in feuchten Räumen vor, legen aber ihre Eier nie in den Büchern ab, sondern stets in Mauerrißen.

Im Norden haben die Bücher hauptsächlich nur von Anobiden, Dermatiden und Lepismen zu leiden, je weiter nach Süden aber, um so mehr werden die Feinde und insbesondere dort, wo Termiten hausen, sieht es oft grauenhaft in den Bibliotheken aus, denn diese Tiere vollführen auf weite Strecken ihre Zerstörungsarbeit meist im Verborgenen.

Den Bücherfeinden stehen aber auch ausgesprochene Gegner derselben gegenüber, anfangs von unwissenden Menschen kaum weniger heftig verfolgt, heute aber als wertvoller Bundesgenosse betrachtet. Hier ist zunächst als grimmigster Feind der Bücherläuse und ihrer Brut eine winzige Milbenart (*Chylotus*) zu nennen. Auf all das Gesindel der Bücherfeinde aber hat es der Bücherfiskorpion (*Chelifer*) abgesehen, ein rotbraunes, 3 mm langes Tierchen mit mächtigen Skorpionzangen, aber ohne den gefürchteten Giftstachelschwanz seines weit größeren Namensvetters.

### Mittel zur Vertilgung des Pfahlwurmes und der Fingermilch bei Holzbaulichkeiten in Seewasser.

Die bei Bauten im Seewasser, sowie bei Schuppen verwendeten Hölzer, gleichgültig, ob dieselben weich wie Kappel-

oder Weidenholz oder hart wie Teakholz sind, unterliegen den Angriffen zweier Weichtiere, dem Pfahlwurm und der Fingermuschel und sind die durch dieselben angerichteten Schäden oft sehr bedeutend, so daß man schon lange bestrebt ist, durch Anwendung geeigneter Mittel solche zu paralysieren.

Der Pfahlwurm hat einen federkielähnlichen, bis 35 mm langen Körper, besitzt am vorderen Körperende ein paar kleine, klapfende, ringförmig gezähnte Rippen tragende Schälchen, die nach der Ansicht von Gelehrten das Bohrwerkzeug bilden; andere Autoritäten sehen dieses in den fünf- bis sechseitigen kristallinen Kieselspitzen am Fuße und den Mantelrändern. Der mittlere Teil des Körpers ist in einen reifenförmigen Mantel gehüllt, aus dem am hinteren Körperende die beiden Atemohren abge sondert hervorragen.

Die Fingermuschel ist fast völlig von zwei sehr harten, größeren, an beiden Enden klapfenden und zwei kleineren, akessorischen Kalkschalen (Schloßplatten) bedeckt, die auf der Außenfläche längs der drei bis sechs Anwuchsstreifen scharfe Zahnreihen zeigen, mit denen sie nach Möbius und Meyer ihre Kanäle bohren. Mit der Zunahme des Körper-, beziehungsweise Schalenvolumens erweitern sich die Bohrlöcher entsprechend. Die zerstörende Arbeit dieser beiden Weichtiere im Holze ist verschieden; die Pfahlwürmer bohren gewöhnlich in der Längsrichtung der Fasern des Holzes, sie können jedoch auch senkrecht in dasselbe eindringen; die gebohrten Kanäle sind mit einer kalkartigen Masse ausgekleidet, die nach Untersuchungen von Professor Münter aus den Absonderungen des Tieres stammt. Die von der Fingermuschel gebohrten Kanäle haben keine Kalkauskleidung und sind gewöhnlich senkrecht auf die Längsfaser des Holzes angebracht. Das Tier selbst leuchtet im Dunkeln.

Die Mittel, welche man gegen die Angriffe dieser Tiere auf das Holz in Anwendung bringt, bestehen im Umhüllen der Pfähle oder des Holzes überhaupt mit Metallplatten oder im Bedecken durch eingeschlagene Nägel mit breiten Köpfen und Aufstreichen mit den Einflüssen des Seewassers widerstehenden Farben, Imprägnieren mit anorganischen

Stoffen, welche als giftig für die Tiere betrachtet werden und den Tod herbeiführen und Imprägnieren mit teerartigen Produkten; das Imprägnieren mit Kreosotöl unter Druck hat sich bisher am besten bewährt, doch ist der Zusammensetzung des Kreosots besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Eine zum Studium der Frage eingesetzte Kommission der niederländischen Akademie der Wissenschaften gelangte zu folgenden Schlüssen:

1. Das Bestreichen der Oberfläche des Holzes mit den verschiedensten Stoffen, um dieses mit einer Hülle zu versehen, auf der die jungen Pfahlwürmer sich nicht ansetzen können, muß als ungenügend bezeichnet werden, denn sobald nur die Hülle durch Auflösung oder irgend eine andere Ursache auch nur auf einer kleinen Stelle, die manchesmal für das Auge unsichtbar ist, eine Beschädigung erlitten hat, beginnt an dieser Stelle die Beschädigung durch den Bohrwurm und andere mikroskopische Tierchen. Dasselbe gilt mit gewissen Einschränkungen für die Bekleidung des Holzes mit Kupferplatten oder mit sogenannten Wurmnägeln, indem auch in mit Wurmnägeln bekleideten Pfählen ebenfalls Pfahlwurmgänge gefunden worden sind. Jedoch widerstehen diese Bekleidungen den verschiedenen Einflüssen besser, als die eben besprochenen Anstriche, denn durch die Oxydation des Eisens der Wurmnägel wird auf der Oberfläche der Pfähle eine harte, zusammenhängende Kruste gebildet, die das Eindringen der Pfahlwürmer erschwert.

2. Das Durchtränken des Holzes mit löslichen anorganischen Salzen, die man als giftig für die Tiere betrachtet, z. B. Sublimat; Kupfervitriol, Chlorzink, Eisenvitriol, chromsaures Kali, schützen nicht gegen den Pfahlwurm und muß die Ursache einestheils darin gesucht werden, daß diese Salze durch das Seewasser ausgelaugt werden, andernteils darin, daß einige derselben für den Pfahlwurm nicht giftig zu sein scheinen.

3. Unter allen untersuchten Mitteln fand die Kommission nur eines, welches mit großer Wahrscheinlichkeit als ein wirksames Schutzmittel gegen die Verwüstungen des Pfahl-

wurm betrachtet werden kann, nämlich das schwere Steinfohlenteeröl oder Kreosotöl. Bei Verwendung desselben muß auf seine Qualität Rücksicht genommen werden, ebenso auf die Art und Weise der Durchtränkung und endlich auf die Holzart selbst, die man der Kreosotbehandlung unterwirft.

### Mittel gegen Wildverbiss.

Aus Versuchen, welche die königlich bayrische Regierung zu Landshut in den Forsten Niederbayerns angestellt hat, geht folgendes hervor: Hylojervin hat bei Fichten sehr befriedigt, besonders da die von einer dichten Nadelhülle umgebene Terminalknospe der Fichte gegen die unmittelbare Berührung mit dem Mittel geschützt ist. Bei den übrigen Nadelhölzern muß man sich hüten, die Endknospen beim Auftragen der Flüssigkeit zu beschmieren. Auch Laubhölzer sind sehr empfindlich gegen Hylojervin, denn dieses zerstört die damit zufällig bestrichenen Knospen und die Kambialschichten und dürfte aus diesem Grunde bei Laubhölzern die Verwendung von Hylojervin ausgeschlossen sein.

Für Laubhölzer hat sich eine Mischung, bestehend aus  $\frac{2}{3}$  Schweinsjauche und

$\frac{1}{3}$  Tierblut, je 3 l der Mischung innig vermennt mit  $\frac{1}{2}$  kg ungelöschtem Kalk vorzüglich bewährt.

Auch ein Gemisch von Jauche, stinkendem Tieröl und Ruß gibt gute Resultate; Ruß wird zugefetzt, um durch die schwarze Farbe die bestrichenen Pflanzen zu bezeichnen.

Bei allen derartigen schmierartigen Mitteln sind jedoch richtiges Maßhalten im Auftragen und zweckentsprechende Handtierung wesentliches Erfordernis. Die Ergebnisse des „Verhaufsens“ bei Laubholz sind nicht zufriedenstellend.

Als ganz unbrauchbar wurden verworfen: Lanziche Blechkronen, Pikrosoditin, Böhmisches Pflanzenschutzfett, Wildfraßfett, Wiesners Wildschutzfett und ähnliche Präparate.

Für Hagenfraßwunden an Bäumen ist das weitaus beste Heilmittel ein Teig von feuchtem, zähem Lehm und

Ruhfladen, womit die Wunden möglichst bald nach deren Bildung bestrichen werden. Hierauf bandagiert man außerdem noch größere Wunden mit Leinwandstreifen. Es ist geradezu auffallend, wie rasch die Überheilung, die Bildung von neuer Rinde, unter diesem Schutzmittel vor sich geht, falls man das genannte Mittel auf die frischen Wunden gebracht hat. In diesem Falle geht die Kambiumbildung nicht nur von außen, sondern auch von innen, und zwar von vielen Stellen aus und rasch von statten (Baumwachs hat sich weniger bewährt). Nach einigen Monaten sollten die Wunden falls erforderlich aufs neue bestrichen werden. Handelt es sich aber um den Schutz von alten, vernachlässigten Wunden, wo der äußere Teil des Holzkörpers schon abgestorben ist, so empfiehlt es sich, nur die gesunden Wundränder mit Lehm und Ruhfladen oder Baumwachs, den übrigen Teil der Wundstelle aber mit Teer zu bestreichen, um sie gegen die ungünstigen Witterungsverhältnisse, namentlich aber gegen Fäulnis und Ansiedlung von Baumschwämmen usw. zu schützen. Sollten junge Bäume in der Baumschule geschält und jüngere Formbäume durch Verlust des Fruchtholzes erheblich beschädigt worden sein, so schneidet man sie am besten stark auf den Zapfen bis etwa 12 bis 15 cm über der gesunden Stelle zurück, um sie größtenteils durch die Bildung von neuen Trieben nachzuziehen. Auf diese Weise erhält man gewöhnlich sehr kräftigen Wuchs und starke Triebe und wird der Schaden in verhältnismäßig kurzer Zeit wieder gutgemacht.

### Behandlung von Saatgut gegen Vogelsturz.

Bei der Aussaat von Früchten hat man oftmals Vogel einfälle zu befürchten und man hat versucht, die Saatkörner mit Substanzen zu behandeln, welche die Vögel abhalten. W. Hoffmann hat eine Reihe von Keimversuchen mit Weizen und Bohnen angestellt, die mit Teer, Petroleum, Mennige und Quassiaholzabkochung behandelt worden waren, um den Einfluß der genannten Stoffe auf die Keimkraft

feststellen zu können. Er fand hierbei, daß die Stoffe ohne Nachteil bei Mais sind, wenn letzterer nicht zu überlagert ist und genügenden Wassergehalt besitzt. Die Behandlung mit Petroleum möchte jedoch nicht über 30 Minuten ausgedehnt werden. Bei Weizen schadet eine viertelstündige Einwirkungsdauer von Petroleum der Keimfähigkeit nicht. Eine Benachteiligung des Erdbodens für nachfolgende Pflanzkulturen ist ebenfalls ausgeschlossen. Bohnen mit großem, schwammigem Gewebe scheinen Petroleum weniger gut zu vertragen wie kleinere Hülsenfrüchte. In diesen Fällen ist Teer empfehlenswerter. Auf 100 kg vorgequellten Mais nimmt man etwa 2 l durch Erhitzen flüssig gemachten Teer und schaufelt das Saatgut tüchtig durch. Selbst mit einer Teerschicht völlig überzogene Körner bringen noch kräftige Pflanzen hervor. Weitere Keimversuche mit Burgieröl, dem widerlichen und ungenießbaren Öl der Burgierfrüchte, ergaben, daß die Keimung wesentlich verzögert wurde und Weizen büßte an Keimkraft wesentlich ein. Von Enjol und Kreolin vertragen Mais und Seestrandkiefer verhältnismäßig konzentrierte Lösungen. Im allgemeinen war ein schädlicher Einfluß von der Zeit der Einwirkung abhängig. Flußsäure und Ameisensäure beeinflussten die Keimung im allgemeinen in ungünstiger Weise.

## Mittel gegen Ungeziefer an Menschen und Tieren.

Die Ungezieferarten, welche Menschen und Tiere belästigen und wie schon wiederholt erwähnt, sich von deren Blut nähren, sind zunächst in solche zu unterscheiden, welche dauernden Aufenthalt auf der Haut derselben nehmen und in solche, welche ihre Wohnstätten nicht auf derselben aufschlagen, sondern aus ihren gewöhnlichen Aufenthalten und

Schlupfwinkeln bei Tag oder bei Nacht herauskommen, Mensch oder Tier oder beide überfallen und aus ihnen ihre Nahrung zu beziehen gewohnt sind. In die erstere Kategorie gehören die Läuse aller Art, Krätzmilben, die überhand nehmen, wenn nicht Anstalten zu ihrer Vertilgung getroffen und sich in einer Weise einnisten, daß sie selbst krankhafte Zustände hervorrufen können. Es ist auch begreiflich, daß diese Tiere wenn sie in Masse auf einem Körper vorkommen dort durch Eierablage und Entwickeln der Jungen aus diesen letzteren, durch Entnehmen des Blutes, durch Bildung von Schorf usw. gewissermaßen die besten Säfte entziehen und damit nicht nur ekelhaft werden, sondern auch zu den Folgen mangelhafter Ernährung führen müssen. Außer den Läusen kommt bei Tieren noch der Hundesfloh in Betracht, der in dem Pelz des Tieres seine Eier ablegt und sich auch entwickelt, aber doch vermöge seiner Beweglichkeit von einem Opfer auf das andere zu springen vermag. Es gehören hierher noch die Zecken und die Schmeißfliegen, sowie die Eingeweideparasiten, die aber außerhalb des Rahmens dieses Buches liegen.

Die zweite Kategorie umfaßt die Wanze (Bett- oder Hauswanze), den Floh, die Mücken (Schnaken, Gelsen), die Moskitos und die verschiedenen Arten der Fliegen, die den Menschen wohl nur belästigen, bei den Tieren (Pferden, Rindvieh) aber eine wahre Plage, deren sie sich oft nur schwer erwehren können, werden.

Die genannte erste Gruppe des Ungeziefers kann nur an dem Körper des davon befallenen Individuums bekämpft werden und hier gibt es in allererster Linie ein Universalmittel: Reinlichkeit in jeder Beziehung, Nachsuchen, wenn man sich durch Zucken oder Beißen belästigt fühlt (oder dies an den Tieren bemerkt), gänzliches Bloßlegen der behaarten Hautstellen (Abrasierer) oder Abschneiden der Haare bis zur äußersten Grenze und endlich die Anwendung von solchen Mitteln, welche das Ungeziefer und dessen Brut töten. Man muß sich vor Augen halten, daß dort, wo nur ein oder zwei der Individuen sich angesiedelt haben, die

Vermehrung sich rapid vollzieht und daß dort, wo nicht das Ungeziefer und seine Brut vollständig vertilgt sind, solches immer wieder zum Vorschein kommt und nach kurzer Zeit seine Wirkungen äußert, da die Körperwärme die besten Bedingungen für den Verdegang der Tiere bietet. Zu den eigentlichen Reinigungen gehört nach dem Entfernen des Ungeziefers das Waschen mit starkriechenden Seifen, häufiges Baden, Einreiben mit Mineralölen (es muß nicht Petroleum sein), mit Vaseline, Quecksilberjalsben, Ljhol-lösungen, mit Schmierseifenlösungen und bei Tieren (Schafen) endlich mit Sublimat und Arsenikwässern, die unmittelbar tötend wirken. Dort, wo man die Haare bei einzelnen Arten des Ungeziefers nicht entfernen will oder kann, müssen dieselben mehrmals des Tages mit sehr engzahnigen Kämmen durchgekämmt, das Ausgekämmt sofort verbrannt und die Kämme zur Sicherheit in Sublimatlösungen gelegt werden. Nur bei sehr verwahrlosten Individuen findet sich das Ungeziefer in solchen Massen, daß man Läuse beispielsweise in den Haaren bemerkt, aber es ist nie ausgeschlossen, daß auch der peinlichst reinliche Mensch nicht einmal durch Zufälle aus engerer Berührung mit einem anderen, durch Aborte, durch Wäschestücke, dann aber auch auf der Straße durch die unleidliche Gepflogenheit, eine Menge Dinge aus den Fenstern zu werfen, durch das Ausschütteln von Tüchern usw., solches plötzlich an sich entdeckt.

In die zweite Kategorie des Ungeziefers, jenes, welches nicht am Körper des Menschen dauernd lebt, sondern denselben zur Einholung seiner Nahrung zeitweise, insbesondere in der Dunkelheit aufsucht, gehört ausschließlich und in allererster Linie die Wanze, Haus- oder Bettwanze, die sich allenthalben und insbesondere dort findet, wo eine größere Anzahl von Menschen in beschränkten Räumen ihre Schlafstätten aufgeschlagen hat, sie findet sich aber unter Umständen selbst in Palästen, während anderseits wieder die bescheidensten Häuschen vollkommen frei von den Tieren sind. Nicht überall bekannt ist es, daß die Wanzen oft Wanderungen unternehmen und in einer Wohnung plötzlich als Eindring-



linge massenhaft auftreten können. Bei näherer Untersuchung solcher Fälle kommt man dann zu der Überzeugung, daß dieselben beispielsweise anlässlich des Auschwefelns einer nebenan befindlichen Wohnung Reißaus nahmen, um eine andere Behausung mit ihrer verbissenen Anhänglichkeit zu beglücken.

Die Wanze liebt alle Schlupfwinkel, wie sie sich in jedem Zimmer finden, in Mauerritzen, unter nicht vollständig fest aufgeklebten Tapeten, in Mauer- und Tapetenlöchern, in den Fußböden (Fugen der einzelnen Bretter) und den Wandleisten, die den Fußboden längs der Wände einjäumen; hier sind ihre eigentlichen Wohn- und Bruträume, von diesen aus wandert sie insbesondere in die Bettstellen von Holz, wo sie in den reichlich vorhandenen Fugen und Zusammenstoßstellen der einzelnen Teile reichlich Unterkunft findet, aber sie wandert auch in die aus Röhren bestehenden Eisenbetten. Kein Bild, kein Spiegel, kein wie immer gearteter Gegenstand an der Wand befestigt ist vor dem Einnistn der Wanze sicher, die kleinste Ritze reicht hin, ihr den gesuchten Unterschlupf zu gewähren und von dort verbreitet sie sich überall hin. Sie wird bei Wohnungswechsel mit den Möbeln (wohl selten mit Kleidern) in wanzenfreie Wohnungen eingeschleppt und nistet sich dann in den Mauerritzen u. s. w. ein, aber es kommt auch sehr häufig vor, daß man mit reinen Möbeln eine Wohnung bezieht und schon sogleich oder nach längerer oder kürzerer Zeit die unliebsame Entdeckung macht, daß das Ungeziefer vorhanden ist. Es ist kein Zweifel, daß die Wanze aus einer Wohnstätte eingeschleppt wird, daß namentlich alte Häuser gefährdete Wanzenburgcn sind, daß aber auch ganz neue Häuser verzeuht werden können, wenn der beim Bauen verwendete alte Bauhutt nicht, ehe er in das neue Haus eingeführt wurde, einer Behandlung durch Hitze unterzogen wurde. In dieser Hinsicht wird oder wurde viel gefehlt, und aus dem Schutt findet die Wanze leicht den Weg in die Wohn- und Schlafräume selbst des elegantesten Hauses. Wo Wanzen einmal sich festgesetzt haben, sind sie außerordentlich schwer zu ver-

nichten, denn durch Vertreiben erreicht man nicht viel und muß immer gewärtig sein, daß sie wiederkehren; dies ist darin begründet, daß man kaum imstande ist, alle Ritze und Verstecke ausfindig zu machen, in denen sie haufen, aber auch darin, daß die Wanzen ein äußerst zähes Leben haben und selbst in fast völlig vertrocknetem Zustande, mit durchscheinendem Körper unter günstigen Bedingungen wieder lebensfähig werden. Da, wo sie sich aufhalten, in der Nähe von Spalten im Holz, in Mauerrißen, kann ihre Anwesenheit durch kleine schwarze Flecke, die Exkremente, erkannt werden, jedoch sind diese vermöge der Dunkelheit an den betreffenden Teilen des Raumes, der Farbe der Wand, der Tapete oder des Holzes doch nicht leicht bemerkbar.

Die Bettwanze ist aber nicht allein an und für sich ein ekelhaftes und lästiges Ungeziefer, sondern sie ist auch Überträgerin von Krankheiten. Im südlichen Tirol, in Dalmatien, in der Herzegowina, sowie in anderen südlichen Provinzen von Österreich-Ungarn traten in den Sommermonaten bei den in Barackenlagern untergebrachten Soldaten schwere Magen- und Darmkatarrhe auf. Genaue Untersuchungen, die Dr. Kirchenberger und Wala anstellten, ergaben das überraschende Resultat, daß die Verbreitung der schweren Anfälle — von 600 Mann wurden 121 von der Krankheit ergriffen — in erster Linie auf Wanzen zurückzuführen war. In dem Raum, in dem die Krankheit zum Ausbruch kam, fand eine weitere Ansteckung zunächst bei den Leuten statt, die in den nächsten oder in den gegenüberliegenden Betten lagen und die Beobachtungen ergaben, daß die Baracke voll Wanzen war, die von einem Bett zum anderen wanderten und die Krankheit verschleppten.

Der Floh, dieser Springer von vorzüglicher Ausdauer, der Blutjauger, der unerträglich wird, bis er sich endlich gesättigt hat, erwählt sich sein Opfer überall und er ist allenthalben, im Hause des Reichen und des Armen, in allen öffentlichen Lokalen, in Schulen und Kasernen, auf Postämtern, in Eisenbahn- und Tramwaggonen zu finden und wird allenthalben höchst lästig. Dabei besitzt er eine

lange Lebensdauer, überwintert beispielsweise in Militärbaracken und in Monturmagazinen und wehe denjenigen, welche derartige Brutstätten nach dem Winter zum ersten Male betreten — sie sind die Jäger des Ungeziefers. Wie die Wanze, vermehrt sich der Floh in der warmen Jahreszeit rapid; die Eier werden hauptsächlich in den Ritzen der Fußböden, in dunklen Ecken, im vorhandenen Kehrlicht, in den hinter und unter Möbelstücken vorhandenen wolligen Gebilden abgelegt; die Larven nähren sich von feuchten pflanzlichen oder tierischen Stoffe, entwickeln sich auch unter den Dielen, besonders da wo Sägespäne als Füllmaterial verwendet sind. Es ist erwiesen, daß Urin eine gute Quelle für die Entwicklung der Larven ist und man hat daher dort, wo bei kleinen Kindern und jungen Hunden nicht die nötige Reinlichkeit waltet, wo derselbe nur einfach weggewischt wird, immer mit Flöhen zu kämpfen.

Man muß daher große Reinlichkeit walten lassen, die Fußböden so behandeln, wie es bei der Vertilgung der Wanzen angegeben ist und zum Waschen auch Tabaksbeize verwenden, dann helfen auch Überstreunungen des Bodens mit Pyrethrumpulver und Einstreuen desselben in die Betten oder andere der anzuführenden Vertilgungsmittel. Insektenspulver wirkt aber nicht immer tödend, die Insekten werden vielfach nur betäubt, erholen sich nach einiger Zeit und treiben ihr Unwesen weiter. Man muß daher das Insektenspulver mit den betäubten Tieren sorgfältig zusammenkehren und sofort dem Feuer überantworten. Am Körper befindliche Flöhe müssen mit der Hand gefangen werden, in dichtem Haar verfangen sie sich. Es gilt auch als Vertilgungsmittel der Flöhe in erster Linie fleißige Nachschau und peinlichste Reinlichkeit.

Fliegen im Haus können nur durch Aufstellen von mit Bier oder Zuckerwasser gefüllten Fanggläsern, aus denen sie den Ausweg nicht mehr finden, durch Aufstellen von Fliegenleim, Fliegenpapier, Fliegenpulvern, Bestäuben mit den letzteren fern gehalten werden; dabei muß man aber Sorge tragen, Nahrungsmittel nicht unbedeckt am besten

sind Drahtgewebeglocken) umherstehen zu lassen, da diese die Fliegen anziehen. Die alte Fliegenklatsche ist wohl kaum mehr im Gebrauch.

Fliegen in Ställen kann man durch Verdunkeln derselben, dann durch Aufstellen der vorgenannten Mittel, Fliegen an den Tieren selbst durch Einreiben mit riechenden Mitteln, deren eine ganze Anzahl noch angeführt werden, abhalten. Schlimmer als die gewöhnlichen Fliegen sind die Schmeißfliegen, die ihre Eier in Fleisch, Käse u.s.w. ablegen und unter denen viele unserer Haustiere stark zu leiden haben. Auch der Schnaken (Stechmücke, Gelsen) sei hier gedacht, die überall in der Nähe stehender Wassertümpel, aber auch an fließenden Gewässern, Seen u.s.w. vorkommen, wegen der juckenden und beißenden Stiche sehr gefürchtet sind und denen man kaum entgehen kann; mitunter verirren sich diese Flügler auch in die Städte, wo man sie in Parkanlagen über Bäumen in hohen Säulen schwirren sieht. Die Schnake sticht mittels am Munde sitzender Borsten und das Einsaugen des Blutes wird in Gemeinschaft mit der Oberlippe bewirkt und es bleiben, wenn das Tier während des Stechens beziehungsweise Blut-saugens gestört wird, die Stachel in der mit scharfem Speichel infizierten kleinen Wunde zurück. Als bestes Mittel ist ganz sicher anzugeben, sich im Sommer und namentlich gegen Sonnenuntergang nicht an Orte zu begeben, wo stehendes Wasser und Buschwerk vorhanden ist, läßt sich aber dem nicht ausweichen, dann muß man sich durch Tabakrauch, durch Einreiben mit verschiedenen stark riechenden Essenzen, durch Verbrennen starker Rauch erzeugender Materialien vor den Gefahren des Überfallenwerdens schützen.

Den höchst gefährlichen Ungezieferarten gehört auch eine Stechmückenart (Moskitos) an, welche nach den jüngsten Forschungen die Ursache des Wechselfiebers oder der Malaria ist, die in sumpfigen oder überhaupt an stehendem Wasser reichen Gegenden auftritt. Der Stich der Stechmücke verursacht eine Infektion des Blutes durch Ma-

lariaplasmodien, die jeden dritten Tag Fieber erzeugen. Die Entwicklung in der Mücke ist für die drei nachgewiesenen Parasitenarten, es hat nämlich jede Wechselfieberform, das täglich wiederkehrende, das jeden zweiten und das jeden dritten Tag auftretende Fieber eine eigene Plasmodienart als Erreger, ganz die gleiche, dagegen weisen sie im Menschenblut gewisse, morphologische Unterschiede auf. Es hat sich herausgestellt, daß die menschliche Malaria hauptsächlich durch Anophelesarten, daneben vielleicht auch durch einige Culexarten (*Culex pipiens*) übertragen wird. Die Männchen der Moskito's sind harmlos; dagegen brauchen die Weibchen das menschliche Blut, um ihre befruchteten Eier zur Entwicklung zu bringen. Sie fliegen dann meist nach Sonnenuntergang aus, zu den Behausungen der Menschen, saugen sich mit Blut voll und legen ihre Eier in kleinen Tümpeln ab. Diese Gewohnheiten erklären eine große Reihe epidemiologischer Erfahrungen, die vor dieser Kenntnis schwer zu deuten waren. Da die Anopheleseier nur auf den Wasseroberflächen, und zwar auf möglichst ruhigen zur Entwicklung kommen, ist auch das Auftreten des Malariafiebers an einen gewissen Grad von Feuchtigkeit gebunden und es ist ja bekannt, daß gerade dumpfige Gegenden als Malariaherde verrufen sind. Sehr begünstigt wird der Ausbruch des Fiebers aber auch durch Bodenumwälzungen jeder Art, wie sie zum Beispiel beim Bau von Eisenbahnen, Wasserstraßen und anderen Anlagen unvermeidlich sind. Die dabei entstehenden Unebenheiten geben in regenreichen Landstrichen Gelegenheit zur Entstehung kleiner Tümpel, auf denen die Moskito's ihre Eier ablegen können. Auch zeitlich ist der Ausbruch der Malaria in den Tiesen an die regenreichen Perioden gebunden und besonders gefürchtet ist die Zeit, die dem Aufhören der Regenperioden ein Ziel setzt. Es hängt dies damit zusammen, daß das Wachstum der jungen Anopheles etwa einige Wochen in Anspruch nimmt und daß dann eine weitere Zeit verstreichen muß, bis die Malariaparasiten in den infizierten Moskito's ihren Entwicklungsgang vollendet haben. Dazu kommt dann noch

die etwa zehntägige Inkubationszeit, so daß der Ausbruch des Fiebers gewöhnlich erst einige Wochen nach der Zeit der großen Regenfälle eintritt.

Mit den Lebensgewohnheiten der Anophelesbrut hängt auch die häufig so außerordentlich räumliche Begrenztheit der Malariaherde zusammen. Übereinstimmend wird nämlich von allen erfahrenen Beobachtern angegeben, daß die Anophelesarten ein sehr schwaches Fliegevermögen besitzen und sich daher nur auf kurze Strecken von ihren Brutplätzen entfernen. Malariaherde werden sich daher nur dann ausbilden, wenn in der Nähe einer menschlichen Behausung Sümpfe vorhanden sind, in denen die Weibchen ihre Eier ablegen können.

Von großer Wichtigkeit ist auch die Beschaffenheit, vor allem die Sauberkeit eines Hauses für die Malaria Gefahr. Die Moskitos halten sich mit Vorliebe in dunklen und staubigen Ecken auf und der Schmutz begünstigt daher ihre Ansiedlung. Besonders werden die Wohnungen der Eingeborenen heimgesucht, wozu offenbar der Umstand beiträgt, daß der durch mangelhafte Reinigung verursachte Geruch die Moskitos anlockt: es gilt daher als gefährlich, seinen Wohnsitz in allzu großer Nähe der Eingeborenenwohnungen aufzuschlagen. Daß endlich, wie allgemein bekannt, die Nachtstunden so außerordentlich gefährlich sind, hat seinen Grund darin, daß die Moskitos um diese Zeit zum Blutsaugen ausfliegen. Nur ganz vereinzelt Arten stechen auch am Tage.

Die Maßregeln, die sich gegen die Moskitos und damit gleichzeitig gegen das Auftreten des Malariafiebers anwenden lassen, sind in erster Linie vorbeugender Natur. Es ist außerordentlich wichtig, die Vertiefungen, in denen sich Wasser ansammeln kann, zu verschütten, andere Wasserflächen und insbesondere Sümpfe durch geeignete Drainage trocken zu legen, feuchten Boden in warmen Gegenden mit Eukalyptuspflanzen zu besetzen, die außerordentlich wirksam sind. Dort, wo ohne auffallend feuchten Boden das Malariafieber vorkommt, ist der sehr poröse Untergrund stark

mit organischen Substanzen überladen. Alle dunklen Räume, in denen die Moskitos überwintern können, sind von diesen Blutjaugern und deren Eiern zu reinigen und in reinem Zustande zu erhalten. Wohngebäude und Räume, in denen sich Menschen aufhalten, sollen in der Nähe von Sümpfen nicht errichtet werden; vor den umherstirrenden Moskitos muß man sich durch Netze an Fenstern und Betten schützen, denn nicht die Sumpfluft ist die Urheberin der Krankheit, sondern lediglich das Insekt.

Da die Moskitos ihre Eier auf leichten Wasserflächen ablegen, so muß man diese zumeist dort vernichten und geschieht dies am besten durch Aufgießen von Petroleum. Das leichte Petroleum, von dem nur geringe Mengen erforderlich sind, verteilt sich in einer dünnen Haut auf der Wasserfläche und unter der Einwirkung desselben ist der Entwicklung der Eier vorgebeugt, sie sterben ab und damit sind der Vermehrung die Bedingungen entzogen.

Für die Heilung der Krankheit wird innerlich Chinin genommen, das glänzendste Spezifikum gegen die Plasmodien, die es tötet, die Mücke bezieht aber ihre Plasmodien aus dem Blut des Menschen.

Schafe werden von der Schaflausfliege, ein borstiges, ganz flügelloses Geschöpf von 5 mm Länge, die ein ganz gemeiner Schmarozer auf diesen Tieren ist (Schaflzecke oder Schafltecke genannt), befallen, die man am besten nach der Schur durch Zerdrücken tötet. Zecken sind milbenartige, blutjauende Schmarozer, die in zahlreichen Arten auftreten, Haustiere und Vögel (auch Menschen) befallen; sie leben auf Waldgebüsch und Sträuchern, hängen sich an vorübergehende Säugetiere, auch Vögel, bohren den Rüssel samt Kopf ein und saugen Blut. Da der Kopf bei gewaltsamem Versuch das Tier zu entfernen leicht abreißt, betupft man die befallene Hautstelle mit etwas Benzol, Kreosol, Erdöl, worauf das Ungeziefer vom Saugen abläßt und abgenommen werden kann. Igel- und Taubenzecken gehen auch auf Menschen über.

Die Krägmilbe ist wohl das ekelhafteste Ungeziefer, das sich beim Menschen überhaupt einfindet. Das Tier ist ein 0·25 bis 0·45 mm langes, häßliches, fast rundes, mit einzelnen Borsten besetztes Geschöpf, kriecht sich in und unter die Haut (zwischen den Fingern, am Handgelenk und über den Hüften beginnend) und verursacht die zäh anhaftende und ansteckende Krätzekrankheit, die ärztlicher Behandlung zu unterziehen ist. Auch Hunde, Katzen, Schafe werden von ähnlichen Krägemilben befallen, welche die »Räude« verursachen.

### Mittel gegen Wanzen.

Das Hauptmittel für die Bekämpfung der Wanzen ist neben der Anwendung einzelner wirksamer Mittel größte Reinlichkeit und andauerndes unermüdliches Nachsuchen an allen jenen Stellen, wo dieses Ungeziefer sich aufhalten kann.

Dort, wo man die Anwesenheit von Wanzen und deren Brut, die niemals fehlt, bemerkt hat, kann man durch gründliches Ausschweifen oder Formalindämpfe während mehrerer Tage Abhilfe gegen dieselben sich verschaffen, vorzuziehen ist es aber, sämtliche Ritze und Löcher in der Mauer und in der Decke, dann die Fußbodenleisten (nachdem man vorher Petroleum hinter dieselben gegossen hat) mit Mörtel oder Gips zu verichmieren, dann gut zu reifen (unter die Seifentauge kann auch Koloquintenabjud gegeben werden) und mit neuer Bemalung zu versehen. Sehr zweckdienlich sind Anstriche mit Ölfarben oder Emailfarben, bei deren Aufbringung alle feineren Ritze mit der Farbe ausgefüllt werden; aber einerseits sind solche Anstriche, obwohl sie leichteste Reinigung gestatten, im allgemeinen zu kostspielig und anderseits sind sie zu wenig beliebt: es ist ja auch richtig, daß ein selbst matter Anstrich nur dann gut aussieht, wenn die Flächen glatt sind.

Sind die Wanzen hinter Tapeten eingebürgert, wo ihnen die kaum zu vermeidenden losen Stellen vollkommen



Schutz bieten, dann sind wohl Ausräucherungen ziemlich vergeblich, auch nicht überall durchzuführen und es erübrigt nichts, als die Tapeten abreißen zu lassen und die Wände mit einer Petroleum-Wasseremulsion ein- oder zweimal gründlich bestreichen zu lassen, wobei insbesondere Ritze und Löcher mit dem Pinsel oder der Bürste gut ausgestupft werden müssen. Wenn das Petroleum verflüchtigt ist, kann mit einem Kleister, dem Koloquintenabsud beigemischt ist, wieder neue Tapete aufgeklebt werden. Derartige Arbeiten lassen sich aber in bewohnten Räumen nicht durchführen und es ist zweifelsohne von wesentlichem Einflusse auf die Wanzenplage, daß man in den Miethäusern der Großstädte, in Arbeiterhäusern gezwungen ist, Wohnungen zu wechseln, ohne die neu zu beziehenden einer gründlichen Reinigung unterziehen zu können. Hierzu kommt noch, daß die Hauseigentümer in den seltensten Fällen die Wohnungen in stand setzen lassen, um Zinsverluste und Kosten zu vermeiden. Ob es möglich ist, durch starke Zugluft in den Wohnungen im Winter die Wanzen zu vernichten, wie von einer Seite angegeben wird, ist stark anzuzweifeln, aber es scheint Tatsache, daß während der Sommermonate nicht bewohnte Räume von dem Ungeziefer frei sind; es ist aber auch Tatsache, daß im Sommer die Wanzenplage am intensivsten ist.

Die Fußböden sind bei Vorhandensein von Wanzen wiederholt mit Schmierseifenlösung, mit Abkochung von Koloquinten, Sadebaumblättern, spanischem Pfeffer oder Insektenpulver (Pyrethrumblüten) zu waschen; die Fugen und die Zwischenträume der Wandleisten, die Türstöcke können mit Spiritus benetzt und dieser dann angezündet werden, oder man bringt Petroleum oder Insektentinkturen in dieselben. Nach der gründlichen Reinigung sollen die Fugen der Dielen verkittet und dann mit einem Lack- oder Lackfarbenaustrich versehen werden, der kleine Ritze versichert. Bei harten Fußböden ist häufiges Einlassen mit Terpentinölwachswichse sehr empfehlenswerth und vernichtet diese ebenfalls vorhandene Wanzen und deren Brut.

Bilder an den Wänden sind mittels eines guten Klebemittels mit flachem Papier zu verkleben, so daß dieses überall anliegt und dann ein- oder zweimal mit einer schnelltrocknenden Lackfarbe zu bestreichen. Um ganz sicher zu sein, soll der Falz des Rahmens, in dem das Glas oder das Bild liegt, mit einem plastisch bleibenden Kitt (Plastilina) ausgestrichen und dann das Glas oder das Bild fest in denselben hineingedrückt werden; dann ist den Wanzen auch von der Schauseite der Eintritt verwehrt.

Betten sind ebenfalls sehr beliebte Schlupfwinkel der Wanzen, sie müssen zerlegt, die einzelnen Teile, namentlich die Einschlöcher der Haken, die Leisten usw. sorgfältig nachgesehen und mit Petroleum oder einem anderen Wanzenvertilgungsmittel bestrichen werden; der Geruch des Petroleums ist zwar abscheulich, aber seine Wirkung ist unbestreitbar. In gleicher Weise muß man auch Schränke usw. behandeln, obwohl sie von den Wanzen weniger gerne aufgesucht werden. Als teils vorhandenes Ungeziefer tötendes, teils abhaltendes Mittel muß für das Innere der Bettstellen, das Innere und die gesamten Außenwandungen der Kasten und anderen Möbelstücke ein Anstrich mit schnelltrocknender Emailfarbe angesehen werden. Diese Emailfarbe, welche, wenn von richtiger Beschaffenheit, eine gewisse Zähigkeit besitzt, bedeckt bei zwei- bis dreimaligem Auftragen außer den Flächen auch alle Ritzen und Vertiefungen, die man mit dem Pinsel ausstupft, mit einem fest und hart werdenden, glänzenden Überzug, der vorhandenen Insekten den Austritt, zuziehenden aber den Unterschlupf verwehrt und als eines der sichersten Schutzmittel gegen das Einwandern der Wanzen zu bezeichnen ist. Die verhältnismäßig geringen Kosten werden durch das Freihalten der Möbelstücke von Ungeziefer reichlich aufgewogen.

Wanzen nisten sich ferner in den Abnähstellen der Matratzen, in den Falten derselben, in den Holzgestellen der Sprungfedermatratzen ein und können erstere mit Insektenspulver oder anderen nicht färbenden oder ägenden (verbrennenden) Tinkturen eingestäubt oder eingepinelt, letztere

mit Petroleum bestrichen werden, nachdem alle Wanzen und deren Brut, soweit man ihrer habhaft werden konnte, vernichtet sind. Es wird hier ausdrücklich nochmals betont, daß das Überhandnehmen der Wanzen in erster Linie auf nicht genügende Sorgfalt bei der Nachsuche, nicht regelmäßiger Wiederholung derselben zurückzuführen ist. Von der großen Zahl der Wanzenvertilgungsmittel leisten ja einzelne ganz gute Dienste, aber auch das beste Mittel sichert auf die Dauer nicht Wanzenfreiheit, wenn die erforderliche Nachschau in den Objekten, welche die Wanzen aufsuchen, nicht mit aller Sorgfalt geschieht und wenn die Vertilgungsmittel nicht in kurzen Zwischenräumen und durch längere Zeit hindurch in Anwendung kommen.

Fehr sagt über die Vertilgung der Wanzen: Haben sich dieselben hauptsächlich in den Mauer- und Fußbodenritzen festgesetzt, so kann man sie von den Betten so lange ferne halten, bis es möglich ist, sie in ihren gewöhnlichen Aufenthaltsorten zu vertilgen. Es geschieht dies durch Einstreuen von Insektenpulver in die Bettstellen und das Bettzeug. Die Anwendung von Insektenpulver gleichzeitig in Betten und Mauern würde unpraktisch sein, weil man die Wanzen nur veranlassen würde, sich andere Schlupfwinkel aufzusuchen. Nur mit tötenden Mitteln kann und muß man überall gleichzeitig operieren. Geht dies in energischer und den vorhandenen Umständen anpassender Weise, so ist der Erfolg dieser, übrigens allgemein bekannten Mittel sicher.

Von Bergenu wurden Versuche angestellt, um den Widerstand zu ermitteln, den Wanzen den einzelnen Vertilgungsmitteln entgegenzusetzen. Zu dem Zwecke wurden Wanzen gefangen und in reine, trockene, starke Glaszylinder gebracht, worin sich dieselben munter auf dem Boden bewegten: um den Tieren genügend Luft zu geben, wurden die Öffnungen der Glaszylinder mit reiner Watte verschlossen. Als Vertilgungsmittel wurden Hitze, chemische Mittel in pulver-, in flüssiger und in gasförmiger Beschaffenheit angewendet.

Die pulverförmigen Stoffe wurden mit einer Gummiballspritze, der sogenannten Insektenpulverspritze, als feinsten Pulverstaub den Tieren auf die Haut gebracht, so daß dieselben vollständig damit bestäubt wurden. Die flüssigen Mittel wurden in Form eines dichten Sprühregens mittels einer Gummiballspritze angewendet. Die gasförmigen Stoffe wurden durch ein Glasrohr — durchbohrter Kork mit Glasrohr — eingeführt.

Was nun die Wirkung der verschiedenen Mittel anbelangt, so setzen die Wanzen dem Einflusse der Wärme den geringsten Widerstand entgegen, da schon bei gelindem Erhitzen des Glaszylinders die Tiere sich wie rasend gebardeten und bald tot hinfielen.

Chemische Mittel in Pulverform ergeben weniger befriedigende Resultate. Insektenpulver mit 10% Bor säure, Naphthalin betäubten die Tiere vorübergehend; obwohl letztere völlig mit dem Pulver bestäubt waren und in dem Pulver zwei Stunden lang lagen, lebten sie doch noch und wurden später wieder ganz munter, als sie aus der Insektenpulver-Atmosphäre herausgebracht wurden. Naphthalin mit Alaunzusatz betäubte die Tiere und tötete nur einige Exemplare. Arsenige Säure, obwohl die Wanzen durch eine Staubhülle des giftigen Pulvers bedeckt waren und zwei Stunden in demselben lagen, vermochte ihnen nichts anzuhaben.

Chemische Mittel in flüssiger Form. Obwohl das Petroleum sofort tödlich wirkte, so vermag Bergenan daselbe wegen seiner Feuergefährlichkeit nicht zu empfehlen. Schwächer in seinen Folgen, doch auch nach kurzer Einwirkung als tödlich, erwies sich Terpentinöl; sehr energisch wirkte Terpentinöl mit einem Zusatz von Naphthalin, Wasserstoffsuperoxyd. Durch die stark oxydierend wirkende Eigenschaft desselben wurden die Tiere momentan gelähmt; sie lagen völlig wie leblos da, so daß es den Anschein hatte, als ob daselbe eine vernichtende Wirkung ausgeübt hätte. Doch nach zehn Minuten erwachten die Tiere aus ihrem lethargischen Zustande, wurden bald wieder munter;

nachdem sie zwei Stunden in der Flüssigkeit gelegen hatten, zeigte es sich, daß sie sich außerordentlich wohl darin befanden. Alkalische Karbolsäurelösung tötete sofort. Formalin: die Wirkung war gut, da die Wanzen bald leblos waren; die Anwendung ist aber wegen des Reizes, den das Formalin auf die Lunge ausübt unangenehm und dasselbe zudem auch kostspielig.

Gasförmige Stoffe: Chlor, schweflige Säure, Formaldehyd, führten sofort den Tod herbei; doch rät Bergenau von denselben wegen des starken, unangenehmen und nachhaltigen Geruches ab.

Bergenau jagt über die Bekämpfung der Wanzenplage: Eiserner Bettstellen (die Wanzen nisten sich auch in den gezogenen Röhren ein, aus denen solche gefertigt sind), werden mit einer Stichflamme (sogenannte Gebläselampen, wie sie zu vielen Zwecken in Gebrauch sind) durch Erhitzen der Teile mit der Brut vernichtet, wie denn das Verbrennen überhaupt das sicherste Mittel wäre, wenn man es überall anwenden könnte.

Der Fußboden ist mit einer Lösung von 1 kg Schmierseife in 14 l kochendem Wasser und 150 g technischem Natron versetzt, ordentlich mit Hilfe einer Bürste zu bearbeiten (Wurzel- oder Faserbürste), die Fugen ordentlich mit der Lösung zu imprägnieren und nach dem Trocknen mit Gips zu verschmieren oder besser mit Holzspänen auszufüllen oder mit Ölkitt zu verkitten. Die Wände sind mit der Schmierseifenlösung abzuwaschen, am besten aber mit einer Sprühregenspritze zu bearbeiten.

Holzbettstellen und Geräte werden ebenfalls mit einer Lösung abgespritzt. Das Stroh aus den Liegestätten wird verbrannt, während die Hülle desselben und die Bettdecken und Leintücher ausgekocht werden. Matratzen mit Rosshaar oder Federbetten, Polstermöbel usw. läßt man entweder desinfizieren oder behandelt dieselben mit gasförmiger schwefliger Säure oder mit Formaldehyd. Dieses Verfahren ist wohl als das unschädlichste und billigste zu bezeichnen, denn das Behandeln der Betten, Möbel und des

Fußbodens mit Benzin, Petroleum, Terpentinöl ist feuergefährlich und diese Mittel müssen immer wieder von neuem angewendet werden, da man nicht an alle von dem Ungeziefer infizierten Stellen gelangt. Ueberdies verursachen Terpentinöl und das ihm verwandte Kienöl besonders auf Stoffen jeder Art durch Oxydation Harzflecke, welche Staub aufnehmen und sehr häßlich aussehen. Der Gebrauch von Sublimatlösung, die nur mit Giftschein erhältlich ist, sowie Abkochungen von Sadebaumblättern (Abortivmittel), Koloquintenfrüchten ist aus naheliegenden Gründen zu verwerfen.

Sehr wirksam ist rohe Salzsäure in angemessen verdünntem Zustande; da aber mit derselben nur Fußböden, Holzbetten und Stühle behandelt werden können (deren Anstrich oder Politur unter der Einwirkung der Salzsäure leidet), ist eine Vertilgung der Wanzen nur bei diesen Objekten möglich. Das Durchräuchern der Betten, Sofa usw. mit gasförmiger schwefliger Säure in geschlossenen Zimmern bleibt immer notwendig, um die Wanzen gänzlich zu vernichten. Ebenso ist es erforderlich, etwaige Nester von Hauschwalben oder Schlafstellen von Fledermäusen, die beliebte Schlupfwinkel der Wanzen sind, zu zerstören, ebenso Tauben- und Hühnerställe gründlich zu reinigen und entweder mit alkalischer Seifenlösung oder mit gasförmiger schwefliger Säure zu behandeln.

Als einfaches, billiges und geeignetes Mittel ist Ammoniak anzusehen; es wirkt sicherer als alle Tinkturen, welche zum Anstreichen von Möbeln bestimmt sind, weil das Gas in die feinsten Fugen eindringt und sicher das Ungeziefer tötet. Ammoniak schadet auch den Farben von Stoffen usw. an sich weniger als das Verbrennen von Schwefel, bei dem die gebildete schweflige Säure sehr leicht durch Sauerstoffaufnahme zu Schwefelsäure oxydiert wird, die eine nachhaltige zerstörende Wirkung auszuüben vermag. Man stellt in einem von Wanzen heimgesuchten Zimmer mehrere flache Schalen da und dort auf, füllt dieselben mit starker Ammoniakflüssigkeit (Salmiakgeist), hält das Zimmer mehrere Tage streng verschlossen, worauf man durch Öffnen der

Fenster und Türen für Wiederherstellung reiner Luft sorgt. Wenn der Verdacht auf Wanzen begründet war, das heißt wenn das Ungeziefer wirklich vorhanden gewesen ist, so wird man wohl zwar tote aber keine lebenden Wanzen finden. Sind mehrere Zimmer infiziert, so wendet man das Verfahren am besten in allen Räumen an, um das Entkommen der Tiere zu vermeiden.

Das Ausstäuben von Wohnräumen und des Bettwerkes mit einem zuverlässigen Insektenpulverpräparat wird als leichter und sicherer als das Auschwefeln bezeichnet, dabei aber doch bemerkt, daß auch das allerbeste reinste Phrethrupulver nur in den seltensten, sozusagen nur in ganz milden Fällen ausreicht. Es ist bekannt, daß Insektenpulver in erster Linie betäubend wirkt, daß die Parasiten also am Leben bleiben, und daß die Bettwanze von der vorsorglichen Mutter Natur mit einer derart zähen Lebensfähigkeit ausgerüstet worden ist, daß man ihr nur mit den kräftigsten Mitteln beikommen kann.

Absoolutes Erfordernis beim Ausstäuben von Pulvern ist, daß ein solches mittels einer kräftigen Spritze in alle Fugen und Ritzen der Tapeten und Verkleidungen, in alle Ritze und Fugen der Möbel reichlich verstäubt und daß das Bettzeug selbst damit energisch behandelt werde. Ein Aufwaschen des Zimmers darf niemals vorher, sondern erst am Tage darauf stattfinden und muß nach erfolgtem Einstäuben dasselbe bis am nächsten Tage geschlossen bleiben. Wegen diesen Punkt wird sehr oft gefehlt.

Schwefelkohlenstoff ist als Wanzenvertilgungsmittel geeignet, nur muß wegen der leichten Entzündbarkeit der Dämpfe offenes Licht bei der Anwendung ausgeschlossen sein. Man schließt den von Wanzen heimgesuchten Raum möglichst luftdicht ab und stellt einige Schalen mit Schwefelkohlenstoff gefüllt darin auf. Natürlich darf der Raum durch mehrere Tage nicht betreten werden und man muß vor der Wiederbenützung gut lüften.

In Möbeln, Betten usw., die in einem dicht verschlossenen Raume Schwefelkohlenstoffdämpfen ausgesetzt

sind, werden Wanzen, Motten und Holzwürmer in derselben Art vertilgt. Für Holzwürmer müssen die Dämpfe aber längere Zeit einwirken.

Als wirksame, einfach auszuführende und billige Reinigungsmethode hat sich folgende bewährt: Die Wanzenbrutstellen bestreicht man mittels eines Pinsels mit einer Flüssigkeit, welche aus Naphthalin und rohem Terpentinöl besteht. Durch die Wirkung des Geruches kommen die Tiere nun sofort aus den Rissen, Spalten und Fugen heraus. Man spritzt jetzt die Tiere von den Wänden, Möbeln, Bettstellen usw. ab und schrubbert unmittelbar darauf mittels einer heißen Karbolseifenlösung (auf 10 l kochendes Wasser gießt man 1 l flüssige Karbolseife) den Fußboden, der durch dieses Verfahren gleichzeitig gründlich desinfiziert wird. Das Naphthalin-Terpentinöl wird durch Auflösung von

10 g Naphthalin in

1 l Terpentinöl hergestellt. Zwecks Herstellung der Karbolseifenlösung werden gleiche Teile gewöhnliche Schmierseife und rohe Karbolsäure bis zur klaren Lösung in einem Kessel verdünnt. Nach erfolgter Reinigung sind die Wände frisch zu streichen.

### Wanzeninkturen.

1. 2 Gewichtsteile Tabak werden mit  
15 Gewichtsteilen Terpentinöl durch acht Tage digeriert, nach dieser Zeit abgepreßt und die Flüssigkeit abfiltriert. Im Filtrat löst man  
2 Gewichtsteile Rohnaphtalin und  
0.2 » Melissenöl. Diese Wanzeninktur wird in die Fugen und Risse der Möbelstücke, des Fußbodens und der Wände gesprüht.
2. 500 g Tabak und  
500 g Chrysanthemumblüten werden mit  
5 l Spiritus durch acht Tage digeriert, dann abgepreßt, filtriert, dem Filtrate



100 g Bor säure,  
500 g Karbolsäure und  
20 g Zitronellaöl zugelegt.

3. 10 Gewichtsteile Terpentinöl,  
10 „ Petroleum und  
5·4 „ Spiritus werden gemischt und  
in dem Gemisch  
2 „ Naphthalin aufgelöst.

4. 10 Gewichtsteile Petroleum,  
8 „ Holzteer und  
50 „ Terpentinöl werden zusammen-  
gemischt.

5. Wanzentinktur nach Töllner:

150 Gewichtsteile Insektenpulver (Phrethrum=  
blüten),

50 „ Koloquinten werden mit

1000 Gewichtsteilen 95%igem Spiritus durch acht  
Tage digeriert und nach Ablauf dieser Zeit die Masse aus-  
gepreßt und filtriert; dem Filtrate fügt man

50 Gewichtsteile Karbolsäure und  
100 „ Terpentinöl hinzu.

6. 15 Gewichtsteile bester gemahlener Paprika,  
15 „ weißer, gemahlener Pfeffer,  
5 „ Koloquinten werden mit

250 Gewichtsteilen 95%igem Spiritus ausge-  
zogen, der Auszug abfiltriert und in demselben

10 Gewichtsteile kauftisches Kali gelöst. Hierauf  
werden

200 „ Wasser und  
30 „ stärkster Salmiakgeist hinzu-  
gemischt.

7. 1000 Gewichtsteile Wasser,  
20 „ 50%ige Karbolsäure,  
2 „ Leinöl,  
20 „ 15%ige Kalilauge,

10	Gewichtsteile	Chlormagnesium,
30	"	Benzol,
1	"	Naphthalin.

Mehrmaliges Einpinseln tötet nicht allein die lebenden Tiere, sondern auch die Brut.

8. Nach einem französischen Patente sollen harzsaure Verbindungen, wie Natrium-Kalziumresinat, Natrium-Kupferresinat und Gemische dieser mit Alkaliresinaten in entsprechenden Lösungsmitteln (Benzin, Benzol usw.) gelöst, sich wirksam gegen Wanzen bewährt haben.

9. Die Fugen und Risse in hölzernen Bettstellen werden mit einem Teige aus

Insektenpulver und

Glycerin ausgestrichen oder die Mischung so dünnflüssig gemacht, daß sie sich in erstere eingießen läßt.

10.	100	Gewichtsteile	Terpentinöl,
	100	"	Petroleum,
	5	"	Salzsäure.

11.	120	Gewichtsteile	Terpentinöl,
	50	"	Petroleum,
	6	"	Eßigsäure.

12.	120 g	Borjäre,
	120 g	Karboljäre,
	240 g	Salizyljäre,
	10 g	Zitronen- oder Zitronellaöl, gelöst in
	8 kg	Tabakertrakt. Der Tabakertrakt wird hergestellt durch Ausziehen von

	400 g	ordinärem Rauchtobak mit
	2 kg	45% igem Spiritus und Filtration.

13.	100	Gewichtsteile	Terpentinöl,
	100	"	Petroleum,
	25	"	Spiritus.

14.	150	Gewichtsteile	Terpentinöl,
	10	"	eßigsäures Ammoniat,
	50	"	Salniatgeist.

## 15. Wanzen=Creme:

Salbenartige Verreibung aus:

Kali-*seife*,  
 Terpentinöl und den  
 Elementen von Kapsikum.

16. 10 Gewichtsteile Schmierseife werden unter Er-  
 wärmen in

20 Gewichtsteilen Wasser zerteilt, dann

20 Gewichtsteile Glycerin hinzugesetzt und die  
 Masse noch mit

180 Gewichtsteilen Wasser verdünnt.

17. Behufs Vertilgung des Ungeziefers in Wohnungen werden die Wände abgekratz, die Löcher und der Sockel bis zu einer Höhe von 10 cm mit Karbolsäure oder mit Ljzol ausgespritzt und mit einem Gemisch von Teer verputzt. Sodann werden die Wände mit einem Ge-  
 misch von

0.5 kg Kalk,

1.0 kg Teer und

0.3 kg Ljzol überstrichen. Bei Verwendung dieser An-  
 strichmasse muß den Malerfarben vor dem Auftragen Maun  
 zugesetzt werden.

6 Gewichtsteile Karbolineum,

2 „ Unschlitt,

2 „ Terpentinöl,

0.4 „ Knoblauchsaft. Das Unschlitt wird ge-

schmolzen, der Knoblauchsaft, durch Auspressen von Knoblauch  
 gewonnen, zugesetzt und erhitzt, sodann, wenn auf Hand-  
 wärme abgekühlt, Karbolineum und Terpentinöl zugerührt.  
 Diese Insektentinktur ist von überraschender Wirkung.

## Mutan

stellt ein nach Formaldehyd riechendes Pulver dar; dasselbe  
 kann hergestellt werden, indem man

10 Gewichtsteile Gips, totgebrannt,

10 „ Federweiß mit so viel einer

40° ige Formaldehydlösung trinkt, daß es eben schwach feucht erscheint. Es muß in gut geschlossenen Dosen verpackt werden und gelangt mittels eines Zerstäubers zur Anwendung.

### Schweflige Säure gegen Wanzen.

Hinsichtlich des Auschwefelns, welches noch vielfach bei Zimmern und Wohnungen überhaupt angewendet wird, sagt ein Fachmann: Es ist dies an und für sich ein ganz gutes Mittel, nur muß man sich immer klar sein, daß zu einem mittelgroßen Zimmer immerhin 2 bis 3 kg Schwefel gehören, die vollständig verbrannt werden müssen. Es ist hierbei erforderlich, daß der Zutritt durch Verkleben aller Spalten, und zwar nach Möglichkeit verhindert und daß das betreffende Zimmer mindestens zwei Tage den Einwirkungen der Schwefeldämpfe ausgesetzt ist. Die ganze Prozedur ist also ziemlich umständlich, wozu kommt, daß Lack, Politur und Metallbeschläge usw. stark leiden und leicht völlig verdorben werden können.

Es kommt aber noch ein anderer Umstand hinzu, der schwer gegen das Auschwefeln von Wohnräumen spricht, soferne bei der Prozedur nicht alles aus denselben entfernt wird, und das ist die Einwirkung der schwefligen Säure auf die Gewebe der Polstermöbel, Betten usw. Die schweflige Säure findet in dem Raum, in dem sie erzeugt wurde, keinen Ausweg, ja sie soll keinen finden, sonst wird die beabsichtigte Wirkung nicht erzielt. So soll alles von der schwefligen Säure durchdrungen werden, dieselbe schlägt sich überall nieder, wird auch von Feuchtigkeit aufgesogen und oxydiert bei Zutritt der Luft zu Schwefelsäure. Die schweflige Säure wirkt bleichend, es können also die Farben der Gewebe oder der Tapeten, der Stoffe sehr leicht durch dieselbe verändert werden, aber weit größere Gefahr bietet die gebildete Schwefelsäure dadurch, daß sie die Gewebe angreift, dieselben brüchig macht, so daß sie in verhältnismäßig kurzer Zeit zugrunde gehen. Jedwedes Metall, wie die Stahlfedern

der Polstermöbel usw., wird ebenfalls angegriffen und es ist daher anzuraten, nur leere Wohnräume mit schwefliger Säure, also durch Verbrennen von Schwefel in denselben zu reinigen. Hier dringt das Gas in alle Risse und Sprünge der Mauern, beziehungsweise des Verputzes, in die Fugen bei Fensterrahmen und Türverkleidungen, der Fußböden und zerstört alle Insekten. Ob aber die schweflige Säure auch auf Eier einwirkt, muß zum mindestens angezweifelt werden; es ist anzunehmen, daß diese nicht abgetötet werden und daß hierzu nur ein flüssiges Zerstörungsmittel sich eignet.

### Insektenpulver, Pyrethrumblüten.

Alles, was unter dem Namen Insektenpulver, kaufmännisches Insektenpulver im Handel vorkommt, besteht aus den gemahlten Blütenköpfchen von Pyrethrumarten, einer in Kleinasien, im Kaukasus, in Dalmatien vorkommenden Pflanze der Familie der Kompositen (*Chrysanthemum*), als persische Kamille (*Pyrethrum roseum*, *Chrysanthemum roseum* W. et M.) bezeichnet. Abarten dieser Pflanze kommen im Kaukasus, in Armenien (Iowizabek = Flohkraut genannt), in Dalmatien (*Pyrethrum cinerariaefolium* Trev.) vor, ebenso auch in Montenegro. Auch die Blütenköpfchen von dem Mutterkraut (*Chr. parthenium* Bernh. = *Matricaria parthenium* L.), die beim Zerreiben einen unangenehmen Geruch geben, werden hie und da als Insektenpulver verwendet oder diesem beigemischt.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die betäubenden oder tötenden Wirkungen der Blüten auf die Insekten schon lange Zeit bekannt sind und daß man sich ihrer im Orient allgemein bedient hat. Schon der verstorbene Botaniker Professor Koch hat in den Ländern südlich vom Schwarzen Meer und auch späterhin in Persien die Erfahrung gemacht, daß die Ungezieferplage besonders in den armeligen Hütten, in denen er oft übernachten mußte, sich nur einigermaßen dadurch mildern ließ, daß man das Lager vorher mit ge-

getrockneten Blüten bestreut, die auch in dem bescheidensten Haushalte sich stets in genügender Menge fanden und bereitwilligst angeboten wurden. Sie hatten noch einen ziemlich starken Geruch und man erwachte bisweilen insofgedessen morgens mit etwas Kopfschmerz, der aber bald verschwand, während die Quälgeister in Scharen tot oder betäubt auf der Streu umherlagen. Noch fand auch bald die Pflanze, die er schätzen gelernt hatte, im Freien und lebend, wo sie ganze Landstriche als Unkraut bedeckte und stellte sie nach Gattung und Name fest, veranlaßte sogar indirekt die Einfuhr in die zivilisierten Länder, wo die Blüten als Insektenpulver unentbehrlich geworden sind.

Man unterscheidet Blütenkörbchen von kaukasischen, persischen, armenischen und dalmatinischen (montenegrinischen) Pyrethrumpflanzen, die in Geruch und Färbung in gepulvertem Zustande keine wesentliche Verschiedenheit zeigen; die ganzen Blütenkörbchen zeigen aber in der Färbung der Strahl- und Scheibenblüthen, dann auch in der Größe Unterschiede und ist es daher empfehlenswert große Mengen des Pulvers durch Mahlen der Blüten selbst herstellen zu lassen. Dem aus Dalmatiner Pyrethrumblüthen hergestellten Insektenpulver wird eine kräftigere Wirkung zugeschrieben, als den anderen Sorten und die Wirkung ist auch bei frisch gemahlenen Blüten intensiver als bei älterem Pulver. Die Blütenköpfe werden gesammelt, im Schatten getrocknet und gut verschlossen bis zum Vermahlen aufbewahrt; die Wirksamkeit des Pulvers ist bedingt durch die Sorgfalt, welche beim Sammeln, Trocknen und Vermahlen der Blütenköpfe angewendet worden ist. Die wirksamen Bestandteile der Pyrethrumblüthen sind mit Sicherheit noch nicht ermittelt, ebensowenig die Art der Wirkung auf die Insekten. Mit einiger Wahrscheinlichkeit schreibt man den Inhaltsstoffen der an den Fruchtknoten sitzenden Harzdrüsen (ätherisches Öl und eine flüchtige Säure) eine für Insekten tödliche Wirkung zu. Erforderlich ist es, daß das Insektenpulver fein zerteilt und möglichst durch einen Zerstäuber in der Luft aufgewirbelt, zur Anwendung kommt.

Zusätze, beziehungsweise Fälschungsmittel des Insektenpulvers sind Quillajarindenpulver, wodurch es wohl die Schleimhäute der Nase reizt, aber wohl kaum eine größere Wirksamkeit erhält, dann Sabadillamen, Kockelskörner, Nießwurz, Staphisagria, Wermut und Rainfarren, dann alte Kamillen mit oder ohne Zusatz von Anis, 2 bis 3<sup>o</sup>, Eukalyptusöl. Auch gepulverte Zweigspitzen von *Croton flavens*.

Die Prüfung soll am besten in der Weise vorgenommen werden, daß man Fliegen oder andere Insekten damit in Berührung bringt; je rascher diese getötet werden, um so besser ist das Pulver.

Man hat dem Insektenpulver aus *Pyrethrum* verschiedene Namen gegeben, wie Zacherlin, Thurmelin, überseeisches Pulver, Rapidpulver, auch kommen im Handel zusammenge setzte Insektenpulver, metallisches Insektenpulver, karburiertes Insektenpulver u. a. vor.

Die gemahlene *Pyrethrum*blüten finden ausschließlich bei Menschen und Tieren als Insektenvertilgungsmittel Anwendung, da sie für andere Verwendungen zu teuer sind; man muß sich aber immer vor Augen halten, daß selbst das beste derselben nicht unter allen Umständen tötet, sondern vielfach nur betäubt, man also wohl den Zweck einer begrenzten Abwehr, nicht aber der Vernichtung erreicht.

### Zusammengesetzte Insektenpulver.

1. 1 Gewichtsteil *Pyrethrum carneum* (persische Blüten),  
1       »       *Pyrethrum cinerariaefolium* (dalmatinische Blüten).
2. 1 Gewichtsteil *Pyrethrum carneum* (persische Blüten),  
1       »       *Pyrethrum roseum* (armenische Blüten),  
1       »       *Pyrethrum cinerariaefolium* (dalmatinische Blüten).

3. 7 Gewichtsteile Pyrethrumpulver,  
3 „ Quassiapulver.  
1 Gewichtsteil Nießwurzpulver.
4. 8 Gewichtsteile Pyrethrumpulver,  
8 „ gemahlener Borax,  
4 „ gemahlener Schwefel.
5. 8 Gewichtsteile Pyrethrumpulver,  
8 „ gemahlener Borax,  
0.3 „ Poleiöl oder Eucalyptusöl.

Die Mischungen, welche Borax enthalten, dienen insbesondere als Vertilgungsmittel für Rissen und Schaben.

### Karburirtes Insektenpulver.

Ein Insektenvertilgungsmittel, welches bedeutend billiger als das sogenannte persische Insektenpulver (gemahlene Pyrethrumblüten) ist und dabei größere Wirksamkeit aufweisen soll, wird folgendermaßen hergestellt: In ein Gemisch aus Magnesia und Stärkemehl wird durch längere Zeit karburirtes Leuchtgas geleitet, bis das Pulver möglichst mit den riechenden Kohlenwasserstoffen gesättigt ist. Dann mischt man das ganze sorgfältig mit der doppelten Menge scharf getrocknetem Dalmatiner Insektenpulver.

### Metallisches Insektenpulver,

das von Calao aus in den Handel gebracht wird, besteht außer 17.5 „ Pyrethrumpulver und etwas kohlen-saurer Magnesia zum größten Teil aus Zinkstaub, ein Zusatz, der, da er bleihaltig, in gesundheitlicher Beziehung nicht un-gefährlich ist.

### Mittel gegen Fliegen, Bremsen usw.

Diese Mittel zur Vertilgung, welche hier angeführt werden, sind sehr verschiedenartiger Natur und kommen dort, wo sie als Schutz gegen die Fliegen im Hause dienen, be-



ziehentlich solche vernichten sollen, die nachgenannten in Anwendung:

Fliegenpapiere (klebende Papiere);

Fliegenleim;

Fliegenwasser;

Streupulver;

Fliegenessenzen;

Fliegenpulver;

Fliegenjalen.

Die Schutzmittel für Pferde, Rindvieh bestehen aus Vorsehrungen, die in den Ställen getroffen werden, und in Einreibungen auf den Tierkörpern mit stark riechenden, wässerigen oder öligen Flüssigkeiten.

### Fliegenpapiere.

1. 25 Gewichtsteile einer Quassiaabkochung (1:10 Wasser) werden mit

6 Gewichtsteilen braunem Zucker und

3 „ gemahlenem Pfeffer gemischt und

mit der Flüssigkeit, die immer gut aufgerührt werden muß, Fließpapier getränkt.

2. 1 Gewichtsteil gemahlener Pfeffer und

1 „ brauner Zucker werden mit der er-

forderlichen Menge Milch vermischt und auf einem Teller, der mit Fließpapier belegt ist, ausgegossen.

3. (giftig) 75 Gewichtsteile Quassiaholz werden mit

200 Gewichtsteilen Wasser bis auf die Hälfte

eingekocht, die Kolatur

mit 5 „ wird Kobaltchlorid,

1 Gewichtsteil Brechweinstein und

40 Gewichtsteilen Tinktur aus weißem

Pfeffer 1:3 Spiritus versetzt, mit der Lösung Fließpapier getränkt und dieses auf Tellern ausgelegt.

4. 20 Gewichtsteile Quassiaholz werden mit

100 Gewichtsteilen Wasser 24 Stunden mazeriert,

eine halbe Stunde gekocht und nach 24 Stunden abgepreßt.

Die Flüssigkeit wird mit 3 Gewichtsteilen Melasse gemischt und auf 10 Gewichtsteile verdampft. Mit der Flüssigkeit tränkt man Fließpapier und legt solches auf Tellern aus.

5. 5 Gewichtsteile doppeltchromsaures Kali,

15 " Zucker,

1 Gewichtsteil ätherisches Pfefferöl werden in

80 Gewichtsteilen Wasser gelöst und

10 Gewichtsteile Alkohol zugefügt. Mit dieser Lösung tränkt man ungeleimtes Papier und trocknet dann gut.

6. (giftig) 100 Gewichtsteile Quassiaholzspäne werden mit

400 Gewichtsteilen Wasser gekocht, so daß 250 Gewichtsteile Kolatur entstehen, dazu eine Tinktur bereitet aus

30 Gewichtsteilen langem Pfeffer mit  
100 " 45%igem Spiritus aus-  
ausgezogen, zuletzt

0.2 Gewichtsteile Brechweinstein zugefegt, wiederholt umgeschüttelt, Papier durchtränkt und dieses auf Schnüren getrocknet.

#### 7. Klebendes Fliegenpapier.

Auf festes Pergamentpapier streicht man

600 Gewichtsteile Kolophonium,

200 " Mohnöl,

100 " Melasse. Zur schnelleren Tötung der Fliegen kann noch Quassiaextrakt zugefegt werden.

#### 8. Fliegenharzpapier.

Man schmilzt nach Angabe des Apothekers Seidler über einer kleinen Flamme

2 Gewichtsteile gelbes Kolophonium,

1 Gewichtsteil dicken Terpentin und

1 " Leinöl; der Terpentin muß braun und

durchsichtig und darf nicht vertrocknet sein. Die Masse wird, so lange sie noch warm ist, mittels eines Pinsels auf Zeresin-papier gestrichen, indem man die Ränder freiläßt, gleich-

mäßig und jedes Überfließen vermeidend. Ein Arbeiter bedeckt jeden frisch gestrichenen Bogen mit einem zweiten nicht bestrichenen gleichmäßig. Um eine gleichmäßige Verteilung der Klebmasse zu bewirken, kann man jeden Doppelbogen auf einem verdünnten Blech mittels eines Rollholzes glattstreichen.

### Fliegenleim.

Von allen Mitteln, welche zur Bekämpfung der Fliegenplage angewendet werden, haben sich die Fliegenleime noch am besten bewährt; sie wurden zuerst in der Weise angewendet, daß man ein Stück Holz, Papier usw. mit Leim bestrich und so die Fliegen, die auf den Leim gingen, vernichtete. Bald fand die Industrie, die sich mit der Herstellung solcher Leime befaßte, heraus, daß sich mit diesem Artikel, wenn er dem Publikum in einer handlichen Form geboten wird, ziemlicher Absatz erzielen ließe. Dementsprechend verbesserte sich auch bald nicht allein die Qualität des Fliegenleimes (*Seifensieder-Zeitung* 1908), sondern man fertigte auch Fliegenfänger in besonders handlicher, gefälliger und zweckentsprechender Form. Die jetzt in den Handel kommenden Fliegenfänger sind hauptsächlich in zwei Formen, in Gestalt einer Pyramide und in Gestalt einer Rolle, die aus einem Gehäuse mit Achse besteht, auf welcher letzteren ein mit Leim bestrichener Papierstreifen ist, der aus dem Gehäuse herausgezogen wird. Die Pyramide ist einfach aus Papier zusammengeklebt und mit einer breiten Basis versehen um überall stehen zu können. Bei der Rolle wird ein 1 bis 5 cm breiter Papierstreifen oder Leinwandgewebe mit dem Leim bestrichen und in einer Länge von 1 bis 5 m zu einer Rolle aufgewickelt. Die Enden der Achse laufen in dünne Drähte aus. Andererseits läßt man sich der Größe der Rolle entsprechende Pappkartons mit in der Mitte dieser Kartons befindlichen Löchern für die Rolle herstellen und befestigt hierin die Rolle, von der das Ende durch einen an der Ecke des geschlossenen Kastens befind-

lichen Schliß gezogen wird. Auf der entgegengesetzten Seite wird man einen Ring befestigen, so daß der Karton in der Richtung einer seiner Diagonalen, d. h. schräg, zu hängen kommt. Nach Bedarf zieht man den Papierstreifen heraus. Um nun auf die Herstellung des Fliegenleimes selbst zu kommen, so ist zu bemerken, daß ein guter Fliegenleim eine dauernde und gute Wirkung besitzen muß. Einige im Handel befindliche Fliegenleime besitzen zwar anfänglich eine solche, der Leim trocknet aber häufig bald aus und ist diese Erscheinung durch die unrichtige Zusammensetzung des Präparates bedingt. Es wurden bei derartigen Produkten trocknende Öle verwendet, die ihre Eigenschaft, klebrig zu sein, bald verloren. Trocknende und halbtrocknende Öle, wie Leinöl, Mohnöl, Sesamöl sind daher zu vermeiden. Auch sind Zusätze von flüchtigen Ölen, die bei warmem Wetter zu leicht verdunsten, nicht angebracht. Ausgenommen sind natürlich Parfüms. Als Hauptrohstoff dient Kolophonium, das wegen seiner klebenden Eigenschaften nicht zu umgehen ist, aber auch dieses trocknet in Vermischung mit trocknenden Ölen so weit aus, daß es als Fliegenleim nicht mehr zu verwenden ist. Mineralöl würde allerdings diesen Uebelstand aufheben und das Harz lange klebrig erhalten, doch schreift der spezifische Geruch schlecht gereinigten Mineralöls, der nur schwer zu verdecken ist, die Fliegen ab. Man wird daher zweckmäßig gut gereinigtes Mineralöl, das möglichst geruchfrei ist, verwenden. Bei bester Sorte Fliegenleim arbeitet man mit nicht trocknenden Ölen, z. B. Olivenöl, Mandelöl, Erdnußöl und ähnlichen, und schließt Mineralöl ganz aus. Die Fliegenleime besitzen meistens eine dickflüssige Konsistenz. Zum Bestreichen des Papiers erwärmt man sie bis zur Dünnflüssigkeit, nach dem Erkalten bilden sie dann die klebrige Masse in der erforderlichen Konsistenz, so daß solche nicht abfließen kann. Hierauf ist besonders zu achten. Der Erweichungs- beziehungsweise Verflüssigungspunkt der Masse darf nicht unter 30 bis 35° C sein, da sonst von den in der Sonne hängenden Fliegenfängern der Leim ablaufen würde. Statt Mineralöl kann man auch raffinierte

Harzöle verwenden, nicht raffinierte Harzöle trocknen zu schnell aus. Es ist auffällig, daß fast alle bekannten Vorräthen Leinöl und Mohnöl oder halbtrocknende Öle wie Sesamöl, Rizinusöl, Rübol usw., als Bestandteil angegeben und sind sich die Verfasser wahrscheinlich über die Wirkung dieser Öle nicht klar. Unzweifelhaft bilden die halbtrocknenden Öle eine Zeit hindurch eine klebrige Schicht, diese hält aber bei großer Hitze im Sommer nicht lange an. Außerdem aber wird die Trockenfähigkeit der Öle durch den Harzzusatz noch befördert. Aus dem Gesagten geht hervor, daß sich als bester Fliegenleim eine Mischung aus nicht trocknenden Ölen mit Harz bewährt. Billigere, aber ebenfalls gute Produkte kann man durch Zusätze von raffiniertem Harzöl und bestem Mineralöl erhalten. Das richtige Verhältnis der einzelnen Bestandteile werden einige Versuche bald lehren. Im allgemeinen wird man mit einer Mischung aus 2 Gewichtsteilen Öl und 1 Gewichtsteil Harz gute Resultate erzielen, jedoch spielt die Beschaffenheit des Harzes eine wesentliche Rolle.

Um die Fliegen anzulocken, kann man den Leim mit ätherischen Ölen, z. B. Anisöl oder Fenchelöl, oder Bienenwachsparfüm parfümieren. Honig und Sirup sind ebenfalls verwendbar. Sie verbinden sich zwar schlecht mit dem Harz-Ölgemisch und bilden dann mit demselben eine Schmiere, die aber doch aufgestrichen werden kann. Auch pulverisiertes Fleischmehl oder alte Käserinden in angefeuchtetem Zustande lassen sich als Lockmittel verwenden, doch sind diese Stoffe der Komposition schlecht beizumischen. Um die auf dem Leim feststehenden Fliegen baldigst zu töten, kann man konzentrierte Abkochung von Quassiaholz beimengen; andere Gifte, wie Arsenik, sind nicht zu empfehlen; die betreffenden Fliegenfänger müssen mit dem Vermerk giftig bezeichnet werden.

1. 100 Gewichtsteile Kolophonium,
- 50        „        Leinöl, über Feuer verflüssigen,  
dann
- 15        „        Honig hinzumischen.

2. 150 Gewichtsteile Kolophonium,  
50 » Weißpech werden mit  
50 Gewichtsteilen Leinöl zusammen geschmolzen und  
noch  
25—50 Gewichtsteile mit etwas Leinöl vermishtem  
Bogelleim hinzugefügt.
3. 100 Gewichtsteile Kolophonium,  
50 » dicker Terpentin,  
5 » rohes Rüßöl,  
1 Gewichtsteil Honig.
4. 50 Gewichtsteile Sesamöl,  
11 » ganz dunkles Kolophonium.

### Fliegenwasser.

1. 10 Gewichtsteile Eukalyptusöl,  
5 » Eßigäther,  
20 » Kölnerwasser,  
5 » Nelkenöl,  
100 » Insektenpulver-Tinktur.
2. 15 Gewichtsteile Eukalyptusöl,  
15 » Eßigäther,  
5 » Bergamottöl,  
300 » Spiritus,  
50 » Insektenpulver-Tinktur.

### Streupulver gegen Fliegen.

- a) 5 Gewichtsteile gepulverter langer Pfeffer,  
5 » gemahlenes Quassiaholz,  
10 » gemahlener Zucker werden ge-  
mischt und die Mischung mit  
4 Gewichtsteilen verdünntem Alkohol angefeuchtet,  
getrocknet und dann wieder gemahlen. Das Pulvergemisch  
wird in gut verschlossenen Gefäßen aufbewahrt und behufs  
Gebrauches auf einem Teller ausgestreut.

- b) 4 Gewichtsteile gepulverte Iriswurzel,  
15        »        Stärkemehl,

1 Gewichtsteil Eukalyptusöl werden gemischt und in eine verschließbare Streubüchse gefüllt. Die von den Fliegen hauptsächlich heimgesuchten Orte, z. B. Fensterbretter, Tischflächen usw., werden mit dem Pulver bestäubt.

### Fliegenessenzen.

1. 10 Gewichtsteile Eukalyptusöl,  
3        »        Bergamottöl,  
10        »        Essigäther,  
50        »        Eau de Cologne,  
100        »        90%iger Spiritus. Diese Mi-

schung ist mit der 10fachen Mischung Wasser zu versetzen und mehrmals in den Zimmern zu zerstäuben. Auf der Haut ist die reine Essenz einzureiben.

2. 10 Gewichtsteile Eukalyptusöl,  
3        »        Essigäther,  
40        »        Eau de Cologne.

Mit dieser Mischung, nachdem sie mit 3 bis 6 Teilen Wasser verdünnt ist, ist die Haut, das Kopf- und Barthaar täglich mehrmals zu bestreichen. Im Zimmer zerstäubt man eine Mischung von 1 Teil der Essenz mit 10 Teilen Wasser.

### Fliegenpuder.

- 5 Gewichtsteile Eukalyptusöl,  
85        »        Stärkepulver,  
10        »        Talkum, weiß.

Die pulverigen Substanzen werden gut gemischt, das Eukalyptusöl beigegeben; mit dem Puder werden Kopf und Hände öfters im Tage trocken abgerieben.

### Fliegenjälbe.

- 50 Gewichtsteile festes Paraffin,  
45        »        Paraffinöl (Bajelinöl), weiß,

## 4 Gewichtsteile Eukalyptusöl und

1 Gewichtsteil Anisöl. Das feste Paraffin wird mit dem Öl zusammengeschmolzen, Eukalyptusöl und Anisöl hinzugemischt und in passende Formen gegossen. Die gegen Fliegen zu schützenden Körperteile werden mit dieser ziemlich festen Salbe eingerieben.

## Salbe gegen Fliegen in Ställen.

1. Guter Tischlerleim, mit wenig Wasser gekocht, wird mit einer konzentrierten Lösung von Chlorzink versetzt.

2. Leinöl, dicker Terpentin, Pech und Wollfett werden zusammengeschmolzen.

3. 500 Gewichtsteile Fichtenharz,  
400 » Stearinöl oder

4. 400 Gewichtsteile Rapsöl,  
400 » Aldipis,  
40 » Honig zusammeneschmelzen.

## Mittel gegen Fliegen und Bremjen bei Tieren.

Gegen die Fliegen in Ställen empfahl die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft folgendes:

1. Die Lichtdämpfung im Stalle. Man erreicht diese unter anderem, indem man die Fensterseiben mit Kalkmilch anstreicht, der auch zweckmäßig etwas Kreolin oder Alaun zugefugt wird; auch Waschblau kann etwas beigemischt werden. Die Erfolge sollen nachhaltig sein. Bei der Verschiedenartigkeit der Waschblauorten des Handels ist es jedoch zu empfehlen, Ultramarinblau zu verwenden, das als Mineralfarbe der Einwirkung des Lichtes besser Stand hält, als gewisse Waschblauorten, die bisweilen aus Stärke bestehen, die mit dem leicht bleichenden Indigofarmin blau gefärbt sind.

2. Einen öfteren Wandanstrich mit Alaunlösung oder Kreolin oder Karbolineum.

3. Ein gutes Durchlüften des Stalles derart, daß der Luftzug unterhalb der Decke entlang streicht. Man ersetzt



dann die Fenster durch Jalousien, die mit Karbolineum gestrichen werden.

Des weiteren empfiehlt es sich, an der Decke des Stalles Beifußbündel aufzuhängen. Unter Beobachtung der nötigen Vorsicht hält man dann einen Sack hier unter, schneidet das Bündel ab und tötet die Fliegen durch Eintauchen des Sackes in Wasser.

Man empfiehlt als probates Mittel vielfach die Dämpfung des Lichtes in der Weise, daß man die Fenster Scheiben des Stalles mit Kalkmilch unter Hinzufügung von Waschblau (muß kalkecht sein) verstreicht; infolge des hierdurch erzeugten Halbdunkels sollen sich die Fliegen schon nach wenigen Tagen verziehen. Es muß jedoch hervorgehoben werden, daß nicht jedermann dunkle Stallungen liebt.

Um den gleichen Zweck zu erreichen, sollen die Wände der Stallungen und deren Decken mit Kalkmilch gestrichen werden, der man 2% Antimonnin zugelegt hat; Antimonnin ist ein sehr kräftiges Desinfektionsmittel und verleiht dem Anstrich eine hellgelbe Färbung. Zu riechenden Teerölen, wie Karbolineum, Kreosol usw. steht es insbesondere dadurch im Gegensatz, daß es vollkommen geruchlos ist, die schlechten Gerüche in den Stallungen vertreibt und damit auch den Fliegen den Aufenthalt verleidet. Weiterhin bietet das Antimonnin den großen Vorteil, daß es infolge seiner hohen desinfizierenden Kraft das Mauerwerk der Stallungen vor Schimmelbildung und Mauerfraß, das Holz vor Schwamm und Fäulnis bewahrt und dabei in hervorragendem Maße luftreinigend wirkt.

### Schuzmittel gegen Bremsen bei Pferden (nach »Seifensieder-Zeitung«).

1. Eines der besten Mittel gegen Bremsen ist das Eukalyptusöl in Verbindung mit Lorbeeröl; auch Petersilienöl soll gute Dienste leisten. Man hat mit Erfolg auch nachstehend genanntes Verfahren angewendet: In Eukalyptus- oder Petersilienwasser läßt man so viel Kreolin träufeln,

bis eine milchige Trübung entsteht und hiermit werden die in Betracht kommenden Teile des Körpers mittels eines Schwammes tüchtig eingerieben. Der einzige Übelstand ist, daß ein zu großer Zusatz an Kreolin den Glanz der Haare mildert, sonst ist das Mittel aber gut und billig.

2. 1000 Gewichtsteile Lorbeeröl,  
       200       »       gepulvertes Naphthalin,  
       70       »       Tieröl und  
       15       »       Bernsteinöl werden zu einer Salbe zusammen verrieben.

3. 100 Gewichtsteile Lorbeerblätter und  
       20       »       Rosmarinblätter werden in  
       500 Gewichtsteilen Wasser längere Zeit gekocht und das verdampfende Wasser immer ersetzt.

Mit den unter 2 und 3 angeführten Mitteln werden besonders die Seiten, Hals und Beine der Pferde eingerieben. Diese Mittel sollen vorzüglich wirken.

4. Guten Erfolg hat auch das wie nachstehend zusammengesetzte Mittel ergeben: Man löst in  
       60 Gewichtsteilen denaturiertem Spiritus  
       10 Gewichtsteile Rohnaphthalin durch Erwärmen auf dem Wasserbad und setzt dann  
       5 Gewichtsteile Lorbeeröl und  
       10       »       Äther hinzu. Das Präparat, das man am besten mittels Lämpchens aufträgt, kann auch bei Schimmeln gebraucht werden.

5. Man verreibt:  
       1000 Gewichtsteile Lorbeeröl,  
       200       »       Eßigäther,  
       20       »       Klefenöl,  
       200       »       Philosophenöl zu einer Salbe und reibt damit Hals, Seiten usw. der Pferde ein.

6. Man läßt Schweinefchmalz mit Lorbeerblättern etwa fünf Minuten kochen, erkalten und reibt mit der Salbe die Tiere ein.

7. Es wird Fischtran mit Nesselöl und Lorbeeröl vermischt.

8. Mit einer Auflösung von

20 g Aloe in

2 l heißem Wasser wird das Tier bestrichen.

9. 3%iges Karbolwasser leistet gute Dienste.

10. Bremsenöl besteht aus:

a) 200 Gewichtsteilen Tieröl,

400 „ denaturiertem Spiritus und

10000 „ Essig. Die Flüssigkeit muß vor

der Anwendung tüchtig durchgeschüttelt werden.

b) 10 Gewichtsteile Lorbeeröl,

20 „ Rappthol,

10 „ Essigäther und

80 „ Insektenpulvertinktur.

c) Rohpetroleum.

d) 15 Gewichtsteile Tieröl,

100 „ Kreolin,

900 „ Rüböl werden zusammen ver-

mischt.

e) Bremsenwasser:

20 Gewichtsteile Pottasche,

200 „ Walnußblätter,

50 „ Stinkasant,

50 „ Gewürznelken werden mit

5000 Gewichtsteilen heißem Wasser übergossen und der durchgeseigte Auszug verwendet.

Alle Einreibungen mit riechenden Substanzen erfüllen selbstredend nur so lange ihre Wirkung, als sie nicht durch die Wärme verflüchtigt, nicht vom Regen abgewaschen werden und so lange die Pferde nicht schwitzen. Der Schweißausbruch hebt die beabsichtigte Wirkung in der kürzesten Zeit auf. Sind die Tiere arg von Fliegen oder von Bremsen zerstoßen, so müssen die Hauptstellen gut abgewaschen werden, besonders dann, wenn sie sich an den Weichteilen befinden. Ist Gelegenheit, die Pferde abends in die

Schwemme zu reiten, so darf dieses nicht unterlassen werden, sonst ist Sonntags früh eine gründliche Abwaschung, auch von Schweif und Mähnen vorzunehmen.

### Mittel gegen Stechmücken (Schnaken, Moskitos).

Bei der wichtigen Rolle, welche die Schnaken (Mücken, Gelsen) bei der Verbreitung von Infektionskrankheiten, insbesondere der Malaria, des Typhus, der Ruhr, der Cholera, spielen, wurde es Aufgabe der Wissenschaft, Methoden zur Vernichtung dieser Tiere aufzufinden, was sich wieder nur durch genaues Studium der Lebensgewohnheiten derselben ermöglichen ließ. Da sich die Mückenlarven hauptsächlich in stehenden Gewässern entwickeln, so war mit der Bekämpfung hier einzusetzen.

M. Otto und H. O. Neumann haben nach der »Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten« sehr eingehende Versuche über das Stechen der Mücken veröffentlicht; sie haben im ganzen ungefähr 30 verschiedene Mittel, vorwiegend ätherische Öle, welche infolge ihres starken Geruches vorzugsweise zur Abhaltung der Mücken dienen, auf ihre Wirksamkeit hin geprüft. Das Resultat dieser Untersuchungen ist, daß von den vielen angepriesenen Mitteln überhaupt nur Nelkenöl, Euminöl, Kassiaöl und spanisches Hopfenöl in konzentriertem Zustande oder in Verdünnung mit Olivenöl (1:10) die Mücken für kurze Zeit abhalten. Die Referenten sind der Ansicht, daß der durch das ätherische Öl auf das Trachom ausgeübte Reiz, nicht aber, wie man glauben könnte, der intensive Geruch, die Insekten vom Stechen fernhält. Verschwindet der Reiz, so findet auch trotz des häufig sehr durchdringenden Geruches der einzelnen Substanzen Mückenbelästigung statt.

Man kann aus dieser Arbeit folgern, daß für praktische Zwecke in erster Linie das Nelkenöl hierzu geeignet ist. Ob es sich aber für jeden mit Vorteil verwenden läßt, muß dahingestellt bleiben. Abgesehen von dem starken, auch nicht gerade angenehmen Geruch kommt hinzu, daß Eugenol mehr oder

weniger stark auf der Haut brennt und daß es bei Menschen mit empfindlicher Haut leicht bei längerem Gebrauche Hautausschläge usw. erzeugen kann. Jedenfalls dürfte das Rattenöl in den meisten Fällen auf kürzere Zeit gute Dienste leisten.

Dr. Menze entdeckte durch einen Zufall, daß durch eine Lösung von schwefelsaurem Chinin in Glycerin blut-saugende Insekten (Sandflöhe, Moskitos) von menschlichen Körpern ferngehalten werden; die Ursache hierfür dürfte (>Seifensieder-Zeitung< 1909) auf den intensiv bitteren Geschmack dieses Spezifikums gegen Fieber zurückzuführen sein. Menze empfiehlt für die Tiere das Chinin in Form einer Glycerinsalbe oder in einem fetten Öle gelöst anzuwenden. Für den Europäer dürfte es angemessen sein, als Salbengrundlagen Vaselin, Lanolin u. zu verwenden. Terpentinöl, Jodoform, Menthol und Kampfer in Salbenform dürften ebenfalls geeignete Schutzmittel sein.

Stark riechende Substanzen werden von den Gelsen, Mücken oder Schnaken gemieden und sind geeignet, solche einige Zeit fern zu halten. Zu diesen riechenden Substanzen zählen Kampfer, Lorbeeröl, Flohkräutöl, Pfefferminzöl, Zitronensaft, Essig, Teeröl, Eukalyptusöl, Karbolvaseline, Lavendelöl, Knoblauchöl und Kreosot. Werden diese Mittel auf der Hautoberfläche verrieben oder träufelt man etwas davon auf die Kopfskissen, so ist man wenigstens einigermaßen von diesen tückischen Insekten geschützt. In recht zweckmäßiger Weise schützt man sich vor den Mücken nach Howard durch Verbrennen von Insektenpulver, das man auf einer heißen Platte aufstreut; auch kann man durch Anfeuchten des Pulvers mit Wasser, Zusammenkneten, Formen und Backen kleine Zeltchen herstellen, die man anzündet. Durch den Rauch, der den Menschen nicht schadet, werden die Insekten betäubt.

In verschiedenen Gegenden Südamerikas sollen sich Anpflanzungen von *Ricinus communis* um die Wohnstätten herum als Mittel gegen die Moskitos bewährt haben. Bergena hat als Schutzmittel das bekannte Rattenöl, das bei uns gegen Schnaken vielfach in Gebrauch ist, in Form

einer Seife angewendet; dieselbe wird aus Toilettseife, welche mit einer Emulsion von Melkenöl, Glycerin und neutralem Fett gemischt wird, hergestellt, soll sich aber trotz des intensiven Geruches wenig bewährt haben. Auch Melkenöl, Glycerin, Kampfer, Terpentinöl und Naphthalinpräparate schützen nicht. Besser wirkt Petroleum, das aber leider wegen seiner sonstigen Eigenschaften nicht gebraucht werden konnte. Ein Einreiben der Hände, des Nackens und der Fersen mit einer 5%igen Kreolinlösung, an deren Stelle wohl auch Kreolseifenlösung genommen werden kann, bewährt sich gut.

Professor Boges fand, daß Naphthalan sehr gut die Wirkung der Stiche der Moskitos paralyisiert. Das Naphthalan muß aber sehr intensiv in die Haut eingerieben werden, wenn es eine gute Wirkung erzielen soll.

Ein vorzügliches Mittel wurde in dem Gallol, einem organischen Körper, gefunden, von dem bei den Versuchen, die in der Nähe Breslaus gemacht wurden, etwa 3 g auf den Kubikmeter Wasser gegeben wurden. Das Gallol tötete die Mückenlarven mit Sicherheit innerhalb einer halben Stunde, ohne den Fischen, Fröschen usw. zu schaden. Durch systematisches Vorgehen konnten die zu Versuchszwecken dienenden Tümpel und Gewässer vollkommen larvenfrei gemacht werden. Ebenso gelang es, die in Kellerräumen überwinterten eiertragenden Mückenweibchen mit Hilfe von Räuchermitteln schnell abzutöten. Durch Belegen des Fußbodens der Keller mit Papierbogen ließ sich eine Zählung der getöteten Weibchen bewerkstelligen. Es wurden deren in einem einzigen Keller oft mehrere Tausende vernichtet. Schwieriger gestaltete sich das Vorgehen gegen die Puppen, gegen die ein sicher wirkendes Mittel noch nicht besteht. Die bis jetzt erzielten Ergebnisse zur Bekämpfung der Mückenplage sind nach dem Berichte des Geheimrates Flügge so ermunternd gewesen, daß jetzt mit Unterstützung der städtischen Behörden von Breslau zum ersten Male in dieser Stadt gegen die Mücken in großem Maßstabe vorgegangen werden soll.

Die in den Kellern usw. überwinterten Schnaken, die meistens an der Decke sitzen, sollen mit brennenden

Kerzen usw. einfach abgebrannt werden. Sind sie aber nicht oder schwer zu erreichen, so sind in den Räumen, nachdem man die Fenster und Türen mit Papier verklebt hat, auf je 50 m<sup>3</sup> Luftraum drei Eßlöffel voll von folgender Pulvermasse zu verbrennen:

- |     |               |                                      |
|-----|---------------|--------------------------------------|
| 400 | Gewichtsteile | Kassikumpulver,                      |
| 200 | »             | Dalmatiner Insektenpulver,           |
| 200 | »             | Baldrianwurzelpulver und             |
| 200 | »             | Salpeter. Nach zwei bis drei Stunden |

sollen alle Schnaken durch den Rauch getötet sein. Die weitere Bekämpfung richtet sich gegen die Schnakenlarven und -puppen, die in Wassertümpeln leben. Hierzu soll ein Pulver »Larvizid«, dessen Zusammensetzung jedoch nicht angegeben ist, dienen; es soll für Fische und Frösche unschädlich sein, im Gegensatz zu Saprol, das zu demselben Zweck angewendet wird. Mit Tragantischleim verbunden, werden sich aus der vorgenannten Pulvermischung auch geeignete Räucherkerzen (Schnakenkerzen) herstellen lassen.

### Mückentinkturen.

1. 40 Gewichtsteile Eukalyptusöl,  
60 » Kölnnerwasser,  
100 » Pyrethrumpulver werden zusammen gemischt.

2. 20 Gewichtsteile Nelkenöl,  
20 » Eukalyptusöl,  
20 » Birnenäther,  
40 » alkoholische Ammoniakflüssigkeit.

3. Ichthol-Ammonium soll wegen seines anhaltenden, aber nicht unangenehmen Geruches empfehlenswert sein. Man löst:

- |      |                |                                |
|------|----------------|--------------------------------|
| 30   | Gewichtsteile  | Ichthol-Ammonium in            |
| 150  | Gewichtsteilen | Wasser und setzt nach und nach |
| 1000 | Gewichtsteile  | Insektenpulvertinktur hinzu.   |

4. 40 Gewichtsteile Kampferspiritus,  
 30 » Seifenspiritus,  
 20 » Eukalyptusöl,  
 10 » Salmiakgeist werden zusammen-  
 gemischt.

### 5. Mosquitolin.

Mittel gegen Mücken wird erhalten durch Zusammen-  
 mischen von

10 Gewichtsteilen Zimtöl,  
 40 » Sandelholzöl,  
 10 » Patschouliöl und  
 4000 » Spiritus.

6. Gegen frische Insektenstiche ist Salmiakgeist ein  
 vorzügliches Mittel. Töllner gibt eine Mischung von

25 Gewichtsteilen alkoholischem Salmiakgeist,  
 20 » Kölnerwasser und  
 5 » Eukalyptol an. Auch Seife und

Zigarrenasche leisten gute Dienste.

Gegen die Stiche von Moskitos wurde wässriges  
 Ammoniak und Menthol (nach »Seifensieder-Zeitung«)  
 empfohlen. Zur örtlichen Anwendung wird von Rea-  
 l nachstehende Mischung genannt: 30 Gran Ipekahuanha, 4 Drachmen  
 Alkohol, 4 Drachmen Äther. Dettinger behauptet, daß  
 Ammoniak von geringem Nutzen sei und empfiehlt Ichthyol,  
 das ohne Beimischung in dieser Lage aufzutragen ist.  
 Verriß empfiehlt die Bisse und Stiche mit einer gesättigten  
 Lösung von Kampfer oder Salol in Äther zu bestreichen.  
 Broch und Jaquet geben folgende Mittel an:

a) Ol. cham. camphorat, 20 Gewichtsteile Styrax  
 liqu., 3 Gewichtsteile Ol. menth. pip.

b) 5 Gewichtsteile Balsam peruv., 25 Gewichtsteile  
 Ung. Styracis, 20 Gewichtsteile Ol. oliv.

c) 20 bis 40 Gewichtsteile Naphthol werden in der  
 nötigen Menge Äther gelöst, mit 1 bis 4 Gewichtsteilen  
 Menthol und 400 Gewichtsteilen Vaselin gemischt.



## 7. Einerseits werden gelöst in

5000 Gewichtsteilen Spiritus:

- |     |                |                                   |
|-----|----------------|-----------------------------------|
| 150 | Gewichtsteile  | Lorbeeröl,                        |
| 10  | "              | Melissenöl,                       |
| 30  | "              | Palmarosaöl,                      |
| 50  | "              | süßes Orangenöl und               |
| 50  | "              | Terpineol. Anderseits löst man in |
| 500 | Gewichtsteilen | Wasser                            |
| 150 | Gewichtsteile  | Glyzerin,                         |
| 25  | "              | Borsäure und vereinigt beide      |

Lösungen. Dieses Mittel kann als Vorbeugungsmittel dienen, wie auch zu dem Zwecke, um die Folgen eines Mückenstiches aufzuheben.

## 8. Von R. Soly:

15 Gewichtsteile 40%iges Formol,

0.5 " Essigsäure,

5 " Äthylol,

1 Gewichtsteil Kanadabalsam,

0.25 Gewichtsteile Sternanisöl werden zusammen vereinigt, gut geschüttelt und die Stichstellen mit der Flüssigkeit betupft.

9. Es ist bekannt, daß die grünen Schalen der Walnüsse einen starken Geruch verbreiten, der von dem bitter schmeckenden, nach längerem Stehen braun werdenden Saft herrührt. Dieser Geschmack und Geruch ist den Fliegen und Mücken unangenehm. Man sammelt deshalb die grünen Schalen im Herbst, trocknet sie und überbrüht sie im Frühjahr, wenn die Fliegen- und Mückenplage wieder beginnt, mit heißem Wasser. Einige Tropfen Nelken- oder Lorbeeröl erhöhen die Wirkung. Vor dem Gebrauche verdünnt man die Mischung (eine handvoll Nußschalen auf 1 l Wasser) nach Bedarf und reibt damit die empfindlichen und die den Stichen am meisten ausgesetzten Stellen damit ein. Man sei aber beim Einreiben vorsichtig, damit nichts von der Flüssigkeit in die Augen der Tiere kommt.

## 10. Mückentinktur.

1 Gewichtsteil Nelkenöl,  
 8 Gewichtsteile kölnischer Wasser (Eau de cologne),  
 32 „ Alkohol werden durch Schütteln innig  
 vermischt. Man reibt mit dieser Tinktur die unbedeckten  
 Stellen der Haut ein und ist gegen Mücken und Fliegen  
 vollkommen geschützt.

## Mückenstifte.

Man stellt gut wirkende Mückenstifte her, indem man  
 Zerebin und Paraffinöl in gleichen Mengen zusammenschmilzt  
 und vor dem Festwerden in dieselben 5 bis 10% iges Euka-  
 lyptusöl oder Anisöl einrührt; die Masse wird dann in  
 zylindrische Formen gegossen, mit denen man, ähnlich den  
 Migränestiften, die freien Hautstellen einreibt.

## Schnaken-Räucherpastillen.

Man vermischt innig:

10 Gewichtsteile gemahlene Holzkohle,  
 3 „ Pyrethrumpulver,  
 2 „ Kalijalpeter,  
 2 „ Benzoe,  
 2 „ Tolu balsam, knetet die Mischung mit  
 so viel Tragant schleim zusammen, daß man daraus Pastillen  
 formen kann und trocknet dieselben an der Luft.

## Räucherkerzen,

ähnlich den Zamperonischen und von diesen nicht zu  
 unterscheiden; M. Zanzen in Florenz gibt für dieselben  
 folgende Bereitungsart an: 240 g Insektenpulver, bester  
 Qualität, nicht zu fein gemahlen, werden mit 25 g salpeter-  
 saurem Kali in 300 cm<sup>3</sup> Wasser gelöst, gemengt, bei gelinder  
 Wärme getrocknet und dann pulverisiert. Dieses Pulver wird  
 mit einem feinen Tragant schleim zu einer Masse verarbeitet,

aus der dann Kerzen geformt werden, die bei gelinder Wärme zu trocknen sind. Sollen dieselben den Zamperonischen Kerzen, genannt *Fidibus insetifughi*, auch äußerlich ganz ähnlich aussehen, so muß die Masse in ein flaches Stück ausgerollt werden von 1 cm Höhe und 2.5 cm Breite, aus welchem man dreieckige, oben abgestumpfte Stücke schneidet, die 2.5 g wiegen und einen Stern und ein Z eingedrückt haben. Die gute Wirkung der Kerzchen hängt nur von der guten Qualität des Insektenpulvers ab.

### Pulver gegen Moskitos.

Man vermischt:

5 Gewichtsteile Eukalyptusöl mit

10 Gewichtsteilen feinst gemahlenem Talkum und

85 „ „ Stärkezucker innig und mischt mit

dem Pulver Kopf und Hände öfters im Tage trocken ab.

### Verschiedene Cremes zum Einreiben.

Man verwendet, um in wasserreichen Gegenden den Schnakenstichen nicht zu sehr ausgesetzt zu sein, Einreibungen von Salben mit stark riechenden Substanzen vermischt; alle scharf oder intensiv riechenden Öle werden von den Insekten gehaßt und gemieden und sind Einreibungen der Haut mit solchen Präparaten stets von Erfolg begleitet. Allerdings darf nicht übersehen werden, daß fettige Salben nicht jedermanns Sache sind, daß man damit leicht die Kleider beschmutzt und daß das Mittel nur so lange wirksam ist, als das ätherische Öl sich nicht verflüchtigt hat. Als Riechstoffe dienen Eukalyptusöl, das hervorragendste Mittel gegen Schnaken, Eukalyptol, Angelikaöl, Rajeputöl, Lorbeeröl, Wermutöl, Nelkenöl, Tanacetöl (Meinfernöl), ferner Abkochungen von Enzian, Speik, Weidenrinde, Quassiaholz usw. Gefordert wird von den Salben, daß sie sich gut und leicht in die Haut einreiben lassen, nicht nur oberflächlich liegen bleiben und derart Schmierer bilden. Vaselin ist eine gute

Salbengrundlage, da sie sich leicht in die Haut einreiben läßt, bei Versand in Tropengegenden muß aber das gewöhnliche Vaselin durch Beifügung einiger Prozente Zerefin fester gemacht werden. Cremes, welche mit wässerigen Abkochungen stark riechender Substanzen hergestellt werden, dürfen als Grundlage Vaselin nicht enthalten, da solche mit Wasser nicht mischbar sind, sondern es muß für dieselbe Wollfett in Anwendung kommen.

a) Vaselin-Creme.

2500 g weißes Vaselin,  
 $1\frac{1}{2}$  g Eugenol,  
 25 g Eukalyptusöl,  
 5 g Kajeputöl.

b) Wollfett-Creme.

1000 g Wollfett (Adeps lanae),  
 600 g Abkochung von  
 1000 g Quassiaholz,  
 500 g Quassiarinde,  
 500 g Chinarinde,  
 250 g Weidenrinde,  
 250 g Enzianwurzel,  
 6000 g Wasser,

1000 g Spiritus; diese wird hergestellt, indem man die vorstehend genannten Materialien in einem mit Dampf geheizten Stessel mit dem kochenden Wasser übergießt, drei Stunden stehen läßt, dann durchsiebt und endlich den Spiritus zusetzt.

Zu der innig zu einer Salbe vermischten Masse werden dann noch hinzugesetzt:

250 g Vaselinöl, weiß,  
 10 g Eukalyptusöl,  
 $2\frac{1}{2}$  g Melkenöl.

Falls das hergestellte Produkt noch zu konsistent ist, um sich in die Haut einreiben zu lassen, setzt man noch

etwas Baselinöl hinzu; es kann aber auch das Baselinöl ganz weggelassen und die Menge der wässerigen Abkochung bis auf 1000 g erhöht werden, da das Wollfett ziemlich Mengen wässeriger Flüssigkeiten zu binden vermag. Es ist darauf zu sehen, daß die Creme nicht auf der Haut liegen bleibt, sondern sich schnell und leicht in dieselbe einreiben läßt, ohne daß sie schmirt.

### Insektenseife.

Seifen mit oder ohne Zusatz von Salmiakgeist, der ein treffliches Schutzmittel gegen Insektenstiche ist, werden ebenfalls verwendet, doch wirkt der Alkaligehalt jeder Seife, wenn sie nicht neutral ist, also freies Alkali enthält, auf die Haut mehr oder weniger schädlich ein, da sie ja auf derselben eintrocknet. Eine derartige Seife wird hergestellt aus:

250 g Kokosöl,  
125 g 37° Bé Natronlauge,  
30 g Wollfett,  
55 g Kreolin.

### Mittel gegen Bienenstiche.

300 g Menthol,  
400 g absoluter Alkohol und  
1000 g Glycerin werden durch Schütteln in einer Flasche innig miteinander vermischt. Mit dieser Flüssigkeit werden Gesicht und Hände eingerieben und die Bienen bleiben ferne; sollten Stiche dennoch vorkommen, so bleibt die Geschwulst sehr gering.

Gegen die Stiche von Bienen bildet Lauch ein vorzügliches Mittel, welches augenblicklich den Schmerz stillt und die Entstehung von Geschwulst verhindert. Man braucht nur das zwischen den Fingern zerdrückte Lauchblatt auf der Stichwunde zu zerreiben. Die Stiche von Skorpionen und Tausendfüßler sind überaus schmerzhaft. Winge empfiehlt.

dagegen eine Mischung aus gleichen Teilen Chloralhydrat und Kampher, die eine vorzügliche Wirkung besitzen soll. Auch Chloralhydrat oder Kokain allein werden als wirksame Mittel empfohlen. Benjamin fand im Spiritus Ammoniac aromaticus ein wertvolles Mittel, das in halbstündigen Dosen von 30 Minims in sehr heißem Wasser gebraucht wird. Gegen Spinnenbisse benützt man Sublimatlösungen (1:500 bis 1:1000), mit denen die Bisswunde stets befeuchtet wird. Varing empfiehlt ein Liniment aus wässerigem Ammoniak, Olivenöl und Sandanum zur Einreibung und einige Tropfen wässerigen Ammoniaks zur internen Verabreichung. Dies genügt in den meisten Fällen zur Behandlung der Bisse von Skorpionen, Taranteln und anderen Spinnen, Tausendfüßlern, Moskitos und anderen giftigen Insekten. In schweren Fällen kann die örtliche Einspritzung einer 5%igen Chamäleonlösung von Nutzen sein, wenn gleichzeitig der Patient mit Strychnin und eventuellen Stimulantien behandelt wird. Starker Kaffee ist in allen tropischen Ländern als Stimulans sehr beliebt. Subkutane Strychnininjektionen sind auch bei den Tarantelbissen sehr wirksam.

### Insektenabhaltungsmittel für Menschen.

Die Mittel, welche man anwenden kann, um Insekten verschiedener Art vom Menschen abzuhalten, müssen je nach der Art des Ungeziefers, dessen Belästigungen man ausgesetzt sein kann, gewählt werden. Um sich von den gewöhnlichen Blutsaugern, Flöhen und Wanzen zu schützen, genügt Einstreuen von Pyrethrumpulver auf die Lagerstätte oder in die Kleider, während Läuse durch Einfetten des Körpers am besten abgehalten werden. Bei allem anderen Ungeziefer, welches in Frage kommt, wählt man zumeist stark riechende Substanzen, doch darf der Geruch kein allzu unangenehmer sein und derselbe muß sich auch durch Waschen mit Wasser und Seife leicht beseitigen lassen. Nachstehend eine Anzahl von Vorschriften für die Herstellung von Präparaten, die

man ganz unrichtig als Insektenschutzmittel bezeichnet; nicht die Insekten sollen geschützt werden, sondern jene Lebewesen, welche den Angriffen der ersteren ausgesetzt sind.

1. 100 Gewichtsteile Baldriantinktur,  
2       »       Rajeputöl,  
1 Gewichtsteil Nelkenöl.
2. 20 Gewichtsteile Salizylsäure,  
20       »       Borax,  
60       »       geschnittenes Quassiaholz und  
1100       »       Wasser, werden zehn Minuten

gekocht und die Flüssigkeit dann durchgeseiht.

3. Man schmilzt kaltgerührte Kokosseife und setzt ungefähr 5% Chinol bei.

4. 50 Gewichtsteile Tonkabohnentinktur, 1 : 100,  
50       »       Lorbeeröl,  
4       »       Thymianöl.
5. 85 Gewichtsteile weißes Wachs,  
60       »       Walrat und  
500       »       Olivenöl werden geschmolzen und  
150       »       heißes destilliertes Wasser damit

verrührt. Dann setzt man

- 2 Gewichtsteile Nelkenöl,  
3       »       Thymianöl und  
4·5       »       Eukalyptusöl hinzu.
6. 100 Gewichtsteile Lorbeeröl,  
12       »       Essigäther,  
4       »       Nelkenöl,  
8       »       Eukalyptusöl.
7. 60 Gewichtsteile gelbes Wachs,  
140       »       Lorbeeröl,  
20       »       Kampfer,  
6       »       sulfoichthylsaurer Ammonium.
8. 250 Gewichtsteile weißes Vaselin,  
25       »       Naphthol,  
10       »       Rosmarinöl.

9. 120 Gewichtsteile weißes Baiselin,  
     4       »       Patjchuliöl,  
     3       »       Baldrianöl.
10. 75 Gewichtsteile gelbes Wachs werden geschmolzen  
 und kurz vor dem Erkalten mit  
     160 Gewichtsteilen Lorbeeröl,  
     8       »       Thymianöl und  
     8       »       Eufalyptusöl verrührt.
11. In 130 Gewichtsteilen Spiritus löst man  
     10 Gewichtsteile Thymol,  
     5       »       Eufalyptusöl und  
     3       »       Majoranöl.
12. 350 Gewichtsteile Hammeltalg werden geschmolzen  
 und, nachdem er etwas abgekühlt ist,  
     15 Gewichtsteile Eufalyptusöl,  
     2       »       Nelfenöl und  
     3       »       Rajeputöl eingerührt.
13. 20 Gewichtsteile Nelfen,  
     12       »       Patjchulifraut,  
     10       »       Rosmarinblätter,  
     8       »       Baldrianblätter oder -wurzeln,  
     8       »       spanischer Hopfen werden mit  
 70%igem Spiritus ausgezogen, abgepreßt und filtriert.  
 Man setzt von dieser Flüssigkeit dem Waschwasser etwa  
 $\frac{1}{10}$  bis  $\frac{1}{5}$  hinzu.

### Flohwasser nach Töllner.

- 100 Gewichtsteile zerschnittene Tabakblätter und  
 150       »       zerschnittener spanischer Pfeffer  
 werden mit  
 2500 Gewichtsteilen Wasser 20 Minuten gekocht, aus-  
     gepreßt und mit  
 250       »       Sabadilleßig vermischt. Mit dieser  
 Flüssigkeit werden die Fußböden täglich einmal gewaschen  
 und ist darauf zu achten, daß sie auch gut in alle Fugen  
 und Ecken eindringt.



**Insektenschutz= (=abhaltungs=) Mittel für Tiere.**

In »Seifenieder=Zeitung«, 1909, werden eine Anzahl von Schutzmitteln gegen die Belästigung der Haus- und Nutztiere namhaft gemacht, die zumeist als Einreibemittel sich gut bewährt haben; sie alle werden dadurch wirksam, daß sie stark riechende Substanzen enthalten, welche sich auf der Haut oder in den Haaren der Tiere längere Zeit erhalten und nicht zu rasch verflüchtigen. Die Wirksamkeit solcher Mittel ist naturgemäß auch durch die Temperatur, Regen, Schwitzen der Tiere, großen Unterschieden unterworfen.

1. 500 Gewichtsteile Insektenpulver werden mit einer Mischung von  
 1000 Gewichtsteilen Spiritus und  
 1000 » Wasser ausgezogen, filtriert und dem Filtrat  
 20 » Nelkenöl hinzugelegt.
2. 150 Gewichtsteile Fischtran,  
 200 » Tieröl,  
 100 » Naphthalin werden durch gelindes Erwärmen vereinigt.
3. 100 Gewichtsteile Lorbeeröl,  
 50 » Benzol,  
 10 » Nelkenöl,  
 29 » Rosmarinöl.
4. Insektenöl nach Töllner.  
 75 Gewichtsteile Lorbeeröl,  
 75 » Eufalyptusöl,  
 200 » Petroleum,  
 650 » Baeilinöl werden gemischt und mit Chlorophyll schwach grün gefärbt.
5. 500 Gewichtsteile Lorbeeröl,  
 100 » Naphthalin,  
 60 » Kampfer,  
 25 » Tieröl.

- |     |      |               |                                  |
|-----|------|---------------|----------------------------------|
| 6.  | 300  | Gewichtsteile | mit Schwefel gekochtes Leinöl,   |
|     | 50   | "             | Tieröl.                          |
| 7.  | 400  | Gewichtsteile | Lorbeeröl,                       |
|     | 100  | "             | Naphthalin,                      |
|     | 10   | "             | rohe Karbolsäure.                |
| 8.  | 450  | Gewichtsteile | Schweinefett,                    |
|     | 300  | "             | Zeresein,                        |
|     | 800  | "             | Lorbeeröl,                       |
|     | 80   | "             | Kampfer,                         |
|     | 80   | "             | Naphthalin,                      |
|     | 25   | "             | Rosmarinöl.                      |
| 9.  | 600  | Gewichtsteile | Schweinefett,                    |
|     | 600  | "             | Zeresein,                        |
|     | 300  | "             | Talg,                            |
|     | 2000 | "             | Lorbeeröl,                       |
|     | 200  | "             | Naphthalin,                      |
|     | 100  | "             | Rosmarinöl,                      |
|     | 120  | "             | Stinkajant.                      |
| 10. | 170  | Gewichtsteile | Stinkajant-Tinktur,              |
|     | 10   | "             | rohe Karbolsäure,                |
|     | 50   | "             | Eßigäther.                       |
| 11. | 2    | Gewichtsteile | Talg,                            |
|     | 0·5  | "             | Knoblauchsaft zusammenschmel-    |
|     |      |               | zen, nach dem Abkühlen rührt man |
|     | 6    | "             | Karbolineum und                  |
|     | 2    | "             | Kienöl hinzu.                    |

### Seife gegen Ungeziefer der Hunde.

Dieselbe besteht aus:

- |    |                |                                   |
|----|----------------|-----------------------------------|
| 5  | Gewichtsteilen | Petroleum,                        |
| 4  | "              | Wachs,                            |
| 5  | "              | Alkohol, die gut untereinanderge- |
|    |                | arbeitet und schließlich mit      |
| 12 | "              | Seife auf warmem Wege vermischt   |
- werden.

## Ungeziefer-Pomade.

45	Gewichtsteile	Salizylsäure,
15	»	Borsäure,
360	»	Vaselin,
30	»	Perubalsam,
10	»	Bergamottöl,
2	»	Anisöl.

## Tabanal, neues Schutzmittel für Tiere gegen Insekten.

Unter dem gesetzlich geschützten Namen Tabanal kommt ein vom Pfarrer Neumann in Elbsroth erfundenes Mittel in den Handel, das sich als wirksamer Schutz der Tiere gegen Insekten aller Art bewährt hat. Das Tabanal gelangt in Blechdosen zum Verkauf, ist eine butterartige Masse von bräunlicher Färbung mit intensivem, jedoch nicht unangenehmen Geruch. Es enthält weder Fett noch Schmier- oder Klebemittel und erinnert in seiner Beschaffenheit an gewisse vegetabilische Extrakte, teils aber auch an die Basogene. Bei der außerordentlichen Resorption des Präparates durch die Haut ist der gänzliche Fortfall jeder schädigenden chemischen Einwirkung auf dieselbe sehr wichtig. Versuche des deutschen Tierschutzvereines in Berlin und des bakteriologischen Institutes der Landwirtschaftskammer in Halle haben das Fehlen jeder Reizwirkung des Präparates auf die Haut der Tiere ergeben. Eine rationelle Hautpflege derselben wird demnach nicht behindert. Pferde können z. B. nach wie vor gründlich gepuht werden. Lästige und schädliche Insekten, namentlich Bremsen und Tasselsliegen sollen durch die Tabanalbehandlung unbedingt fern gehalten werden. Das Präparat ist unbegrenzt haltbar. Um die Wirkung desselben zu erhöhen, müssen Pferde und Rüche sorgfältig gepuht werden. Da Milch bekanntlich leicht Gerüche absorbiert, so ist es ratsam, das Melken der Rüche, die mit Tabanal behandelt werden, im Freien vorzunehmen. Eine Geschmack- oder Geruchsbeeinflussung ist dann ausgeschlossen.

## Mittel gegen Kopfsungeziefer.

Zur Vertilgung der auf dem behaarten Teil des Kopfes bei vielen an Grind leidenden Kindern sich rasch entwickelnden Läuse wendet man neben dem Waschen und Reinhalten des Kopfes graue Quecksilbersalbe, Fenchelöl, schwarzen Pfeffer, Stefanskörner, Petersilien- und Läusejamen und ähnliches an.

Besondere Zusammensetzungen solcher Mittel sind:

1. 5 g Fenchelöl,  
40 g Rosensalbe, durch Zusammenreiben vermischt.
2. 15 g weißes Quecksilberpräzipitat,  
30 g Stärkemehl.

In die behaarten Teile des Kopfes einzustreuen, nachdem diese vorher mit Fett bestrichen worden sind, aber wie alle Quecksilberpräparate mit Vorsicht anzuwenden.

3. 4 g gepulverter Petersilienjamen,  
91 g Pomadenfett.
4. 2 g gepulverten Läusejamen zusammen mit  
45 g Schweinefett, erhitzt, dann ausgepreßt und mit etwas Bergamottöl parfümiert.

## 5. Kapuzinerpulver.

Dieses Mittel besteht aus: gepulvertem, mexikanischem Läusejamen (*Semen Sabadillae*), gepulvertem Läusejamen (*Semen Staphidis agriae*), gepulvertem Petersilienjamen und gepulverten Tabakblättern zu gleichen Teilen.

## 6. Salbe französischer Hospitäler.

6 g rotes Schwefelquecksilber,  
2 g gereinigtes Ammoniak,  
30 g Schweinefett,  
2 g Rosenwasser, durch Verreiben zu einer gleichmäßigen Salbe gemischt.

## Insektenspeckseife gegen Läuse.

18 Gewichtsteile Schweinspeck werden mit  
150 Gewichtsteilen Wasser, in denen

18 Gewichtsteile Pottasche gelöst wurden, auf das innigste verkocht und in die Masse

7.5 Gewichtsteile gut gelöschten Kalk mit

150 Gewichtsteile in Wasser verrührt, zum Sieden erhitzt, eingebracht. Die Masse wird gut verrührt. Zur Verwendung wird dieselbe mit der zweifachen Menge heißen Wassers verdünnt aufgebürstet.

### Tranjeise gegen Läuse.

150 Gewichtsteile Wasser werden zum Kochen erhitzt,

9 „ „ Alkalilauge in dasselbe eingerührt und sodann

28 „ „ Tran (am besten Walsfischtran) nach und nach hinzugefügt und bis zur Bildung einer innigen Emulsion gekocht, wobei das verdampfende Wasser zu ersetzen ist. Zur Verbesserung der Wirkung fügt man noch etwa 5 bis 6% Tabakertract hinzu.

### Mittel gegen Läuse bei Tieren.

Gutes Insektenpulver leistet bei Hunden und kleineren Haustieren gute Dienste, wenn das Verfahren des Einstäubens mehrere Male wiederholt wird. Bei größeren Haustieren empfiehlt sich nach Becker das Einreiben (in Zwischenräumen von vier Tagen) des wie folgt zusammengesetzten Pulvers:

Semen Sabadill., Sem. Staph. agr., Radix Hellebor. alb. pulv. aa 1.0, Sem. Anisi pulv. 2. Von eben derselben Seite wird vor dem Gebrauch der Quecksilberpräparate und des Karbols, besonders bei Rindern und Milchvieh, ganz entschieden gewarnt, da bei der Verwendung von Karbolwasser die Milch sehr leicht den Karbolgeruch annimmt. Aus demselben Grunde soll auch Kreolin bei diesen Tieren nicht benützt werden, obgleich der Gebrauch desselben in anderen Fällen zweckmäßig ist. Zum Abwaschen der Tiere dient auch eine Abkochung von Rauchtobak (Tabaksast), wie

auch eine Lösung von Schwefelseife nach folgender Vorschrift: Zerriebenes Schwefelkalium (5 Teile) wird in 95 Teilen Schmierseife gelöst. Daß auch eine gründliche Stallreinigung vorgenommen werden muß, ist selbstverständlich. Hierzu wird man sich am besten der alkalischen Seifenlösung bedienen. Bei Schafen ist die Verwendung der Quecksilberjale sehr in Gebrauch, die meistens als 10%ige Salbe verwendet wird. Statt dieser kann aber auch eine 10 bis 15%ige Naphthalinjalbe, mit Seife und Fett hergestellt, mit demselben Erfolg angewendet werden.

### Mittel gegen Becken der Schafe.

Als Radikalmittel hat sich die graue Quecksilberjale bewährt, mit welcher man nach der Schur einen schmalen Streifen in der oberen und unteren Rückenlinie des Rumpfes (zirka 3 bis 4 g Salbe zu verschmieren) zieht. Ebenso wirksam ist das Baden sämtlicher Schafe unmittelbar nach der Schur in einem Bade von Rußblätter- oder Tabaksblätterabkochung. Zum gleichen Zwecke werden auch Karbol- und Kreolinbäder angewendet. Selbstverständlich sind die Ställe der Tiere, die Krippen und Türen sorgfältig zu reinigen.

### Mittel gegen die Räude der Schafe.

Die Räude wird durch Krätzmilben verursacht und läßt sich, wenn noch im Entstehen, durch besondere Behandlung heilen, die darin besteht, daß die Krusten und Borsten auf der erkrankten Haut nach Entfernung der Haare durch Schmierseife aufgeweicht werden und hierauf die Milben durch Perubalsam, Benzin oder Kreosot, mit Öl gemischt, Teer mit Schmierseife und Spiritus gemischt, durch Tabakabkochung, Kreolinwasser oder Kreolinliniment getötet werden. Es sind als Gegenmittel Bäder im Gebrauch, so das Verlackische Räudebad, Zündelische Räudebad, Walzische Lauge, Arsenik-, Sublimat- und Kreolinbäder. Die Bäder müssen nach Verlauf von acht Tagen wiederholt werden.

und in der Zwischenzeit auftretende Schmierstellen sind mit bereitgehaltener Flüssigkeit einzureiben; eine gründliche Stall-  
desinfektion muß damit Hand in Hand gehen.

Die Walzische Lauge ist eine Mischung von

2 Gewichtsteilen ungelöschtem Kalk und

10 „ Wasser, wozu noch

6 Gewichtsteile stinkendes Hirschhornöl und

3 „ Schiffssteer hinzugemischt werden.

Zu dieser Masse werden 100 Gewichtsteile durch Gewebe  
gefeimte Mistjauche gesetzt und das Ganze schließlich mit  
400 Gewichtsteilen Wasser verdünnt.

Ein Arsenikbad wird aus

25 Gewichtsteilen weißem Arsenik,

25 bis 30 „ Alaun und

500 „ Wasser hergestellt; da das

Bad giftig ist, muß insbesondere darauf geachtet werden,  
daß das Maul des Tieres nicht damit in Berührung kommt.

Flüssigkeit gegen die Zwergzikade (nach Steglich).

10 Gewichtsteile Schmierseife werden zunächst mit

30 Gewichtsteilen Wasser durch Hinzugeben unter

Umrühren nach und nach vermischt, dann

470 Gewichtsteile Wasser und endlich

500 „ Gaswasser beigemischt und die Flüssig-

keiten tüchtig untereinander gemischt.

Nach Sorauer löst man

3 Gewichtsteile Schmierseife in

100 Gewichtsteilen Wasser und vermischt mit

3 „ gewöhnlichem Ammoniak. Da das

Ammoniak reich verflüchtigt, ist solches erst kurz vor der  
Verwendung zuzusetzen.

Schutz des Hühnerbestandes vor Läusen und Feder-  
lingen.

Die Stallungen müssen mindestens einmal im Monat  
mit frischer Kalbmilch gründlich übertüncht, alle Fugen mit

Kalk oder Zement überstrichen werden. Die Sitzstangen und alle in den Stallungen befindlichen Holzgeräte sind mit heißer Lauge zu waschen und sodann ebenfalls mit Kalkmilch zu überstreichen. Die Legenester müssen ebenfalls gründlich gereinigt werden, das Streumaterial in demselben (Stroh, Heu) muß wöchentlich erneuert werden, außerdem empfiehlt es sich, in dieselben etwas Insektenpulver einzubringen, dem zweckmäßig etwas Tabakstaub beigemischt ist. Die nach dem Zerstäuben zum Vorschein kommenden bestäubten, selten toten Schmarozer sind zu sammeln und zu verbrennen. Dieses Einstauben mit Insektenpulver ist nach je acht Tagen zweimal zu wiederholen, ebenso ist die Stallreinigung mehrmals vorzunehmen. Um die dann von den Schmarozern befreiten Hühner auch fernerhin rein zu erhalten, muß man den Hühnern ein sogenanntes Sandbad an einem sonnigen Orte, durch ein Dach vor Regen geschützt, zur Verfügung stellen, damit sie dort nach Belieben sich pudeln können. Ein solches Sandbad besteht aus Sand, Kalkstaub, Asche, Tabakstaub und etwas Insektenpulver.

Sägespäne sind zum Einstreuen in Geflügelställen nicht geeignet, denn sie leisten durch ihre lockere Zusammenfügung dem Ungeziefer mehr Vorschub als jedes andere Material. Außerdem wirbeln sie, so lange sie trocken sind, durch das Scharren der Hühner eine Menge Staub auf, welcher sich auf die Atmungsorgane der Tiere legt und Katarrhe hervorruft, die oft langwierig und unheilbar sind. Wenn die Sägespäne feucht geworden sind, ist zwar dieser Nachteil beseitigt, aber auch der Hauptzweck des Einstreuens, nämlich die Feuchtigkeit der Exkremente aufzunehmen, ist verfehlt. Da ist Torfmull in jeder Hinsicht besser, wenn aber der Bezug dieses Materials zu teuer erscheint, der möge lieber eine Mischung von Sand und Asche einstreuen. Letztere ist gleichzeitig ein Vorbeugungsmittel gegen Ungeziefer.

Läuse der Hühner, welche von der Unreinlichkeit in Ställen herrühren, können mit Terpentinöl oder Wasser, in



welchem Pfeffer und Wermut gekocht ist und womit man die Hühner bestreicht, vertrieben werden; auch kann man die Hühner mit Urin von Kühen waschen. Legt man Zweige von Erlen in den Hühnerstall, so wird man am folgenden Morgen die Blätter von dem Ungeziefer bedeckt finden. Als gutes Mittel gilt eine Mischung von Pferdehufspänen, also Hornsubstanz mit Schwefel, die auf ein mit glühenden Kohlen gefülltes Gefäß ausgeschüttet wird; selbstverständlich müssen Öffnungen, dann Ritzen und Fugen gut verschmiert oder mit Papier verklebt werden, damit sich die entwickelnden Dämpfe nicht durch diese verziehen können. Nach 24 Stunden wird sich im Stall keine Laus mehr finden; dieser muß selbstverständlich dann gut gelüftet werden, ehe man dem Geflügel den Zutritt wieder gestattet.

## Vertilgung von Ratten und Mäusen.

Unter den Säugetieren sind Ratten und Mäuse ein gefürchtetes Ungeziefer, dem wegen der Schlupfwinkel in Mauerwerk unter Dielen, in Wasser- und Erdlöchern schwer oder gar nicht beizukommen ist; Ratten benagen wohl auch alles, was ihnen unterkommt, freissen sich selbst unter Mauern und Balken durch, um sich Nahrung zu verschaffen, aber sie werden doch nicht so gefährlich, wie die Mäuse auf den Feldern und in den Wäldern; diese letzteren halten sich auch in Wäldern auf, besuchen nachts die Gärten, zernagen die Rinde junger Baumetzlinge oder freissen ihre Blattknospen, graben frisch gesäte Eicheln, Bohnen und Erbsen aus und beißen den Keim ab. In manchen Jahren vermehrt sich die Maus zu ungeheueren Scharen, welche sich über die Felder verbreiten und weit mehr Getreide zerstören, als sie zur Nahrung brauchen. Dann sind vorzüglich Eulen mit ihrer Vertilgung beschäftigt. Es sind also die Schäden, die Ratten und Mäuse anrichten, ziemlich bedeutend und man stellt beiden

in energischer Weise nach, indem man entweder Fallen aufstellt oder ihrer durch Auslegen von vergifteten Nahrungsmitteln Herr zu werden sucht. Die Ansichten über die verschiedenen Vertilgungsmethoden gehen auseinander und wird darauf hingewiesen, daß Ratten sehr schwer in Fallen gehen, also der auf diesem Wege zu erzielende Erfolg sehr unsicher ist.

Es ist angezeigt, in Lokalitäten, wo Ratten leicht hingenommen oder sich aufhalten können, diese so zu gestalten, daß keine Schlupfwinkel den Tieren geboten werden. Vermoerdes oder vermorschtes Material (Holz, Ziegelmauerwerk, Verputz usw.) ist aus den Lokalitäten auf  $\frac{1}{2}$  bis 1 m Tiefe auszuwerfen, das Mauerwerk usw. auszubessern und die entstandene Grube mit Schotter auszufüllen; der Schotter wird dann festgestampft und mit ziemlich flüssigem Zementmörtel übergossen. Holz- und Mauerwerk soll mit Teer bestrichen werden, wodurch die Ratten von den Mauern abgeschreckt werden, doch muß der Teeranstrich zeitweise wiederholt werden.

Von besserer Wirkung ist jedenfalls das Auslegen von vergifteten Nahrungsmitteln, doch scheint man auch bezüglich der Geeignetheit der verschiedenen in Betracht kommenden Gifte: Arsenik, Phosphor und Meerzwiebel ganz auseinandergehender Ansicht.

Phosphorpräparate haben sich nach der Ansicht Kotters nicht bewährt, dagegen hat er mit Arsenik guten Erfolg gehabt, wenn er in der Weise angewendet wurde, daß man feingehacktes oder auf einer Fleischmühle gemahlendes Fleisch mittels eines Stäbchens mit der Arsenverbindung gut durchknetet und dieses dann an Orten, die anderen Tieren nicht zugänglich sind, auslegt. Das Fleisch darf jedoch unter keiner Bedingung mit der Hand berührt werden, weil die Ratten das Lockmittel sonst nicht anrühren. Speisereste, Körnerfuttermittel, Gänseunrat, tierische Exkremente muß man entfernen, da sie von den Ratten vorgezogen werden.

Dr. Raebiger sagt, es sei bekannt, daß die Ratten einen außerordentlich feinen Instinkt besitzen, sie lassen früher

nicht vorhandene, plötzlich hingestellte Speisen und Getränke unberührt, sobald sie gemerkt haben, daß einer ihrer Genossen nach dem Genuße der verdächtigen Speisen verendet ist. Die in der Regel nur geringe Anzahl von Ratten, welche Meerzwiebelpräparate aufnimmt, findet nach stundenlangem Todeskampfe ein qualvolles Ende. Die anderen Ratten vermeiden dann die vergifteten Speisen. Nachiger hat dies wiederholt beobachtet und seine Angaben werden durch verschiedene Versuchsanstalten und Versuchsansteller bestätigt. Es gibt zurzeit nur ein Mittel, welches allen Anforderungen, die an ein praktisch verwertbares Rattenvertilgungsmittel gestellt werden können, entspricht und dies sind die Ratinkulturen. Dieselben stellen eine sehr gute Lockspeise dar. Sie werden von den Ratten begierig verzehrt. Bei genügender Auslegung erstreckt sich die Wirkung auf den ganzen Rattenbestand. Ihre Anwendung ist einfach, auch werden die Ratinkulturen preiswert abgegeben. Zahlreiche Fütterungsversuche haben ergeben, daß Ratinkulturen für Hausäugetiere, Geflügel, Wild und Fische vollkommen ungefährlich sind.

Bei der Vorbeugung der Pestgefahr spielt die Vertilgung der Ratten besonders auf pestverdächtigen Schiffen eine große Rolle, aber auch in bewohnten Häusern und Gehöften. Nach Dr. Giemsa ist zu der Vertilgung der Ratten sogenanntes inexplodibles Gengergas, wie es im Hamburger Hafen angewendet wird, das beste Mittel. Dieses ziemlich billige Gas besteht aus 5% Kohlenoxyd, 18% Kohlenäure und 77% Stickstoff. Es tötet sämtliche Ratten, greift aber infolge seiner fast völligen Geruchlosigkeit und der geringen chemischen Aktivität seiner Bestandteile weder Holz noch irgendwelche anderen Materialien an und gestattet die Desinfizierung, beziehungsweise Ausgaseung selbst der größten Schiffe in wenigen Stunden.

Zu dem gleichen Zwecke empfohlene flüssige Kohlenäure bietet den Nachteil, daß sie sich infolge ihres hohen speziischen Gewichtes mit der atmosphärischen Luft schlecht

mischt, wodurch ihre Wirkung unsicher wird und ist auch für die Anwendung im großen zu teuer.

Auch schweflige Säure wirkt nicht sicher, weil sie zum Teil durch die Schiffsladung und das in allen Teilen des Schiffes befindliche Wasser absorbiert wird. Sie bietet ferner den Nachteil, daß viele Gegenstände und Waren durch sie angegriffen werden und daß es zu lange dauert, bis ein größerer Raum wirklich damit gefüllt ist.

Dies gilt auch für die Schwefligsäurepräparate »Pictolin« (Gemisch aus flüssiger schwefliger Säure und Kohlenensäure), Marotgas (schweflige Säure mit starkem Gehalt an Schwefelsäureanhydrit) und das sogenannte Claytongas (schweflige Säure durch Verbrennen von Stangenschwefel mittels Gebläseluft erhalten).

Man hat durch längere Zeit hindurch die Meerzwiebel als ein sehr geeignetes Mittel zur Vertilgung von Ratten angesehen und auch vielfach empfohlen. Es wird nämlich häufig angenommen, daß die Meerzwiebel wohl für Ratten ein Gift sei, unsere Haustiere aber davon zu sich nehmen können, ohne Schaden zu erleiden. Nach Dr. Raebiger ist aber die Meerzwiebel durchaus nicht so harmlos, wie im allgemeinen geglaubt wird. Dieselbe enthält mehrere absolut giftig wirkende Glykoside, welche den Digitalis-Giftstoffen in bezug auf die Wirkung sehr nahestehen. Die Hauptbestandteile sind: 1. Scillotoxin, mit stark giftiger Wirkung auf das Herz (tödliche Wirkung pro 1 kg Hund = 1 mg). 2. Das Scillin, ein scharf reizender Stoff, und 3. das Scillipikrin. Außerdem enthält die Meerzwiebel ein Kohlenhydrat, das Sinistrin, ein flüchtiges, senföartiges Öl, und viel Schleimsubstanz. Die Scilla hat eine mit Digitalis fast identische Wirkung. Sie verlangsamt die Herztätigkeit und steigert den Blutdruck, genau wie das Fingerhutblatt. Der Unterschied zwischen beiden Drogen in ihrer Wirkung besteht darin, daß die Meerzwiebel Magen und Darm, sowie die Nieren stärker reizt, daher in größeren Mengen Erbrechen, Durchfall usw. hervorruft. Demnach ist die Meerzwiebel für

unsere Haustiere gefährlich und sie sollte nicht, wie es noch so häufig geschieht, als ein für unsere Haustiere »unschädliches« probates Rattenvertilgungsmittel bezeichnet werden, zumal das Pflanzengift vielfach nicht einmal in Verbindung mit einer guten Lockspeise von den Ratten aufgenommen werden soll.

Nichtsdestoweniger werden noch mannigfache Rezepte für Meerzwiebelpräparate angegeben und sie scheinen sich neben den zahlreichen verschiedenen Phosphorzubereitungen und neben Arsenik doch bewährt zu haben. Auf ganz unvergleichlich sichere Weise geschieht die Vertilgung von Ratten und Mäusen durch Vergiften mit Bazillen, welche mit dem Futter in den Körper dieser Tiere übergehen und den Tod herbeiführen.

Versuche, welche auf Veranlassung des Deutschen Reichsgesundheitsamtes angestellt wurden, haben ergeben, daß nur ein gewisser Prozentsatz grauer Ratten durch Fütterung mit dem Ratinbazillus vernichtet wird. Ein nicht unerheblicher Teil (50%) zeigt sich widerstandsfähig, und zwar sind es immer solche Ratten, bei welchen Schutzstoffe im Blute nachgewiesen werden konnten. Wahrscheinlich ist diese Immunität auf eine früher überstandene leichte Infektion mit gleichem oder stammverwandtem Krankheitserreger — der Ratinbazillus gehört zur Gruppe der Fleischvergifter — zurückzuführen, eine Infektion, die bei den Lebensgewohnheiten der Ratten sehr leicht eintreten kann. Da man mit der erworbenen Resistenz, beziehungsweise Immunität eines großen Teiles der Tiere rechnen muß, wird die Ratinverwendung immer nur einen mittelmäßigen Erfolg haben. Bei der Anwendung in der Praxis ist auch in Betracht zu ziehen, daß, wenn der Ratinbazillus für größere Haustiere auch nicht pathogen ist, er doch mit Vorsicht gebraucht werden muß.

Der Löfflerische Mäusetyphus-Bazillus bewirkt, wenn er richtig angewendet wird, eine tödliche Erkrankung der Feld- und Hausmäuse, die kranken Mäuse stecken die gesunden an und es entsteht eine Seuche unter denselben.

Für andere Tiere, auch für Ratten, ist er nicht schädlich. Der Mäusebazillus muß schnell verwendet werden, da er selbst eine sehr beschränkte Lebensdauer hat. Sonnenlicht tötet ihn bald ab, auch unter grellem Tageslicht leidet seine Wirksamkeit Schaden. Der Mäusebazillus wird (von der k. k. landwirtschaftlich-bakteriologischen Schutzstation in Wien) in kleinen Röhrchen geliefert, welche den Nährboden (Agar-Agar) mit dem dünnen hellgrauen Bazillusbelag enthalten. Ein einziges solches Gläschen enthält viele Millionen Bazillen. Die Verwendung des Bazillus geschieht in der Weise, daß man den Wattepfropfen aus dem Gläschen entfernt, etwas abgekochtes und wieder gekochtes Wasser auf die Decke bringt, solche mittels einer Federfahne ablöst und mit dem Wasser gut vermischt, wobei auch der Nährboden teilweise mitgenommen wird. Den ganzen Inhalt des Gläschens gießt man dann in 1 l vorher abgekühltes Wasser, mischt gut durch und bringt nun  $\frac{3}{4}$  kg frisches Brot, in kleine Stückchen zerteilt, in die Flüssigkeit, welche aufgesogen wird. Die Brotstückchen werden nun in noch nassem Zustande in die Mäuselöcher gesteckt (man kann pro Loch 2000 frische Mäuselöcher rechnen, für die der Inhalt eines Gläschens genügt). Es werden die Löcher am besten nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang beschickt, bei bewölktem Himmel kann man aber den ganzen Tag arbeiten. Unbedingt erforderlich ist, daß die Auslegung der Brotstücke nicht auf ein einzelnes, abgegrenztes Feld beschränkt wird, sondern daß beispielsweise in einer Gemeinde sich alle Mitglieder vereinigen und in gleicher Weise auf allen Feldern, aber auch in Straßengräben, Feldrainen und Eisenbahndämmen vorgehen; gerade in den letzteren nisten die Mäuse ungestört und wandern von dort in die Felder.

Bei der Bekämpfung von Hausmäusen nimmt man für ein Gläschen mit der Bazilluskolonie nur  $\frac{1}{4}$  l Wasser und legt die Brotstücke kurz vor der Nachtruhe in die Mäuselöcher und da und dort auf den Fußboden.

Die Erkrankung der Mäuse tritt nach etwa sechs bis achtzehn Tagen ein.

Der Dantszische Rattenbazillus unterscheidet sich in seiner Anwendung nur dadurch, daß anstatt 1 l Wasser für jedes Röhrchen nur  $\frac{1}{4}$  l genommen wird.

Nach Ansicht des Verwalters Rötter (*Wiener landwirtschaftliche Zeitung*) ist eines der besten Rattenvertilgungsmittel ein guter Hund (rauhhaariger Pinsch oder Foxterrier) und wo solche Hunde im Hause sind, nimmt die Rattenplage nie überhand. In einer an der March gelegenen, weit ausgedehnten Zuckersabrik fand Rötter 20 Foxterriers, welche nur zur Rattenvertilgung gehalten wurden.

Um Wühlmäuse in Obstgärten zu vertilgen, ist Arsenik das einzige Mittel. Es muß aber besonders vorge richtet werden, und zwar schneidet man Möhren oder Sellerieknollen der Länge nach durch und bestreicht die Schnittflächen mit weißem Arsenikpulver. Die zerschnittenen Stücke werden dann wieder mit einem Bindfaden zusammen gebunden und in die Löcher und befahrenen Gänge ausgelegt und mit einer Erdscholle zugedeckt. Sind die Baumwurzeln angefressen, so hebt man in der Nähe des Stammes einen Ballen Erde aus, legt das Giftpräparat darunter und deckt es wieder mit Erde zu. Junge Bäume, welche stark angefressen sind, werden wohl kein starkes Wachstum mehr zeigen und sind am besten zu entfernen; solche Bäume zeigen dies schon durch ihren lockeren Stand an und können in den meisten Fällen wie ein nicht tief in die Erde gesteckter Stab mit Leichtigkeit herausgezogen werden.

Die Tiere ziehen sich im Herbst, wenn die Beete leer werden, gerne in die Baumschulen zurück und bemerkt man deren Anwesenheit erst im Frühjahr. Es muß also hier vorge sorge t werden und geschieht dies am besten durch Legen von Gift, das aber vielfach nur schwierig zu haben ist. Ein einfaches Mittel zur Vernichtung der Wühlmäuse ist folgendes: Man pickt eine Anzahl von Möhren mit Phosphorzündhölzchen, bricht das hervorstehende Ende der Hölzchen ab, läßt das Gift einige Tage lang in die Möhren einziehen und vergräbt diese dann vorsichtig an den bedrohten Stellen.

Ein gutes Mittel gegen Wühlmäuse sind gebrauchte Chilisalpeterfäcke, die zumeist von dem Salz vollkommen durchtränkt sind. Die Säcke werden getrocknet und in 30 cm breite Streifen geschnitten. Dann wird die eine Seite des Streifens dick mit Teer bestrichen und dieser mit Schwefelblüte bestreut. Nach gutem Trocknen rollt man die Streifen zusammen und schneidet dieselben in fingerlange Streifen, die man in die Gänge der Wühlmäuse steckt und anzündet. Nach dem Anzünden muß man ein Stückchen Blech über den offenen Gang decken und dann erst Erde darauf bringen, um das Feuer nicht zu ersticken. Diese Rollen entwickeln solche Rauchmengen, daß jedes lebende Wesen in den Gängen erstickt oder vertrieben wird; selbst auf 10 m Entfernung ist in den Gängen der Mäuse noch dichter Rauch.

### Phosphorpräparate.

Die Präparate mit Hilfe von Phosphor werden mittels Mehl in Form von Klößen, dann mit Sirup, Schwefel in Pasta-(Brei-)Form gebracht, oder es wird der Phosphor in Fische, alten Käse, Fleisch usw. eingeschlossen, den Tieren als Nahrungs- und gleichzeitig als Vernichtungsmittel geboten:

#### 1. Phosphorbrei (nach Goede).

In kleinen Mengen stellt man Phosphorbrei dar, indem man Phosphor unter heißem Wasser schmilzt und die erforderliche Menge Mehl usw. zusetzt. Außer der schädlichen Einwirkung der phosphorigen Säuren können auch noch lebensgefährdende Explosionen entstehen. Ein Zusatz von Phosphorsirup ist zwar unbedenklicher, seine Herstellung aber ist nicht ungefährlich. Deshalb empfiehlt Goede für den Klein- und Großbetrieb einen Zusatz von Schwefel, und zwar 1 Gewichtsteil Schwefel für 6 Gewichtsteile Phosphor, wobei die genaue Einhaltung der angegebenen Mengen dringend erforderlich ist, da vier verschiedene Ver-



bindungen des Phosphors mit Schwefel möglich sind, und zwar  $P_4S_3$ ,  $P_2S$  und  $P_2S_5$ , bei der Herstellung des Phosphorbreies aber die flüssige Verbindung  $P_4S$  erhalten werden soll, in welcher der weitere ungebundene Phosphor selbst beim Erkalten bis  $25^\circ$  fein verteilt bleibt. Zur Darstellung empfiehlt Goede die Anwendung eines emaillierten eisernen Kessels, gibt die ganze erforderliche Menge heißen Wassers ( $60-65^\circ C$ ) hinein, schmilzt den Phosphor darin, rührt dann für 6 Teile desselben 1 Teil fein gesiebten Schwefel hinzu und läßt erkalten. Nachher füllt man unter Umrühren vom Boden aus das zur Breibildung erforderliche Mehl hinzu. Das Abkühlen ist von Wichtigkeit, da dadurch die Bildung der phosphorigen Säure bei dem Mehlezusatz möglichst verhindert wird. Als Witterung kann man der Masse etwas Anisöl zusetzen.

## 2. Phosphorbrei.

(Nach früher patentiert gewesenem Verfahren.)

150 g gewöhnlicher Sirup werden mit 500 g Wasser zusammen in einem geeigneten Eisen- oder Blechgefäß zum Kochen gebracht und der Masse, nachdem dieselbe vom Feuer genommen ist,

20 g Phosphor zugefügt. Die bei der Bereitung zweckmäßig vermittels eines Wasserbades warm gehaltene Masse wird mit einem breiten Holzspachtel etwa zehn Minuten lang gerührt, bis der Phosphor in der Flüssigkeit gleichmäßig fein verteilt ist. Wenn letzteres erreicht ist, werden ferner

15 g in Wasser gelöste Gelatine, sowie schließlich noch ein rohes Ei hinzugegeben und das Ganze nochmals zehn Minuten lang gut durchgerührt. Die Masse wird dann in einem mit kaltem Wasser gefüllten Gefäße abgekühlt, worauf sie eine sämige Flüssigkeit darstellt. Behufs Anwendung wird die Giftmasse mit einem Brei aus Weißbrot und geräucherten Fischen (Bücklingen) verrührt.

## 3. Phosphorbrei.

Man kocht 100 g Roggenmehl mit etwa  
400 g Wasser zu einem Brei ein, so daß  
man 400 g Masse erhält, und rührt solchen in 75 g Oliven-  
öl ein. Während des Erhaltens des Gemisches bringt man  
in ein Steinzeuggefäß

15 g Gummischleim,

5 g Wasser,

5 g Anathol und

10 bis 15 g Phosphor, die man durch vorsichtiges  
Erwärmen schmilzt. Nach dem Verschließen des Gefäßes  
mit einem Kork, wird solches zur Emulgierung des Phos-  
phors geschüttelt. Die Emulsion darf nicht allzu fein sein,  
um eine zu schnelle Oxidation des Phosphors zu ver-  
hindern. Die erkaltete Emulsion wird mit dem Mehlbrei  
gemischt, die Steingutgefäße jedoch nicht bis an den Rand  
gefüllt. Sie werden mit tierischer Blase überbunden und  
dieser Teil dann noch in flüssig gemachtes Paraffin ge-  
taucht. Im Keller aufbewahrt, soll sich dieser Phosphorbrei  
gut halten.

## 4. Phosphorpasta.

135 g Phosphor werden in

4,5 l kochendes Wasser gebracht.

5 bis 7 kg Malz werden mit der Phosphorlösung über-  
gossen und in einem Kessel über gelindem Feuer erwärmt,

1200 g Mehl und

1500 g Zucker hinzugefügt und das Ganze 15 Minuten  
unter Umrühren auf dem Feuer stehen gelassen, so daß eine  
dicke Masse entsteht.

## Verschiedene Zubereitungen.

1. Kleine Fische (Stint) werden an der Bauchseite auf-  
geschnitten, worauf die Bauchhöhle mit Rattengift (Phos-  
phor) bestrichen wird. Die so vorbereiteten Fische werden

in den Sielen auf trockenen Stellen — in den Sieleneingängen, auf den Zungen der Sielverbindungen und auf den Abzähen der Sielschächte niedergelegt. Nach Ablauf von sechs bis acht Tagen werden die Futterstellen revidiert und da, wo die Köder von den Ratten genommen sind, von neuem Gift gelegt. Die erzielten Resultate waren: Es wurde mit 60 Futterstellen begonnen, zurzeit gibt es deren 149 und eine weitere Vermehrung ist in Aussicht genommen. Bei der letzten Revision der 149 Futterstellen ist der Köder nur an 9 Stellen unberührt geblieben und, wenn angenommen wird, daß ein vergifteter Fisch den Tod einer Ratte zur Folge hat, werden jetzt wöchentlich unmittelbar durch den Köder ungefähr 1000 Ratten vernichtet. An den Futterstellen selbst ist nur eine geringe Anzahl toter Ratten (zirka 3% der mutmaßlich vergifteten) gefunden worden, die meisten werden durch das Kanalwasser fortgeschwemmt und ein Teil der kranken Tiere flüchtet in die schwer zugänglichen Sielstrecken. Bei einer vorgenommenen Spülung der Sielstrecken sind angebißene Rattenkadaver abgeschwemmt worden, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß die vergifteten Ratten von ihren Anverwandten verzehrt werden und daß indirekt eine weitere Abtötung des Ungeziefers erfolgt. Auf Grund der gemachten Erfahrungen wird das angewendete Verfahren in intensiver Weise fortgesetzt werden. Schädliche Folgen des Verfahrens sind bislang weder in den an die Siel angegeschlossenen Grundstücken noch in der Elbe bemerkt worden.

2. Holländischer Käse wird in Stückchen von der Größe einer Erbse zerschnitten und in jedes solches Stückchen Käse der von einem Zündhölzchen (sogenannte Schwefelhölzchen) abgeschabte Phosphor hineingedrückt und die Öffnung wieder mit Käse verklebt; der von einem Zündhölzchen abgeschabte Anteil phosphorhaltiger Zündmasse reicht hin, um eine Ratte zu töten. Da nun diese lästigen Tiere Käse leidenschaftlich gern fressen, so fressen sie auch jene Käsestückchen, welche Phosphor enthalten, und werden unfehlbar getötet.

## **Barythaltige Präparate zur Vertilgung der Mäuse.**

In neuester Zeit ist besonders in Bayern der kohlensaure Baryt, in Kuchen verpackt, als ein sehr wirksames, sicheres und bequemes Mittel zur Mäusevergiftung erkannt und empfohlen worden. Versuche, die seitens der Versuchstation zu Dresden mit Barytkuchen ausgeführt worden sind, haben die in Bayern gemachten Erfahrungen in hohem Maße bestätigt. Der Verbrauch auf der Feldfläche richtet sich naturgemäß nach der Zahl der zu belegenden Mäuselöcher. Im Durchschnitt werden auf 1 *ha* 10 bis 20 Kuchen erforderlich sein. Die Barytkuchen enthalten das für Menschen und Tier giftige Bariumcarbonat als wirksamen Bestandteil. In jedes bewohnte Mäuseloch wird ein Brocken Barytkuchen so eingelegt, daß er von den Vögeln nicht herausgezogen werden kann. Die Vergiftung der Feldmäuse wird am wirksamsten im Spätherbst oder zeitlich im Frühjahr, bei günstigen Schneeverhältnissen auch im Winter vorgenommen, wenn denselben wenig Futter zur Verfügung steht. Wie bereits erwähnt, hat das Bariumcarbonat schon in geringen Mengen hierbei eine stark giftige Wirkung für den Menschen und auch für Tiere. Hierbei sei aber darauf hingewiesen, daß der Barytkuchen nur bei Aufnahme durch den Mund giftig wirkt und daß Berührung mit den Händen vollständig gefahrlos ist. Da Hühner, Katzen und auch Hunde durch den Genuß von Barytkuchen zugrunde gegangen sind, so ist es ratjam, derartige Haustiere an den Tagen, an denen Mäusegift ausgelegt wird, eingesperrt zu halten. Sollte trotzdem bei Menschen oder Tieren eine Vergiftung durch den Genuß von Barytkuchen vorkommen, so gebe man sofort Glaubersalz als Gegenmittel ein.

Bei der Gefährlichkeit des Arseniks zur Vertilgung der Rager einerseits und angesichts der vielfachen Mißerfolge mit Phosphorteig ist ein Präparat empfehlenswert, das allen Anforderungen an ein Ratten- und Mäusegift vollkommen entspricht. Durch die Erfahrung wurde festgestellt, daß solches in der Herstellung einfach, im Verkauf

lohnend ist, daß es außerordentlich sicher und zuverlässig wirkt, auffallend gern gefressen wird und daß es auch Katzen nehmen, die hie und da auf Böden sehr unlieb bemerkte Gäste sind; es ist ein Universalmittel zur Säuberung von Haus und Hof von lästigem Getier und darf ohne Giftseifein abgegeben werden.

### Meerzwiebelpräparate.

1. Man erwärmt

1 Gewichtsteil geräucherten Speck,

4 Gewichtsteile Schweinefett,

1 Gewichtsteil Kunstspeisefett in einem Kessel bis auf ungefähr 70° C.

Das geschmolzene, gut verrührte Fett läßt man sodann etwas abkühlen und vermischt es bei einer Temperatur von 30 bis 35° C mit Mehl und kohlenjaurem Baryt. Am besten hat sich ein Mengenverhältnis von 2 bis 3 kg des Fettgemisches mit 5 bis 12 kg Mehl und 3 bis 4 kg kohlenjaurem Baryt bewährt. Die Mischung der Fettstoffe mit dem Mehl und Baryt geschieht durch Kneten der noch warmen Masse. Aus der Masse werden Ziegel geformt, diese in einem Eiskasten rasch auf etwa 5° C abgekühlt, sodann zerschnitten und in die für den Verkauf bestimmte Form (Kugeln, Würfel etc.) gebracht.

2. 500 Teile Schweinefett,

5 „ Salizylsäure,

1 Teil Zwiebel,

50—100 Teile Rindstalg,

500 „ Bariumcarbonat,

50 „ 20%ige ammoniakalische Grünspanlösung.

Die in kleine Stücke zerschnittene Zwiebel wird im Fett, dem man je nach der Jahreszeit Rindstalg zusetzt, geröstet, bis sie dunkelbraun geworden ist und das Fett den angenehmen Zwiebelgeruch angenommen hat. Man setzt Salizylsäure hinzu, kocht durch und rührt, bis das halberkaltete Fett durchsichtig geworden ist. Darauf gibt man den Baryt und endlich die Grünspanlösung hinzu.

An dieser Vorschrift ist nur die Zusammenstellung und das Mischungsverhältnis der einzelnen Bestandteile neu; die wirksamen Bestandteile selbst finden schon jahrelang zu demselben Zwecke Verwendung.

### 3. Rattenklöße.

Eine frische Meerzwiebel wird zerkleinert, ein Eßlöffel voll Mehl und voll Milch hinzugelegt, alles durcheinandergearbeitet und mit Fett ordentlich durchgebraten. Diese Art Klöße werden den Ratten vorgelegt. Der Erfolg war immer vorzüglich, die Ratten verschwanden. Man hat dieses Mittel häufig den Landwirten empfohlen, welche den guten Erfolg bestätigten. Etwas Samen Strychnin unter Kartoffelbrei gerührt, wirkt ebenfalls vorzüglich, nur muß man einige Tage vorher die Ratten mit Kartoffelbrei anlocken.

4. Meerzwiebeln werden in dünne Scheiben geschnitten, sofort getrocknet und zerstoßen. Dieses Pulver wird sodann mit Streuzucker, Mehl, etwas Glycerin und Salizylsäure sowie der erforderlichen Menge Wasser zu einer Pastillenmasse geformt, mittels Pastillenstechers hieraus Pastillen geformt und diese scharf getrocknet. Vor dem Gebrauch sind diese Pastillen mit etwas Zucker zu bestreuen und ein Gefäß mit Wasser daneben zu stellen.

5. Frische Meerzwiebeln werden möglichst fein zerhackt und mit etwas zerkleinerter Würst und Mehl zu einem Teig verarbeitet. Dieser wird dann wie Pfannkuchen mit Fett leicht gebacken, hierauf mit Zucker bestreut und in den von den Nagern heimgesuchten Räumen ausgelegt.

### Mäusegrütze. (Nach Töllner.)

100 Teile gepulvertes Bariumkarbonat,

300 » Gerstenmehl,

1 Teil Saccharin werden mit Wasser zu einem festen Teig geknetet. Dieser wird mittels Durchtreibens

durch ein Sieb geförnt und im Trockenschrank getrocknet. Statt des Saccharins, das jetzt schwer zu beschaffen ist, dürfte wohl eine entsprechende Menge Zucker die gleichen Dienste leisten.

### **Giftweizen.** (Nach Eileres.)

10 kg Weizen werden in einem kupfernen Kessel mit 5 l kochendem Wasser übergossen und unter häufigem Umrühren so lange warm gestellt, bis alles Wasser aufgesogen, der Weizen gequollen und völlig weich geworden ist. Derselbe ist nun durch Keimung und Maltosebildung süß geworden, ohne Saccharinzusatz, und wird über einem mäßigen Feuer unter beständigem Umrühren getrocknet. Sobald er heiß geworden ist, setzt man eine konzentrierte Lösung von

24 g Strychnin nitr. in

5 l kochendem Wasser zu und rührt weiter um, bis er so trocken geworden ist, daß er von dem Nährpachtel abfällt. Kurz vorher wird zum Färben des Weizens eine spirituose Fuchsinlösung zugelegt. Zu starkes Feuer und Anbrennen sind möglichst zu vermeiden. Soll der Weizen längere Zeit aufbewahrt werden, so muß er auf Hülden im Trockenschrank nachgetrocknet werden. 2 g Anisöl werden dem völlig erkalteten Weizen als Bitterung noch zugerührt.

### **Petolin**

(Mäuse-, Ratten- und Insektenvertilgungsmittel)

ist eine braungraue harte Masse, welche auf der Bruchfläche marmorartige Zeichnungen zeigt. In dem daraus dargestellten Pulver ließen sich die Elemente der Nux vomica, der Baldrianwurzel, Weizenstärke, Holzfasern von Koniferen, Lycopodium und Teeblätter nachweisen.

### **Mittel gegen Ratten in Geflügelställen.**

Ratten richten in oder in der Nähe von Geflügelställen großen Schaden an und man kann vor denselben nicht ge-

nügend auf der Hut sein. Legt man den Hühnern mehr Futter vor, als sie verzehren können, oder streut man es spät abends in den Stall, damit sie es gleich am nächsten Morgen finden, so heißt das nichts anderes, als die Ratten absichtlich herbeilocken. Will man diese unangenehmen Nager los werden, so muß man ein engmaschiges Drahtnetz als Geflügelstallwandung benützen oder die bereits vorhandenen aus anderem Material damit bekleiden. Ganz erheblich, vielleicht 30 cm muß dieses Drahtnetz unter den Stallboden reichen, damit das Durchgraben von außen verhindert wird, doch soll auch dieses Mittel auf die Dauer nicht wirksam sein. Ein scharfer Rattenfänger ist ein gutes Mittel, wenn nicht legende oder brütende Hennen in demselben Raume vorhanden sind. Diese würden zu sehr beunruhigt werden. Mit der Aufstellung von Fallen läßt sich wenig ausrichten, da die Ratten allzu schlau und vorsichtig sind; das Ausstreuen von Giften ist wegen der Gefahr für die Hühner nicht zu empfehlen, dagegen gilt das Umherstreuen von Sonnenblumenkernen als wirksam; sie sollen den Ratten den Tod bringen, wenn sie reichlich genossen werden.

Einige scharfe Gerüche, wie Naphthalin, können die Ratten nicht vertragen. Die Ratten sind, wie alle Nager, von Natur reinliche Tiere, denen jede Unreinlichkeit am Körper verhaßt ist. Es soll gelungen sein, durch geteerte, mit Federn beklebte Lappen, die man in die Gänge und Löcher stopfte, eine ganze Rattengeneration zu vertreiben.

## Vertilgung des Maulwurfes.

Der Maulwurf, den man in einzelnen Gegenden auch Schür- oder Schermaus nennt, lebt nicht von Vegetabilien, würde also, als von Würmern und Insekten lebend, nicht als Pflanzenschädling, sondern als nutzbringendes Tier anzusehen sein, wenn er nicht auf der Suche nach Nahrung



den Pflanzen durch sein Wühlen nachteilig wäre; dies macht sich besonders in den Früh- und Saatbeeten geltend und deshalb verfolgt man ihn eifrig. Die besten Mittel zu seiner Vertilgung sind gute Fallen und andere Fanginstrumente; da man ihm aber nicht überall mit denselben beikommen kann, bedient man sich auch anderer Mittel. Der Maulwurf läßt sich leicht mit dem Spaten aus der Erde werfen, wenn man ihm zur Zeit, wo er stößt, aufslauert und sich dabei gegen den Wind stellt und ruhig verhält. Er wühlt bei gemäßigter Witterung mehr des Nachts und früh am Morgen mehr als am Abend, bei heißem Wetter am Tage und an kühlen, schattigen Orten und in Gräben, im Herbst aber gewöhnlich zwischen 3 und 4 Uhr nachmittags und des Nachts. Vor eintretendem Regen und herannahenden Gewittern wirft er am stärksten auf, so wie er überhaupt bei trübem, regnerischem und windigem Wetter am unruhigsten ist. Will man ihn fangen, so tritt man die Erhöhungen seiner Gänge mit den Füßen nieder und wartet nun ruhig und gegen den Wind stehend, wo er von neuem aufstoßen wird. Sobald er aufwirft, schleicht man behutsam und gegen den Wind näher, denn, da er ein sehr scharfes Gehör und ebenso scharfen Geruch hat, so schreckt ihn die geringste Störung wieder in die Tiefe zurück, sticht schnell hinter ihm den Spaten ein, wirft ihn heraus und schlägt ihn tot. Man kann ihn auch während des Wühlens mit Vogeldunst erschießen oder ohne Schrotladung durch den Knall betäuben, wenn man die Mündung der Schußwaffe 20 bis 30 cm hoch über den Ort hält, wo er eben wühlt. Kurz vor Sonnenaufgang oder kurz vor Sonnenuntergang ist die beste Zeit, ihm aufzulauern.

Bezweckt man nur die Vertreibung des Tieres, so nimmt man

1 kg Mehl von Saubohnen oder türkischen Bohnen,  
0.2 kg gemahlenen Grünspan,

0.1 kg Spicköl und etwas weiches Wasser, mischt erst die trockenen Bestandteile untereinander, knetet sie mit dem Spicköl und Wasser zu einem Teig und macht davon

Kügelchen von der Größe einer Haselnuß, von denen man in das Loch jedes Maulwurfhaufens eines steckt und die Erde wieder darüberdeckt. Der unangenehme Geruch dieser Kügelchen, den nicht allein alle Maulwürfe, sondern auch alle Ratten fliehen, dauert so lange an, als auch nur noch etwas von denselben in der Erde liegt und die Maulwürfe lassen sich damit auf lange Zeit vertreiben. Andere Vertreibungsmittel sind folgende: Man gießt Teer, am besten Steinkohlenteer, in die Gänge oder man steckt hier und da etwas *Asa foetida*, Knoblauch, frisch geschabte und mit Teer angestrichene Hollunderstäbe, Häringköpfe, tote Krebse und Fische oder andere stark riechende Substanzen hinein, dann bleiben die Maulwürfe so lange ferne, als der Geruch dauert. Trockener, ungelöschter, pulverisierter Kalk, in die Gänge gelegt, tötet die Maulwürfe, sobald sie denselben mit der Nase berühren. Ein gutes Abhaltungsmittel, welches sich bei Samenbeeten mit Erfolg anwenden läßt, besteht darin, daß man rings um dieselben einen 50 bis 70 cm tiefen Graben zieht und denselben mit dornigen Abschnitten von Stachelbeeren, Rosen usw. füllt, dann wieder mit Erde bedeckt und diese festtritt. Daß dieses Mittel alljährlich erneuert werden muß, versteht sich von selbst. Wenn man die Regenwürmer so viel als möglich zu vertilgen sucht, so bleibt der Maulwurf, dessen beste Nahrung dann fehlt, weg.

Er kann auch in Töpfen gefangen werden, die man unter seinen Hauptgang eingräbt, wobei aber die dadurch entstandene Öffnung des Haupteinganges mit einem Brette verdeckt und überhaupt mit großem Geschick verfahren werden muß. Vom März bis Mai kann man auch aus den großen, von Maulwürfen gemachten Hügeln die Jungen, deren jedes Nest vier bis sieben enthält, ausgraben.

## Hamsterpatronen zur Vertilgung des Hamsters.

Mit Gift ist dem Hamster, dessen Bau oft 2 m tief unter dem Erdboden liegt, schwierig beizukommen und man ist gezwungen, zu einer anderen Vernichtungsart zu greifen. Erfahrungsgemäß erreicht man die Beseitigung des Tieres am besten durch Erstickten desselben mittels Rauch, und zwar mittels sogenannter Hamsterpatronen. Als Raucherzeuger benützte man früher Chemikalien und sonstige Körper, die in brennendem Zustande ein großes Volumen Gas erzeugen, welches erstickende Wirkung besitzt, z. B. Kaliumchlorat, Schwefel, Kohle, Natriumnitrat; auch das Naphthalin eignet sich äußerst vorteilhaft zur Füllung dieser Patronen, da dieser Körper eine ungeheure Menge Rauch zu entwickeln fähig ist.

Die Herstellung der Hamsterpatronen geschieht in der Weise, daß man in Papphüllen etwa 100 g einer der noch anzuführenden Mischungen füllt, die Öffnung oben mit geschmolzenem Naphthalin ausgießt und in diese Schicht einen Docht oder Schwefelzaden als Zünder einbettet. So hergestellt sind die Patronen äußerst handlich und von ausgezeichneter Wirkung. Man verwendet das Präparat in der Weise, daß man sämtliche auffindbare Schlupflöcher des Tieres, welche meist an den mit Spreu und Hüllsen bestreuten Ausgangsröhren erkennbar sind, mit den Patronen beschießt, den Zünder anbrennt und sodann jedes Loch durch Bretter oder Steine sorgfältig verschließt. Die entwickelten Gase dringen notwendigerweise in das Innere des Baues und es gelingt dem habgierigen Einwohner, der übrigens vorzüglich gräbt, selten, sich einen rettenden Ausgang zu bahnen.

Nach Buchheister und »Drogisten-Zeitung« haben sich folgende Kompositionen bewährt:

1. 90 Teile Naphthalin,  
30 » Salpeter,  
30 » Schwefelblumen.

2. 120 Teile Natronjaspeter,  
10 » Kohlepulver,  
20 » Schwefelblumen.
3. 30 Teile Kaliumchlorat,  
30 » Schwefel,  
50 » Natronjaspeter.
4. 80 Teile Natronjaspeter,  
20 » Kohlepulver.

Es ist wohl nicht nötig, zu erwähnen, daß das Mischen des Schwefels mit Kaliumchlorat, sowie das Schmelzen des Naphthalins unter Beobachtung der größten Vorsicht ausgeführt werden muß.

## Alphabetisches Sachregister.

- |   |   |
|---|---|
| <p> <b>Aasfäfer</b> 69.<br/> <b>Ackereulen</b> 27.<br/> <b>Acker Schnecke</b> 102, 180.<br/> <b>Acker Schwamm</b> 26, 131.<br/> <b>Afrol</b> 138.<br/> <b>Asterraupen</b> 69.<br/> <b>Altalien</b> 65.<br/> <b>Aloe</b> 64.<br/> <b>Ameisen</b> 69, 147, 208.<br/> <b>Ammoniak</b> 254.<br/> <b>Ammoniumverbindungen</b> 63.<br/> <b>Anforderungen</b> 71.<br/> <b>Anophelesarten</b> 245.<br/> <b>Anschwellungen</b> 4.<br/> <b>Anthraknose</b> 15, 26, 71.<br/> <b>Antidin</b> 112.<br/> <b>Antiformin</b> 138.<br/> <b>Antifungin</b> 144.<br/> <b>Antigermin</b> 141.<br/> <b>Antimerulion</b> 138.<br/> <b>Antimottein</b> 227.<br/> <b>Antinommin</b> 138, 141.<br/> <b>Antipolypin</b> 141, 144.<br/> <b>Antiputrin</b> 224.<br/> <b>Antispora</b> 111.<br/> <b>Apfelbaumrindenlaus</b> 28.<br/> <b>Apfelblütenstecher</b> 28.<br/> <b>Apfelwider</b> 15, 28.<br/> <b>Apteripte</b> 113.<br/> <b>Arbeiten des Land- und Gartenwirthes</b> 40.<br/> <b>Arsenkupferlösungen</b> 72, 80.<br/> <b>Arsenverbindungen</b> 62, 64.<br/> <b>Asfeln</b> 35, 231.         </p> | <p> <b>Äther</b> 66.<br/> <b>Aus Schwefeln</b> 248.<br/> <b>Außenparasiten</b> 9.<br/> <b>Ausstauben</b> 255.<br/> <b>Autan</b> 259.<br/> <b>Avenarius</b> 83.<br/> <b>Azeton</b> 66.<br/> <b>Azurin</b> 77.<br/> <br/> <b>Bariumverbindungen</b> 63.<br/> <b>Barnthaltige Präparate</b> 308.<br/> <b>Basitäser</b> 29.<br/> <b>Baumfärrer</b> 157.<br/> <b>Baum schwämme</b> 146.<br/> <b>Baumspriße</b> 193.<br/> <b>Baumwanzen</b> 231.<br/> <b>Baumweißling</b> 27.<br/> <b>Beerenwider</b> 33.<br/> <b>Bekämpfung</b> 36, 46, 57.<br/> <b>Verührungsgifte</b> 59.<br/> <b>Bettwanze</b> 35, 240.<br/> <b>Bienen</b> 149.<br/> <b>Bienenstiche</b> 285.<br/> <b>Bießfliegen</b> 35.<br/> <b>Birnknospenstecher</b> 28.<br/> <b>Birnsauger</b> 70.<br/> <b>Blasensüße</b> 33, 69.<br/> <b>Blattbräune</b> 71.<br/> <b>Blattfleckenkrankheit</b> 71.<br/> <b>Blattfraß</b> 47.<br/> <b>Blattläser</b> 31.<br/> <b>Blattlaus</b> 120.<br/> <b>Blattläufe</b> 15, 34, 67, 102, 104, 113, 153, 179.         </p> |
|---|---|

Blattlausfeinde 34.  
 Blattlauslöwen 34.  
 Blattläufer 27.  
 Blattschorf 4, 25.  
 Blausäure 63, 64.  
 Blechkronen 236.  
 Bleiverbindungen 62.  
 Blumenfliegen 33.  
 Blumengartenschädlinge 33.  
 Bluteigel 35, 156.  
 Blütenfall 15, 25.  
 Blütenwickler 27.  
 Blutlaus 28, 68, 120, 160.  
 Blutläuse 15, 156, 161.  
 Bockkäfer 31, 217.  
 Bohrkäfer 217, 232.  
 Bollenmade 33.  
 Bordeaux-Solution 77.  
 Bordelaiserbrühe 77.  
 Borkenkäfer 12, 14, 70.  
 Borjäure 33.  
 Bosh 115.  
 Bouille rationelle 75.  
 — unique 77.  
 Brammen 35.  
 Brand 3.  
 Brausen 191.  
 Brechfliege 34.  
 Bremsen 21, 35, 264, 272, 273.  
 Bremsenöl 275.  
 Bremsenwasser 275.  
 Brenner 15, 26.  
 Brotbohrer 217.  
 Brotklopfkäfer 35.  
 Brumataleim 107.  
 Brummer 34.  
 Brunnfliege 34.  
 Brutknüppel 205.  
 Buchdrucker 29.  
 Bücherlaus 232, 233.  
 Bücherichädlinge 231.  
 Bücherhorspion 233.

Chemische Mittel 58.  
 Chinesische Mottentinktur 225.  
 Chloroform 63, 66.

Chlorose 15, 25.  
 Chlorverbindungen 62.  
 Chlorzink 145.  
 Claitongas 300.  
 Cognetz-Pulver 78.  
 Cold Storages 222.  
 Cremes gegen Schnafen 283.

Damm 76.  
 Dämpfe 66.  
 Daffelfliegen 35.  
 Dickopf 27, 28.  
 Dieb 35, 232.  
 Drahtwurm 189.  
 Drahtwürmer 31, 70, 187.  
 Drogen 115.  
 Ducanil 118.  
 Dufourische Lösung 169.  
 Durchschneidungsgräben 206.

Eau céleste 77.  
 Clair 111.  
 Egel 35.  
 Eichenerdflö 33.  
 Eisenverbindungen 62.  
 Eisenbitriol 65, 72, 82.  
 Eisenbitriollösungen 82.  
 — nach Binnet 82.  
 — nach Bolle 82.  
 — nach Halloway 82.  
 — nach Pellegrini 82.  
 Eiserner Insektenbestand 48.  
 Ektoparasiten 9.  
 Elektrisches Licht 54.  
 Emulgiertes Teeröl 94.  
 Engerlinge 70, 98, 170.  
 Entblätterer 27.  
 Erbsenfelder 168.  
 Erbsenkäfer 27, 167, 217.  
 Erbsenwickler 27, 217.  
 Erdflö 102.  
 Erdflöhe 33, 70, 163.  
 Erdtrebs 4, 25, 27.  
 Erdräusen 27.  
 Erdwolf 27.  
 Ersmisch 112.

- Esken asi 110.  
 Essigsäure 66.  
 Etiolijieren 4.  
  
 Fangbäume 205.  
 Fanggläser 207.  
 Fanggräben 173, 205.  
 Fanggürtel 202.  
 Fangknüppel 204.  
 Fangpflanzen 11.  
 Fangreißigbündel 204.  
 Fangrinden 204.  
 Fangschirm 208.  
 Fangtöpfe 173.  
 Faulen 4.  
 Federlinge 295.  
 Federichabe 35.  
 Feldheuschrecke 27.  
 Feldmäuse 301.  
 Feldschädlinge 27.  
 Feldspargelfäfer 182.  
 Fette 64.  
 Feuerichwamm 135, 136.  
 Fichtenau 111.  
 Fichtenbastfäfer 30.  
 Fichtenborkefäfer 29.  
 Fichteninseife 113.  
 Fichtenpissfodes 30.  
 Filzlaus 35.  
 Fingerringel 233.  
 Fischchen 34.  
 Fischlaus 35.  
 Flachseide 26.  
 Flechten 129.  
 Fleischfliege 34.  
 Fleischfliegen 214.  
 Fleischfressende Insekten 56.  
 Fliege 27.  
 Fliegen 21, 34, 213, 243, 264, 272.  
 Fliegenessenzen 271.  
 Fliegenharzpapier 266.  
 Fliegenleim 267.  
 Fliegenpapier, klebendes 266.  
 Fliegenpapiere 265.  
 Fliegenpuder 271.  
 Fliegenfalbe 271.  
 Fliegen, Salbe gegen 272.  
 — Streupulver 270.  
 Fliegenwasser 270.  
 Floh 35, 242.  
 Flohfranteule 33..  
 Flohwasser 288.  
 Florfliegen 34.  
 Florraupe 69.  
 Fluorkupfer 141.  
 Fluornatrium 141.  
 Fluorverbindungen 141.  
 Flugbrand 67.  
 Flüssige Vertilgungsmittel 65.  
 Flüssigkeitszerstäuber 192.  
 Folia Carbolineum Plantarium 93.  
 Formaldehyd 63.  
 Formalindämpfe 248.  
 Forstinsekten, Vertilgung 50.  
 Forstschädlinge 29.  
 — Verbreitung 48.  
 Fostit 78.  
 Fraßbilder 47.  
 Frostinachtschmetterling 176.  
 Frospanner 27, 176.  
 Fungizide 59, 67, 70.  
 Fusilladium 177.  
  
**G**allen 4.  
 Gallenbildungen 4.  
 Gammaeule 27.  
 Gammaraupe 69.  
 Gartenhüpfer 33.  
 Gartenschnecke 181.  
 Gase 66.  
 Gebäudeschwamm 131.  
 Gelsen 35, 244.  
 Gemüseeule 33.  
 Generatorgas 299.  
 Gerlach'sches Mädebad 294.  
 Getreideblasenfuss 33.  
 Getreidebrand 3, 25.  
 Getreideföhrer 216.  
 Getreidelauwfäfer 27, 70.  
 Getreiderost 4, 25, 67.  
 Getreideverwüster 27.

Giftweizen 311.  
 Glasöschwärmer 217.  
 Goldaster 27.  
 Goldaugen 34.  
 Goldtopf 33.  
 Goffe 33.  
 Graue Raupe 69.  
 Grillen 165.  
 Grünauge 27.  
 Gummoje 16, 26.

Haarschabe 35.  
 Haarschaben 218.  
 Haferbrand 67.  
 Hallimasch 135.  
 Halmfliege 27.  
 Halmweipe 27.  
 Hamster 315.  
 Hamsterpatronen 315.  
 Hanföl 113.  
 Harlekin 33.  
 Harzgewinnung 4.  
 Harztaures Kupfer 81.  
 Harz-Seifenlösungen 113.  
 Hasenfraßwunden 236.  
 Hausfliegen 21.  
 Hausgrille 34, 214.  
 Hausgrillen 165.  
 Hausmäuse 301, 302.  
 Hauschwamm 26, 131.  
 Haustorien 6.  
 Hauswanze 35, 240.  
 Hautschmarotzer 113.  
 Hederich 122.  
 Heidefrautplantagen 205.  
 Heilende Mittel 60.  
 Heimchen 34, 165, 214.  
 Herbstzeitlose 122.  
 Herrgottsfäferchen 34.  
 Herring-Masse 114.  
 Herzwurm-Erbseuule 33.  
 Heffenfliege 27.  
 Heufelder Kupfersoda 78.  
 Heuschrecken 70, 166.  
 Heuwurm 16, 33, 68, 105, 106,  
 121, 163.

Heuseile 204.  
 Hezenzwirn 5.  
 Holzbock 35.  
 Holzbohrer 35.  
 Holzölsuchen 114.  
 Holzschwamm 131.  
 Holzteer 64.  
 Holzteeröle 64.  
 Holzweipe 217.  
 Holzweipen 32.  
 Holzwürmer 217.  
 Hopfenlaus 105, 120.  
 Hopfenspritze 193.  
 Hornisse 150.  
 Hühnerbestand 295.  
 Hühnerlaus 35.  
 Hüllenfrüchtenschädlinge 167, 217.  
 Hundefloh 35.  
 Hundezecke 35.  
 Hungerzwetschgen 4, 25.  
 Hylofervin 236.  
 Hypertrophien 4.

Ichneumoniden 28.  
 Igel 23.  
 Imprägnierflüssigkeit 149.  
 Insecticide liquide 117.  
 Insektenabhaltungsmittel für  
 Menschen 286.  
 — — Tiere 289.  
 Insektenglas 206, 207.  
 Insektenkalamitäten 48.  
 Insektenöl 289.  
 Insektenpulver 64, 261.  
 — farburirtes 264.  
 — metallisches 294.  
 — zusammengeleimte 263.  
 Insektenseife 285.  
 Insektenspeckseife 292.  
 Insekten tötende Mittel 67.  
 Insektenschädlinge, Bekämpfung der  
 36.  
 — in Forsten 46.  
 Insektizide 67.  
 Ipsiloneule 27.  
 Isoliergräben 205.



## Jassus 33.

Kabinettkäfer 35.  
 Käfer 65, 66, 109.  
 Käferlat 215.  
 Kalifornische Brüche 76.  
 Kaliumverbindungen 63.  
 Kaliumzanthogenat 98.  
 Kalkanstrich 160.  
 Kalkdüngung 161.  
 Kalkverbindungen 63.  
 Kapuzinerpulver 292.  
 Karbolinum 65, 83, 139.  
 — Prüfung 95.  
 — wasserlösliches 84, 89.  
 Karburiertes Insektienpulver 264.  
 Karpfenlaus 35.  
 Kartoffelkäfer 11, 27, 70.  
 Kartoffelkrankheit 4, 25, 71.  
 Kartoffelpilz 124.  
 Kartoffelschorf 67.  
 Käsefliege 34, 214.  
 Keleti 111.  
 Kellerasseln 35, 168.  
 Kiefernaltholzpißodes 30.  
 Kiefernblattwespe 21.  
 Kiefernblattwespen 32.  
 Kiefernneule 32.  
 Kiefernknospenstecher 30.  
 Kiefernmarktkäfer 29.  
 Kiefernadelgallmücke 32.  
 Kiefernraupe 12.  
 Kiefernspanner 12, 32.  
 Kiefernspinner 31.  
 Kiefernweigbock 31.  
 Kienöl 65.  
 Kirschblattwespe 70.  
 Kirschblattwespen 69.  
 Kirschfliege 28.  
 Lebendes Fliegenpapier 266.  
 Kleeseide 26, 125.  
 Kleider 225.  
 Kleiderlaus 35.  
 Kleidermotte 35.  
 Kleidermotten 217.

Kleinirab 47.  
 Kleinschmetterlinge 32.  
 Klopiskäfer 35.  
 Knodolin 111.  
 Knospengallwespe 56.  
 Knospengallmücke 120.  
 Kohlenoxyd 63.  
 Kohlenäure 299.  
 Kohlenstoff 63.  
 — Verbindungen 63.  
 Kohlerdfloh 33.  
 Kohleneule 33.  
 Kohlgallenrüssler 33.  
 Kohlbarnie 4, 25.  
 Kohltraupe 69.  
 Kohltraupen 69.  
 Kohltraupenschwefwespen 28.  
 Kohlweißling 33.  
 Kohlweißlingsraupe 69.  
 Kohlweißlingsraupen 169.  
 Koloradokäfer 11, 27, 70.  
 Kontaktgifte 59.  
 Kopflaus 35.  
 Kopfschnitzfliege 292.  
 Kornfliege 27.  
 Kornkäfer 216.  
 Kornkrebs 216.  
 Kornmotte 35, 217.  
 Kornrüssler 216.  
 Kornwurm 35, 216, 217.  
 Krankheiten des Weinstocks 25.  
 Krägemücke 35, 248.  
 Kräuterdieb 35.  
 Kreosot 65, 88, 139.  
 Kreosotöl 93.  
 Krennenerdfloh 33.  
 Krenzotter 20.  
 Kreuzwurz-Adercule 27.  
 Kröpfe 4.  
 Küchengartenschädlinge 33.  
 Küchenfliege 22, 34, 214, 215.  
 Kugelfäher 34.  
 Kümmeleumotte 27.  
 Kupfer-Ammoniakbrühen 72.  
 Kupferalkalibrühen 72.  
 — mit Zucker 79.

- Stupferkalkbrühen mit Zucker nach Barth 79.  
 — — — nach Beglioni 79.  
 — — — nach Perret 79.  
 Stupfer-Kalk-Zuckerbrühen 72.  
 Stupferpräparate 65.  
 Stupferkalzkompositionen 72.  
 Stupferjoda 72.  
 Stupferverbindungen 62.  
 Stupfervitriol 72.  
 Stupfervitriol-Kalkbrühen 72.  
 — -Kalkpulver 72, 78.  
 — — nach Whitehead 78.  
 Stupfer-Zucker-Kalkpulver 72.  
 — — — nach Holtrung 79.  
 Kurative Mittel 60.  
 Kürschner 35.  
  
**L**  
 Lärchenschwamm 136.  
 Larven 115.  
 Läuse 35, 295.  
 Läusefucht 9.  
 Leimlösungen 64.  
 Leimringe 200, 201, 202.  
 Leimstangen 200.  
 Leimzäune 200.  
 Leineule 27.  
 Lenzitearten 135.  
 Letolin 311.  
  
**M**  
 Madenfalle 202.  
 Magengifte 59.  
 Magnesiumverbindungen 63.  
 Maikäfer 170.  
 Marienkäfer 34.  
 Marotgas 300.  
 Mauerischwamm 131.  
 Maulwurf 312.  
 Maulwurfsgriße 27, 33, 173.  
 Mäuse 121, 297.  
 Mäusegrüße 310.  
 Mäusepflanz-Basilus 301.  
 Mäusezahnrüßler 33.  
 Mechanische Mittel 208.  
 — Vertilgungsvorrichtungen 200.  
 Meerzwiebelpräparate 299, 309.  
 Mehlkäfer 66, 217.  
 Mehlspießmotte 35.  
 Mehlwurm 217, 232.  
 Meltau 15, 26, 70, 106, 179.  
 — der Neben 127.  
 — der Rosen 126.  
 Meltaufrankheit 127.  
 Meltauipilze 5.  
 Menschenfloh 35.  
 Metallisches Insekttenpulver 264.  
 Mistfrol 139, 141.  
 Milben 69.  
 Milbenipinnen 70, 121, 179.  
 Mißbildungen 4.  
 Mistel 26, 128.  
 Mittel gegen Forstschädlinge 53.  
 — — tierische Schädlinge 147.  
 Molbwolf 27.  
 Moos 129.  
 Moskitos 244, 276.  
 — Pulver gegen 283.  
 Mosquitolin 280.  
 Motten 35, 217, 219.  
 Mottenblume 228.  
 Mottenpapier 228.  
 Mottenpulver 224.  
 Mottentinkturen 225.  
 Mücken 35.  
 Mückenfliege 189.  
 Mückensäfte 282.  
 Mückentinktur 282.  
 Mückentinkturen 279.  
 Mutterkorn 3, 25.  
 Myzelien 5.  
  
**N**  
 Nadelfraß 47.  
 Nannismus 4.  
 Natriumverbindungen 63.  
 Neßlerische Blutlaustinktur 161.  
 — Flüssigkeit 156.  
 Nestraupenfalter 27.  
 Nickelverbindungen 62.  
 Niedere Pilze 67, 70, 82.  
 Nießwurz 64.  
 Nonne 13, 31.

Nützliche Vögel 21, 50.  
Rugholzborkeufäfer 30.

Obstbäume 15, 28.  
Obstbaumfarbolineum 89.  
Obstbaummadenfalle 203.  
Obstbaumraupen 69.  
Obstbaumschädlinge 27.  
Obstmade 177.  
Öle 64, 65.  
Ölseifenlösungen 113.  
Oregonbrühe 75.  
Organische Stoffe 63.  
Orthodinitroresorbatium 138.  
Oxalsäure 63.

Papierstreifen-Leimring 202.  
Paradiesäpfel 64.  
Parasiten 4, 6, 35.  
Parasitol 118.  
Pelzfäfer 35.  
Pelzmoite 35.  
Pelzmotten 217.  
Pelzwaren 225.  
Peringischer Brumataleim 107.  
Petroleum 65, 72, 99.  
Petroleumemulsion 161.  
Petroleumemulsionen 72, 101.  
Petroleumpulver 100.  
Pfahlwurm 233.  
Pferdebremse 35.  
Pflanzenkrankheiten 3, 78.  
Pflanzenläuse 57, 67.  
Pflanzenöle 64.  
Pflanzen-schädlinge 41, 80.  
Pflanzen-schutz 58.  
Pflanzen-schutzgürtel 236.  
Pflanzen-sprize 193.  
Pflanzliche Parasiten 4.  
— Schädlinge 25, 122.  
Pflaumen-jägerwespe 28.  
Pflaumen-widder 15, 28.  
Phenolnatrium 141.  
Phosphorbrei 304, 305, 306.  
— nach Goede 304.  
Phosphorpasta 306.

Phosphorpräparate 298, 304.  
Phytopathologie 3.  
Phytozide 59, 67.  
Piccolin 300.  
Picrofolidin 236.  
Pitrisäurelösung 68.  
Pilze 67, 118.  
Pilzkrankheiten 130.  
Pinol 141.  
Pistolenvogel 27.  
Plantol 118.  
Pochkäfer 232.  
Polarraupen 16.  
Polypenarten 26.  
Prachtfäfer 31.  
Prda 115.  
Prozeptionspinner 32.  
Puffi 109.  
Pulver gegen Miasmos 283.  
Pulverzerstäubungsapparat 196.  
Pyrethrumblüten 261.  
Pyrethrum-Seifenextrakt 119.

Quassiaholz 64.  
Quassiaholzertrakt 119.  
Quecksilberchlorid 140.  
Quecksilberverbindungen 62, 64.

Randmaden 186.  
Rantmaden 186.  
Rapserdflö 33.  
Rasenflächen 129.  
Rasenplantagen 205.  
Ratibazillus 301.  
Ratinkulturen 299.  
Ratten 297.  
— in Geflügelställen 311.  
Rattenbazillus 303.  
Rattenfalle 212.  
— nach Brehm 212.  
— verstellbar 212.  
Rattengift 307.  
Rattenklöße 306.  
Rattenpulver 112.  
Rattenwurst 112.  
Räucherkerzen 282.

- Näude 248, 294.  
 Nüudemilbe 35.  
 Raupen 102, 121, 174.  
 — an Obstbäumen 176.  
 Raupeneisen 175.  
 Raupenfackel 209.  
 Raupenfliegen 56.  
 Raupenholz 12.  
 Raupenleime 72, 106.  
 Raupennester 174, 177.  
 Raupenpuppen 231.  
 Raupenschiere 175.  
 Raupenscheren 210, 211.  
 Nebenschädlinge 33.  
 Nebstecher 33.  
 Neblaus 11, 16, 33, 68.  
 Regenwurm 18.  
 Regenwürmer 187.  
 Reifmotte 27.  
 Reitwurm 172.  
 Rettichfliege 33.  
 Reutwurm 27.  
 Riedkröte 27.  
 Riesenschlupfwespen 28.  
 Rindenläufe 68.  
 Rinderbremse 35.  
 Ringelspinner 27.  
 Rittersporn 64.  
 Rigenichorf 4, 25.  
 Roggenstengelbrand 25.  
 Rosenspinner 27, 28.  
 Rosenweiße 71.  
 Rosenzikade 33.  
 Rost 67.  
 Rostpilz 131.  
 Rotsäule 4, 25.  
 Rotschwanz 32.  
 Rübenälchen 11.  
 Rübenblattwespe 27.  
 Rübenmematoden 11, 98.  
 Rübenpflanzen 178.  
 Rübenrüffelfäfer 178.  
 Rübenwurm 11.  
 Rübsaatpfeifer 27.  
 Rückenenschwefler 199.  
 Ruffe 34.  
 Rüffelfäfer 30.  
 Ruffen 109, 215, 228.  
 Rusttau 71.  
 Saatenlenraupen 69.  
 Saatgut 237.  
 Saatschnelfäfer 27.  
 Sabadilljamen 64.  
 Sägerand 33.  
 Salbe 292.  
 — gegen Fliegen 272.  
 Salpetersäure 63.  
 Samentäfer 27.  
 San José Schildlaus 180.  
 Sauer 111.  
 Sauerwurm 16, 33, 68, 105, 106, 121, 163.  
 Säuren 65.  
 Schabe 233.  
 Schaben 35, 215, 217, 219.  
 Schabenfalle 229.  
 Schädlinge an Gebrauchsgegenständen 213.  
 — im Hause 34, 213.  
 — an Hausgeräten 213.  
 — an Nahrungsmitteln 213.  
 Schaflaus 35.  
 Schaflausfliege 247.  
 Schaflausfliegen 35.  
 Schaftecke 247.  
 Schafzede 35, 247.  
 Schalottenfliege 33.  
 Scharlachläufe 34.  
 Schieffliege 28.  
 Scheelsches Grün 81.  
 Schiffswerffkäfer 217.  
 Schildläufe 34, 67, 75, 76, 113, 178, 179.  
 Schimmel 179.  
 Schlupfwespen 28.  
 Schmaroker 6.  
 Schmarokergewächse 4.  
 Schmarokerinsekten 26.  
 Schmarokerpflanzen 4.  
 Schmeißfliege 34.  
 Schmetterlinge 31.

Schnabelferse 69.  
 Schnaken 35, 69, 244, 276.  
 — Räucherpastillen 282.  
 Schnecken 180, 231.  
 Schnellkäfer 31.  
 Schusterbock 31.  
 Schutzmittel 273.  
 Schwabe 34.  
 Schwaben 109, 228.  
 Schwabepulver 112.  
 Schwamm 131.  
 Schwammspinner 27, 28.  
 Schwammspinnerraupe 69.  
 Schwarze Fäule 15, 26.  
 Schwarzfäule 71.  
 Schwarzer Brand 18, 26.  
 Schwarzer Knoten 15, 25.  
 Schwefel 62.  
 Schwefelkohlenstoff 65, 66, 72, 97, 255.  
 — =Emulsionen 72, 97, 98.  
 — =Emulsion nach Targioni 99.  
 — =Injektor 194, 195.  
 Schwefelverbindungen 62.  
 Schwefelzerstäuber 196, 197, 198, 199.  
 Schweflige Säure 260, 300.  
 Schweinfurtergrünbrühen 72, 81.  
 Seidenester 126.  
 Seife gegen Ungeziefer 290.  
 Silberfischchen 34, 214.  
 Silberfischlein 233.  
 Singvögel 190.  
 Stawindst-Pulver 78.  
 Skorpionen 285.  
 Sommerwurz 5.  
 Sonnenbrand 15, 26.  
 Spalierobstpflanzungen 208.  
 Spanische Fliege 56.  
 Spanner 27.  
 Spannerraupe 69.  
 Spargelfliege 33.  
 Spargelfliegen 182, 184.  
 Spargelhähnchen 70, 102, 107, 182.  
 Spargelkäfer 182.  
 Spargelpflanzen 182.

Spargelrost 182, 188.  
 Spätling 27.  
 Speckfäfer 35, 217, 233.  
 Spiegeln 13.  
 Spinnenbisse 286.  
 Spinnenpulver 231.  
 Spinnwurm 33.  
 Splintkäfer 29.  
 Springwurm 33.  
 Springwurmwidler 33.  
 Spritzen 191.  
 Stachelbeerblattwespe 33.  
 Stachelbeerspanner 33.  
 Stammphaläne 27, 28.  
 Stangenraupenichere 211.  
 Stannirolring 208.  
 Staubbrand 25.  
 Stechfliege 34.  
 Stechfliegen 21.  
 Stechmücken 35, 244, 276.  
 Stechmückenart 244.  
 Steinbrand 25, 67.  
 Stinkbrand 25.  
 Strang 110.  
 Streupulver 270.  
 Stubenfliege 34.  
 Stubenfliegen 21.  
 Sublimat 141.

Tabak 64, 72, 102.  
 Tabakertraft 102.  
 — nach Jamina 106.  
 — nach Neßler 105.  
 Tabakertraftlösung 102.  
 Tabakertraft-Präparate 104.  
 — =Seifenlösung 162.  
 Tabakrauch 102.  
 Tabakslauge 65.  
 Tabanal 291.  
 Tannenpissodes 30.  
 Tausendfüßer 168.  
 Tausendfüßler 35, 285.  
 Teer 65.  
 Teeröl, emulgiertes 94.  
 Termiten 233.  
 Terpentinöl 64, 65.

Teufelszwirn 5.  
 Thymolin 226.  
 Tierische Schädlinge 6, 25, 57.  
 Tierläuse 35.  
 Tineol 112.  
 Totenuhr 232.  
 Tränenchwamm 26.  
 Trankeise gegen Läuse 293.  
 Traubenfäule 5, 15, 26,  
 Traubenkrankheit 4, 5, 16, 26.  
 Traubenmade 33.  
 Traubenwickler 69.  
 Traubenwicklerraupen 69.  
 Traubenwurm 33.  
 Triebbrüßler 30.  
 Trockentäule 133.  
 Truncus Carbolinum Plantarium  
 93.  
 Tur 112.

**Überwallungen** 4.  
 Ungeziefen im Hause 34.  
 — an Menschen 238.  
 — an Tieren 238.  
 — Pomade 291.  
 Ungeziefervertilgungsmittel 72, 81.  
 Unkrautpflanzen 26.

**Uafelin-Creme** 284.  
 Verborgenrüßler 33.  
 Verfärbungen 47.  
 Vergründungen 47.  
 Verhanfen 236.  
 Verheerungen der Borkentäfer 14.  
 — der Nonne 13.  
 Verkrümmungen 47.  
 Verkürzungen 47.  
 Verpeilen 4.  
 Verschiedene Mittel 109.  
 Vertilgung 50.  
 Vertilgungsmittel 51.  
 Vogelstraß 237.  
 Vorbeugende Mittel 60, 67.  
 Vorbeugungsmittel 49, 52.  
 Vögel 121.  
 Vorrichtungen 191.

**Wachsmotte** 186.  
 Wadenstecher 34.  
 Waldameisen 18.  
 Waldbindenpanner 27.  
 Waldverderber 46.  
 Walnuß 64.  
 Walzische Lauge 295, 296.  
 Wanderheuschrecke 27.  
 Wanderheuschrecken 10.  
 Wanze 35, 240.  
 Wanzen 248.  
 Wanzen-Creme 259.  
 Wanzentinkturen 256.  
 Wanzentinktur nach Töllner 257.  
 Wassergehalt 96.  
 Wasserlösliches Karbolinum 72, 84.  
 — Obstbaumkarbolinum 89.  
 — Kreosotöl 93.  
 Wasserlöslichkeit 95.  
 Wasserstoffsuperoxyd 63.  
 Weidenbohrer 187, 217.  
 Weidenrutengallmücke 33.  
 Weidenchwamm 136.  
 Weichhäutige Schädiger 67.  
 Weinbergsprike 193.  
 Weinnotte 16.  
 Weinstockfallkäfer 33.  
 Weinsurm 33.  
 Weißbuchenspinner 27.  
 Weißdornspinner 27.  
 Weißpunkttrüffelfäfer 30.  
 Welfen 4.  
 Wertholzkäfer 35.  
 Werre 27, 33, 172.  
 Wespen 149, 150.  
 Wespennefter 152.  
 Wildstraßfett 236.  
 Wildschußfett 236.  
 Wildverbiß 4, 236.  
 Winterjaatenteule 27.  
 Winterpanner 27.  
 Wirbel 216.  
 Wirtspflanze 5.  
 Wolf 33.  
 Wollfett-Creme 284.  
 Wühlmäuse 303.

Würmer 187.  
Wurmfarnwurzel 64.  
Wurmtrocknis 14.  
Wurzelläuse 98.  
Wurzelmaden 98.  
Wurzelschädiger 47.  
Wurzelschwamm 136.  
Wurzer 5.  
  
Xanthogenjaures Kalium 98.  
  
Zapfenwickler 33.  
Zacken 35, 294.  
Zerstäubungsapparat 197.

Zinkverbindungen 62.  
Zoozide 59.  
Zucker, Dr. 76.  
Zuckererbseeneule 27.  
Zuckergast 34, 214, 216, 233.  
Zündelsches Räudebad 294.  
Zugheuschrecke 27.  
Zusammengesetzte Insektenpulver  
263.  
Zwergwuchs 4.  
Zwergzikade 33, 295.  
Zwetschkenspinner 27.  
Zwiebelfliege 33, 189.

# Chemisch-technisches Lexikon.

Eine Sammlung von mehr als  
17.000 Vorschriften für alle Gewerbe und  
technischen Künste.

Herausgegeben von den  
Mitarbeitern der „Chemisch-technischen Bibliothek“.

Redigiert von

**Dr. Josef Bersch.**

**Zweite, neu bearbeitete und verbesserte Auflage.  
Mit 88 Abbildungen.**

Gebunden in Halblederband 15 K = 12 M. 50 Pf.

• • •

Der Beifall, den das Erscheinen der ersten Auflage des „**Chemisch-technischen Lexikon**“ in den weitesten Kreisen der Interessenten fand, hat darin seinen sichtbaren Ausdruck gefunden, daß schon nach verhältnismäßig sehr kurzer Zeit eine Neuauflage dieses Wertes nötig wurde. Das „**Chemisch-technische Lexikon**“ enthält mehr als 17.000 Vorschriften und Rezepte aus allen Gebieten der Industrie, der Gewerbe, der Land- und Hauswirtschaft. Für jeden Gewerbetreibenden, jeden Mann der Arbeit, bildet das Werk ein mit voller Sicherheit über jede technische Frage Aufschluß gebendes Nachschlagebuch, welches dem Besitzer einer noch so großen Bücherei unentbehrlich ist.

Aus der Unzahl der vorhandenen Vorschriften und Rezepte aller Zweige der Technik jene auszuwählen, welchen wirklich praktischer Wert innewohnt, war nur durch den Umstand möglich, daß es gelang, die Mehrzahl der Autoren der „Chemisch-technischen Bibliothek“ zur Sichtung des großen Materiales zu vereinigen und für die Gesamtreaktion einen auf chemisch-technischem Gebiete seit langen Jahren bekannten Schriftsteller zu gewinnen. Dieser hat es auch verstanden, die nun vorliegende zweite Auflage des „**Chemisch-technischen Lexikon**“ bis zum letzten Augenblicke zu ergänzen und durch die Erfahrungen selbst der allerletzten Zeit zu bereichern. — Die Redaktion hat es auch für dringend geboten erachtet, dem Lexikon selbst eine Abhandlung anzuschließen, in welcher die wichtigsten Arbeiten, die bei der Darstellung der verschiedenen chemischen Präparate vorzunehmen sind, durch Wort und Bild geschildert werden, so daß auch der Nichtchemiker in der Lage ist, sich jene Kunstgriffe anzueignen, welche zum Gelingen der Arbeit erforderlich sind.

---

**A. Hartleben's Verlag in Wien und Leipzig.**

010366679







CALL NO.

SB  
611  
A6  
ESCI

AUTHOR

ANDES

TITLE

UTL AT DOWNSVIEW



D RANGE BAY SHLF POS ITEM C  
39 09 14 08 11 002 5